

# الاهمية الاقتصادية للقوارض



الاستاذ الدكتور / عبد العليم سعد سليمان دسوقي

قسم وقاية النبات - كلية الزراعة - جامعة سوهاج- مصر



## "تقديم الكتاب"

تعتبر القوارض من أهم الآفات التي تهدد الاقتصاد القومي نتيجة لما تسببه من خسائر جسيمة في مجال الزراعة و الصناعة وكذلك في مجال الصحة العامة بما تنقله من أمراض عديدة للإنسان و الحيوان .و تعتبر الجرذان و الفئران من الآفات الفقارية متعددة العوائل, و نظرا لذلك كان لابد من إلقاء النظر خلال هذا الكتاب عن الوضع التقسيمي للقوارض واهم القوارض المنتشرة ذات الاهمية الاقتصادية، دراسة طبائع وسلوكيات و غرائز الفئران و كيفية الاستفادة منها في عمليات المكافحة و الأهمية الاقتصادية للقوارض في جميع المجالات الزراعية و الصناعية و الصحة العامة و غير ذلك.

يعد هذا الكتاب مرجع أساسي للأشخاص المهتمين بمجال القوارض وطرق مكافحتها في جميع أنحاء الوطن العربي.

الصفحة	المحتويات
7	مقدمة
9	<b>الباب الاول: الوضع التقسيمي للقوارض</b>
10	الصفات المورفولوجية الظاهرية للقوارض
13	أهم عائلات القوارض الشائعة
13	عائلة العضلان Muridae
31	عائلة الجرابيع Dipodidae
35	عائلة كريستيدي Cricetidae
43	عائلة الاسبليكس Spalicideae
46	تقسيم القوارض
47	عن طريق الحجم

47	عن طريق الشكل الظاهري و السلوك
79	عن طريق الظروف البيئية للمعيشة ومعظم الفئران تشترك في هذا السلوك
50	حيوانات شبيهه بالقوارض
53	<b>الباب الثاني: طبائع وسلوكيات وفرائز الفئران</b>
53	لماذا سميت الفئران بالقوارض
55	طبائع الفئران (اللون -الحجم - الوزن- الحواس- السمع- الشم)
64	القدرة علي التسلق والقفز والعموم
68	عادات التغذية
69	النشاط العدواني للفئران
70	التكاثر عند الفئران
74	ظاهرة التجنب

77	المدى الحركي للفئران
79	الهجرة
79	المسكن
82	التعرف على وجود الفئران واستكشافها
92	الاحكام المتعلقة بالفأر
96	أسباب الزيادة في أعداد الفئران في مصر في السنوات الأخيرة
100	<b>الباب الثالث : الأهمية الاقتصادية للقوارض</b>
100	<b>➡ الأهمية الاقتصادية للقوارض من الناحية الزراعية</b>
117	<b>➡ الأهمية الاقتصادية للقوارض من الناحية الصحية</b>
118	الطاعون Plague
136	التولاريميا Tularemia
149	الليشمانيا Leishmaniasis

152	التهاب الكبد المعدي <i>Leptospirosis</i>
159	مرض التيفوس Typhus
169	السالمونيلا Salmonellosis
173	حمى عضة الجرذ Rat bite fever
173	التهاب السحايا والمشيمات اللمفاوى
176	فيروس هانتا HantaVirus
179	السعار (داء الكلب)
179	التسمم الغذائى
179	الإلتهاب السحائى وشلل الأطفال نتيجة بعض الفيروسات
180	بعض الأمراض الطفيلية
181	أهم فوائد القوارض
207	المراجع

## الاهمية الاقتصادية للقوارض

**مقدمة:** تعتبر القوارض Rodents (الفئران) من أكثر الآفات ضررا للمحاصيل الزراعية القائمة، الحقول والمخازن ومزارع الإنتاج الحيواني بالإضافة الي الأضرار التي تحدثها بالمنازل والمباني والأجهزة والكابلات الكهربائية و غير ذلك.. مما يؤدي الي تعطل الإنتاج أو التأثير علي الدخل من ناحية و من ناحية أخرى فهي تقوم بنقل الكثير من الامراض لكل من الإنسان والحيوان، فأكثر ما يميز الفئران أن لها قدرة فائقة علي توطيد نفسها في جميع البيئات، فنسلها الفائق العدد و طباعها التي تمتاز بالدهاء والخبث تجعلها أكثر الحيوانات التي تسبب مشاكل للإنسان.

إن مشكلة الفئران في مصر ليست وليده العصر الحديث ولكنها موجودة منذ القدم و قد وجدت لها نقوشا علي جدران المعابد الخاصة بالقدماء المصريين، وهي مشكلة ليست قاصرة علي مصر فقط ولكنها تشمل معظم بلدان العالم وكان العامل المشترك لإنتشارها هو الاخلال بالتوازن الطبيعي نتيجة الإسراف في إستخدام المبيدات علي نطاق واسع بداية من النصف الاول من القرن الماضي.

وكلمة قوارض مشتقة من الكلمة اللاتينية Roder بمعنى القرض أو النحر لأن ما تفعله القوارض دائما القرض لأي شيء ،الحشائش أوراق الشجر وقلف وخشب الأشجار وأكياس القمح المخزون وهي لا تقرض لكي تتغذي فقط ولكن عليها أن تفعل ذلك لكي تحافظ علي تآكل قواطعها الأمامية، حيث تتميز أفراد هذه الرتبة بأن أسنانها تتكون من قاطعين علويين وآخرين سفليين وعدم وجود أنياب كما يوجد من 3- 6 أضراس Cheek molars وبغلف الأسنان مينا قوية خاصة الحواف القاطعة ويستمر نمو الأسنان طوال حياة الحيوان بصفة خاصة للقواطع إلا أن عادة أفراد الرتبة في القوارض تحفظ لهذه الأسنان طولها الطبيعي الذي يمكنها من التغذية ويحفظها من الهلاك بالجوع وفي حالة تركها تنمو بدرجة تعوق الحيوان من تناول الطعام، وتضم هذه الرتبة ما يزيد علي ثلث الثدييات في العالم ومعظمها ثدييات صغيرة الحجم وهي واسعة الانتشار في البيئات المختلفة حيث تضم الجرذان Rats والفئران Mice والسنجاب Squirrels و الأرانب Rabbits ، و يقصد بكلمة فأر كائن صغير قارض يسرع الفرار عند الشعور بالخطر و يطلق علي



الأنواع الصغيرة بالفئران و الأنواع الكبيرة منها الجرذان وباللغة العامية يطلق عليها الفئران.

### الباب الأول الوضع التصنيفي للقوارض

Kingdom: Animalia المملكة الحيوانية

Phylum: Chordata شعبة الحلييات

Sub phylum: Vertebrata الفقاريات

Class: Mammalia الثدييات

Sub class: Eutheria ذوات المشيمة

Order: Rodentia رتبة القوارض

ويتبع هذه الرتبة علي مستوي العالم 32 عائلة منتشرة منها في مصر 4 عائلات لها أهمية اقتصادية وهي تقسم القوارض الى مجموعه من العائلات بناء على مجموعه من الصفات المورفولوجية والتشريحية الهامه والتي منها:

### External characters الصفات المورفولوجية الظاهرية

#### اللون

ويختلف اللون باختلاف الانواع المختلفة من القوارض وأنواع البيئات التي تعيش فيها ويتراوح لون الظهر من الرمادي الداكن والبنى على الناحية الظهرية من الجسم ويتراوح بين اللون الابيض والرمادي على البطن ولا يمكن الاعتماد على صفة اللون بشكل أساسي في التصنيف وذلك لأن البيئة تؤثر على درجة اللون . ويتحكم في اللون ستة جينات يختلف اللون باختلاف عدد الجينات السائدة



### مقاييس الجسم وتشمل :

طول الذيل بالنسبة لطول الرأس والجسم معا . ويقاس الذيل من نهاية العمود الفقري وحتى نهاية جلد الذيل ولا يدخل فى القياس طول الفرشة .  
اما طول الرأس والجسم معا فيقاس من بداية الأنف الى نهاية العمود الفقري .

طول الرجل الخلفية ويقاس من الكعب حتى نهاية اطول صباع قدم بدون المخلب

طول الأذن ويقاس من نقطة اتصال صوان الأذن بالرأس الى نهاية صوان الأذن

وزن القارض : حيث يشكل عنصر هام فى التفرقة بين الفأر والجرذ حيث ان الفأر يقل وزن الحيوان البالغ فيه عن 100 جرام وان كان لا يتجاوز 30 جرام فى بعض الانواع مثل الفأر السيسى *Mus musculus*. بينما يزيد وزن الجرذ البالغ عن 100 جرام.

عدد الوسائد القدمية Foot pods حيث ان معظم القوارض لديها ستة وسائد قدميه على اخمص القدم الخلفية ماعدا Water vole, Musk rat فإن لها خمسة وسائد قدميه فقط

عدد حلمات الثدي فى الإناث البالغة والموجودة على الناحية البطنية والتي توجد فى مجموعتين الأولى بالقرب من الارجل الأمامية والثانية بالقرب من الأرجل الخلفية ويختلف عدد هذه الحلمات باختلاف الأنواع فمثلا الجرذ المتسلق 3+2 والفأر المنزلي 2+3 و الجرذ النرويجي 3+3 وجرذ الحقل النيلي 2+2 و 2+2 Neosokia

وللحرص على الدقة يجب ان تؤخذ هذه المقاييس من الأفراد البالغة حتى تعطى مقاييس دقيقة لأن الأفراد الصغيرة تكون ذات ذيول وآذان اطول

نسبياً من الأفراد البالغة. وبالرغم من كل الصفات الكلية المورفولوجية التي يمكن الاعتماد عليها في تصنيف الأنواع إلا أنه قد يتطلب الأمر دراسة الصفات الداخلية Internal characters مثل طول وعرض الجمجمة و مساحة الـ diastema (الفجوة بين القواطع والضروس) وطول الفك ولسان العلوية وقطر مقلة العين و طول البوز وطول وعرض العظام الانفية وغير ذلك من الصفات الداخلية إذا تم الاضطرار الي ذلك فهي يأخذ بها في عمليات التصنيف.

وفيما يلي عرض لأهم عائلات القوارض الشائعة:

### 1- عائلة العضلان Family: Muridae

وتضم أهم اجناس القوارض ذات الاهمية الاقتصادية الكبيرة داخل جمهورية مصر العربية وهي

جنس Arvicanthis niloticus ( جرذ الحقل النيلي - فأر الحشائش - جرذ

الغيط)

Field rat, grass rat, Nile rat, Kusu rat





### "جرذ الحقل النيلي"

هو متوسط الي كبير قد يصل وزنة لا كثر من 200 جرام

طول الذيل أقصر من طول الجسم والرأس معاً

الأذن قصيرة مستديرة ذات لون طويبي

لون الفراء مبرقش (شعر اصفر+ اسود)

لون البطن بيضاء تميل الي الرمادي

الجهة الظهرية من الذيل عليها خط اسود من بداية الذيل الي نهايته

يعيش هذا النوع في جحور يحفرها في باطن الأرض مفضلاً جسور الترع والمصارف ويهاجم الحقول.

يفضل التغذية علي جميع محاصيل الحقل و النجيليات ويتغذي علي الحبوب و الخضروات والبذور وقصب السكر و قلف الاشجار و يلجأ أحيانا الي الهجرة داخل المنازل والمنشآت في حالة عدم وجود غذاء بالحقول

### إنتشاره

ينتشر في معظم نواحي الدلتا و الصعيد و الساحل الشمالي ويعيش علي جسور الترع والمصارف والقنوات المائية و البتون وفواصل الحقول نشاطه ليلا ولكن في بعض الاحيان يري نهارا متجولا بين قنوات الري و الزراعات

انسب فترات التكاثر له في شهري يونيو ونوفمبر حيث وجد ان 60% من الحوامل كانت في شهر اكتوبر، فترة الحمل 20 يوما و تبلغ الفئران بعد ثلاث شهور و تستطيع ان تعيش تحت الظروف الطبيعية ثلاث سنوات



هذا الجرذ عدواني الميول، و لايمكن مسكه باليد حيث يقوم بعض الانسان  
اثناء ذلك

## Rattus -2

و يقع تحت هذا الجنس نوعين هما

### الجرذ النرويجي Rattus norvegicus

ويسمى بالجرذ النرويجي القذر، فأر المجاري أو الجرذ البني أو جرذ الأماكن  
الرطبة

Norway rat, Sewer rat, Brown rat

ينتشر في جميع أنحاء العالم، يتواجد بكثرة في المدن،

أكبر أنواع الجرذان حجمًا ، إذ يتراوح وزنه ما بين (200 - 500 جم ) وفي

بعض الاحيان قد يصل لاكثر من ذلك

قوي البنية ويعتبر اشرس انواع القوارض وفي بعض الاحيان قد يهاجم

الانسان

الذيل اقصر من طول الراس و الجسم معا ويوجد عليه حراشيف ونهايته غير

مدبية وسميك

الاذن قصيرة وسميكة ومغطاة بالشعر

ذو رأس مدبب و انف مبسط,

الظهر لونه بني و البطن رمادية

ذيل سميك طويل (15 - 21 سم) عار من الشعر مغطى بقشور, اقصر من

طول الجسم و الرأس معا, لونه رمادي مشوب باللون البني والبطن باهت, و

قد يكون لونه أسود أو بنيا فاتحا, يتراوح طوله بما في ذلك الذيل بين 32.5 و

46 سم,

هو من الأنواع صانعه الأنفاق يفضل الأماكن الرطبة

يحفر أنفاقه تحت سطح التربة على عمق غير بعيد من 30 إلى 40 سم, في

المطاحن ومخازن الغلال والمجارى ومخازن الآلات الزراعية, قدرته على

التسلق محدودة ولكنه قادرا على العوم شديد الحذر لأي تغير في البيئة

المحيطة يفترس صغار الفئران

يفضل التغذية علي المواد ذات المحتوي البروتيني الحيواني

قطع البراز (البعيرات) متناثرة اسطوانية الشكل.

يعيش من 2-3 سنوات, وتبدأ الإناث في التوالد بعد 3-4 أشهر وتتراوح مده

الحمل بين 21-25 يوما وتلد الأنثى 4-6 مرات في السنة وقد يصل عدد

الولادات إلى 12 مرة ويصل عدد ما تضعه الأنثى من صغار 8 في كل مره

وتصل الصغار إلى تمام نضجها بعد 4 أشهر.

### انتشاره

ينتشر في معظم انحاء الجمهورية وخاصة الاماكن الرضبة كضفاف النيل و

في الاماكن التي تتوافر فيها المادة العضوية مثل مزارع الالبان والدواجن

والانتاج الحيواني كما ينتشر في الاسطبلات وينتشر في الدلتا و الصعيد ومدن

القناة



"الجرذ النرويجي"

Rattus rattus المتسلقة

أصغر حجماً من الجرذ النرويجي قد يصل الي 250 جرام

الجسم رشيق

الذيل اطول من الجسم والرأس معاً

الذيل عليه حلقات غضروفية ونهايته مستدقة

الأذن طويلة نسبياً والبوذ مستدق والعيون أكبر من النرويجي ويعيش معيشة اجتماعية أيضاً ويقطن الأدوار العليا ويجيد التسلق أكثر من السباحة .

البطن بيضاء كريمي – رمادي- سوداء

الارجل طويلة بالنسبة للجسم

يفضل التغذية علي المواد ذات المحتوي السكري

انتشاره

ينتشر في الموانئ و المنازل و الحقول و الحدائق علي مستوي الجمهورية

في الوجه البحري والقبلي والساحلي و مدن القناة و يتغذي علي المواد

المخزونة وعلي الحبوب

وتشمل الجرذان المتسلقة بمصر 3 أنواع هي:

R.r. frugivorus ( جرد النخيل )

الظهر لونه مائل للرمادي ، شعر البطن ابيض ينتهي بقمه صفراء او لون كرمي

ويطلق عليه جرد النخيل لان اغلبية مأواه التفضل ببناء عشوش بأشجار النخيل اذا توافر ذلك.



"جرذ النخيل"

R.r. alexandrines ( الجرد السكندري )

الظهر اسود مائل للرمادي وشعر البطن لونه رمادي ويطلق عليه الجرد السكندري



## "الجرذ السكندري"


### R.r. rattus الأسود المتسلق

الظهر لونه اسود مائل للبني و البطن والاقدام سوداء تميل للرمادي ويطلق

عليه

( الجرذ ذو البطن السوداء Black rat ، فأر العض- جرذ المراكب- فأر

السفن)



"الجرذ الاسود"

### 3 - جنس Mus

- اهمها الفأر المنزلي Mus Musculus واسمه الشائع House mouse

- فأر صغير الحجم قد يصل وزنه الي 30 جرام

- الذيل أقصر قليلا من طول الجسم والرأس معاً

الاذن طويلة وشفافة

البوز مدبب وقصير

الجمجمة أكثر ضيقاً إذا ما قورنت بجمجمة الجرذان الصغيرة



البطن مائلة للرمادي والفرو بني احيانا يميل للرمادي والشعر ناعم من الظهر  
والبطن.

نهاية الذيل مدبب

يتغذي علي البذور ويفضل الحبوب وبأكل في الحقل محاصيل الحبوب  
والنجيليات

يعيش هذا النوع ايضا في المنازل و الخيام ومخازن الغلال و الحدائق

انتشاره

يكثر في الدلتا و الوجه القبلي و مدن القناة وبعيش اينما وجد الانسان في  
المنزل و في الحقل ويكثر في مخازن الحبوب والدقيق.



## "الفأر المنزلي"

### 4 - جنس *Acomys*

فئران حجمها ما بين الصغير و المتوسط ن يختلف لون الظهر ما بين اللون المحمر و البني او المسود تبعا للنوع ، فروة الظهر شوكية الملمس، الذيل عليه حلقات عريضة عليها اشواك ويقع تحت هذا النوع

الانواع التالية:

الفأر الشوكي القاهري - *Acomys cahirinus*

واسمه الشائع Egyptian spiny mouse

لون راحة اليد و اخمس القدم و الذيل غير مسودة

أكبر حجماً من الفأر المنزلي قد يصل الي 40 جرام

الأذن كبيرة مستديرة عاربة والجمجمة ذات سطح منبسط

لون الظهر اسود ويتميز بوجود شعيرات شوكية في الربع الاخير من الظهر ذات لون اسود او رمادي او بني شاحب(أردوازي) و البطن اردوازية اللون ويتميز بالملمس الشوكي بالظهر وهو منزلي.

الذيل اطول بقليل من طول الراس و الجسم معا

الذيل عليه حلقات خشنه

### انتشاره

يتنشر علي جانبي وادي النيل حتي اسوان و قناة السويس و الواحات البحرية و نادار ما يوجد في الزراعات و يتغذي علي الحبوب و البذور.



"الفأر القاهري الشوكي"

*Acomys dimidiatus* الظهر لونه بني شاحب، الذيل ذو لونين

*Acomys russatus* لون الظهر برتقالي محمر، لون البطن ابيض مصفر

شاحب، لون اخمص القدم وراحة اليد و الذيل اسود، الذيل اقصر من طول

الراس والجسم معا، الفروة الشوكية موجودة علي الراس و الظهر و

الجوانب والسنام، الذيل غير ملون بلونين و يوجد عليه حلقات واشواك والاسم

الشائع Golden spiny mouse

*Acomys viator* الظهر بني غامق، البطن بيضاء

*Avomys hunter* بني غامق، البطن بيضاء

*Acomys helmyi* الظهر بني شاحب، الذيل لا يوجد عليه اللونين بوضوح

**5-جرذ أبو عفن (النزوكيا) *Nesokia indica***

الاسم الشائع له Bandicoot rat, Girodi, Abu Afan

جرذ كبير يشبه النرويجي قد يصل وزنه لأكثر من 250 جرام لكن يختلف عنه في

الذيل اقصر بكثير من طول الراس والجسم معا ونهايته مستدقة وعليه

حلقات حلزونية ولكنه يتميز بالحراشيف التي توجد على ذيله

البطن كريمي والفرو لونه بني محمر او مائل الي البني

البوز غير حادة، و الاذن كبيرة عليها بعض الشعر

الاقدام لونها ابيض

الارجل قصيرة نسبيا

له القواطع العليا ممتدة للأمام

له رائحة الخاصة التي تفرزها غدد شرجية.

يعيش في الاماكن الرطبة المزروعة وغير المزروعة

انتشاره

يتنشر في الجزء الشمالي الغربي في الدلتا ووادي النطرون و الواحات

ويعتبر هذا الجرذ من الانواع الشائعة و المنتشرة في شرق اسيا و من

الكائنات الضارة جدا بمحصول الارز



"جرذ ابو عفن"

و علاوة علي الانواع السابقة يوجد بعض الانواع الصحراوية المنتشرة في صحراء مصر الشرقية والغربية و شبه جزيرة سيناء و الاماكن المستصلحة حديثا و يوجد منها:

### عائلة الجرايع ( Family: Dipodidae )

من اهم خواص هذه العائلة: يختلف الحجم بين الصغير و الكبير باختلاف الانواع وكذلك يختلف اللون من البني المسود الي البرتقالي ، الارجل الخلفية طويلة ، الساق و الرسغ بالرجل الخلفية مندمجة. الاصابع العاملة بالرجل الخلفية عددها ثلاثة، طول الذيل يساوي تقريبا مرة ونصف طول الجسم والراس معا و ينتهي بفرشاه سوداء اللون قمتها بيضاء و يوجد من اجناس Allactaga, Jaculus وسوف نقوم بشرح اهم الاجناس Jaculus وبتبعه الانواع الاتية:

### الجربوع المصري الكبير ( جاكلوس ) Jaculus orientalis



## "الجربوع المصري"

ويتميز بالاتي:

كبير الحجم قد يصل الي 150 جرام

ارجله الخلفية طويله تشبه ارجل الكنجارو



الذيل اطول من طول الراس والجسم بكثير

الذيل ينتهي بريشة من الشعر الابيض و الاسود

هاديء الطباع

لو الظهر بني برتقالي والبطن بيضاء

يتغذي علي البذور و الحشائش الصحراوية الجافة وجذور النباتات

الجربوع الصغير Jaculus Jaculus





### "الجربوع الصغير"

صغير الحجم قد يصل الي 60 جرام

لونه بين البرتقالي والبني الفاتح

ينتشر هذا النوع في مصر بسيناء والجزء الشمالي من الصحراء الشرقية

تعيش هذه الانواع في جحور في الارض الصلبة علي عمق 2 متر و يوجد

لها انفاق للهروب منها و تتغذي علي البذور و الحشائش الصحراوية الجافة

وجذور النباتات

## عائلة كريستيدي (الجربلس) Family Cricetidae

ينتشر معظم افراد هذه العائلة في الاراضي الصحراوية الحديثة الاستصلاح و خاصة في منطقة الصالحية و النوبارية و يتبع هذه العائلة الاجناس الاتية:

اذا كان شكل الذيل اسطوانني و اطول من طول الراس و الجسم معا  
اخمص القدم يغطيها الشعر كاملا و شعر البطن ليس له قاعدة رمادية

Genus Gerbillus

اخمص القدم تغطي جزئيا بالشعر و قاعدة شعر البطن لونها رمادي

Genus Meriones

اخمص القدم عارية والذيل ليس غزير الشعر Genus Dipodillus

اخمص القدم عارية والذيل غزير الشعر Genus Sekeetamys

اذا كان الذيل سميك و اقصر من طول الراس و الجسم معا

شكل الذيل عادي له قمة سوداء ، لون شعر البطن مصفر

Genus psammomys

الذيل ياخذ شكل الهرهه بدون قمة سوداء ، لو شعر البطن ابيض Genus

Pachyramys

و فيما يلي شرح لاهم الانواع :

جنس الجربلس Gerbillus 🇪🇬

جربوع الهرم Gerbillus pyramidum





## "الجربلس"

الحجم قد يصل الي 60-70 جرام

لون الفرو برتقالي والارجل مغطاة بشعر

طول الذيل اطول من طول الراس والجسم معا

نهاية الذيل بها خصله من الشعر المائل الي الاسود

ينتشر هذا النوع في سيناء و الكثبان الرملية و وادي النطرون والفيوم في

المناطق الصحراوية

جربوع الصغير *Gerbillus gerbillus*

صغير الحجم قد يصل الي 30 جرام

لون الفرو برتقالي مصفر او محمر و خاصة في المنطقة الظهرية

طول الذيل اطول من طول الراس والجسم معا

تتغذي الجرابيع علي بذور وجذور النباتات و الحشرات و تنتشر في المناطق

الصحراوية و خاصة في منطقة سيناء.

جنس الماريونس Meriones 🇵🇸

صفاته:

تتراوح اوزانه بين 30: 90 جرام

غالبا ما يكون الذيل اقصر من الراس و الجسم معا ما عدا Meriones

libycus

فالذيل اطول

لون الفرو مصفر او بني مصفر والفرو ناعمة

## البطن بيضاء

يتغذي علي جذور النباتات و الحشائش الصحراوية واصبح الان ذو اهمية اقتصادية في المناطق الجديدة حيث يتغذي علي المحاصيل التي بها. ينتشر في سيناء و الصحراء الشرقية والغربية بالقرب من الاسكندرية



## "الماريونس"

ويوجد منه في مصر عدة انواع هي

## - Meriones crassus (Silky jird, Sundevalls jird)

الفروة من الناحية الظهرية ذات شعر ناعم طويل ولونه بني مصفر شاحب ينتهي بلون اسود، والبطن والاقدام الخلفية لونها ابيض ، الذيل ذ لونين وبتتبي بفرشاة واضحة

يعيش هذا النوع في المناطق الساحلية و الوديان في سيناء و الصحراء الشرقية وتوجد الجحور بين الصخور و الاحجار حول المباني و الخيام و اكوام القش و حول الشجيرات، الجحور سطحية ذات فتحات متعددة ويعمل جحوره في الارض الصلبة.

## -Meriones shawi

فئران ذات حجم كبير ، الفروة ناعمة ولونها بني مصفر من الناحية الظهرية مع وجود خط لونه مصفر او برتقالي علي الجانبين يمتد حتي الكعب، البطن لونها ابيض، الاذن ملونه، الذيل لونه باهت من الناحية الظهرية وياخذ لون القرفة من الناحية البطنية وبتتبي بفرشاة لونها اسود.



-يعمل هذا النوع جحوره في الارض الثقيلة علي الساحل الغربي تحت الاشجار، وديع الطبع يمكن مسكه بسهولة، الجحور متعددة الفتحات.

ينتشر هذا النوع في مصر بالقرب من الاسكندرية و السلوم وليبيا و الجزائر والمغرب.

( الجيرد الليبي Meriones libycus (Libyan jird)-

فئران ذات حجم كبير ، لون الظهر اصفر غامق مع وجود خط برتقالي واضح علي الجوانب

، البطن لونها ابيض، الاذن غير ملونه، لون الذيل برتقالي من الناحية الظهرية وبتتهي بفرشاه سوداء. هذا النوع عدواني الميول و من الصعب مسكة باليد ويعيش في اكوام الرمال

يعيش هذا النوع في الصحراء الغربية بالقرب من الاسكندرية و في ليبيا

والعراق وسوريا والاردن واسرائيل وتوجد انواعه اخري مثل Meriones

tristrami, Meriones sacramenta

## جنس السامومي

الفئران من النوع القصير الممتلئ ، يختلف لون الظهر من البرتقالي المحمر الي الاسود، لون البطن والجوانب مصفرة، الاذن صغيرة ومدورة ، طول الذيل اقصر من طول الجسم والراس معا وعلية شعر كثيف ينتهي بفرشاه لونها اسود، راحة اليد خالية من الشعر ، اخمص القدم عليه بعض الشعر



"جرذ السامومي"

و يوجد منه فار الرمل السمين واسمة الشائع الجرادة او فار الرمل السمين  
(fat sand rat jarade) و يمتاز بما يلي :

الجسم من النوع القصير الممتليء

لون الظهر من البرتقالي المحمر الي الاسود

طول الذيل اقصر من طول الراس والجسم وعليه شعر كثيف

يتغذي علي مواد البيئة الصحراوية

ينتشر في الجزء الشمالي الغربي من الدلتا و في شمال الصحراء الغربية

### عائلة الاسبليكس Family: Spalacidae

يتبع هذه العائلة جنس Spalax و التي من اهم خصائصه

عدم وجود ذيل او عيون او اذن خارجية

الفرو ناعمة ذات لون غامق

يتغذي علي الدرنات والبصيلات وجذور النباتات المختلفة

و من اهم الانواع

Mole rat, Abu ( واسمه الشائع جرذ ابو عماية ) *Spalax ehrenbergi*

(Amma





### "جرذ ابو عماية"

يعيش في انفاق تحت سطح التربة بعمق يصل الي 50 سم في المناطق  
الصحراوية و في اعماق الاراضي الرملية

هذه الانفاق متشعبة و تحتوي علي العديد من الحجرات للمعيشة و تخزين  
المواد الغذائية ويعمل جحوره بواسطة مخالبة الامامية التي يحفر بها التربة  
ثم يقوم بدفع التراب للأمام بواسطة الراس وقد يستخدم القواطع في حفر  
الارض الصلبة

هذا النوع نشيط الحركة، عدواني الميول و يعرض بسرعة عند امساكه ويزداد  
نشاطه في فصل الشتاء والربيع أي في مواسم المطر ونادرا ما يشاهد في

الفصول الجافة، وبالرغم من ان هذا النوع متأقلم للمعيشة تحت سطح التربة الا انه قد ينشط ليلا او نهارا فوق سطح التربة و ذلك للحصول علي غذائه او للتزاوج و يتغذي هذا النوع علي الدرنات والبصيلات و جذور النبات المختلفة و يمكن اصطياد هذا النوع مصائد خاصة تسمى Macabee Pocket gopher

ينتشر في الجزء الشمالي من الساحل الغربي للبحر الابيض المتوسط

ملاحظة: أكثر انواع القوارض انتشارا بجنوب صعيد مصر هو الجرذ المتسلق

ذو البطن البيضاء (جرذ النخيل) و الجرذ المتسلق ذو البطن الرمادي (الجرذ

السكندري) و جرذ الحقل النيلي (جرذ الغيط) و الجرذ النرويجي و الفأر

المنزلي وبعض الانواع الصحراوية بالمناطق الصحراوية.

و يمكن تقسيم القوارض الي:


عن طريق الحجم ( ما هو الفرق بين الفأر و الجرذ )

جرذ	فأر	
اكبر من 50 جم	اقل من 50 جم	وزن الحيوان البالغ
أطول من 3 سم	أقصر من 3 سم	طول القدم الخلفية
أطول من 3 سم	أقصر من 3 سم	طول علبة الراس
الجرذ النيروجي	الفأر المنزلي	مثال

عن طريق الشكل الظاهري و السلوك

قوارض حافرة	قوارض متسلقة	
اقصر من طول الرأس والعنق والجذع	اطول من الرأس والعنق والجذع	الذيل
عريض	مסحوب	البوذ
قصير	طويل يغطى فتحة العين	صيوان الاذن
لا توجد مخدات	توجد مخدات اسفل القدم	بطن القدم

جحور تحت سطح الارض	عشوش اعلى سطح الارض	مكان المعيشة
الجرذ النيروجي	جرذ السكندري	مثال
جرذ الحقل النيلى	جرذ النخيل	



"الفرق بين الجرذان المتسلقة و الحافرة"



اخيرا يمكن القول بان

القوارض الحافرة أي التي تعيش في جحور هي ( الجرذ النرويجي - جرذ الحقل النيلي - جرذ النوزكيا - الفار المنزلي )

القوارض المتسلقة أي التي تعيش في عشوش ( جرذ السكندري - جرذ النخيل - الجرذ الاسود ) وفي كثير من الاحيان تعيش الانواع المتسلقة في جحور لكن بعد تجهيزه كعش

عن طريق الظروف السيئة للمعيشة ومعظم الفئران تشترك في هذا السلوك

ولكن بدرجات مختلفة

**قوارض منزلية** : تعيش في المنازل ولا تغادرها ” الفأر المنزلي, الشوكى

القاهري , الجرذ المتسلق الرمادي, احياناً المتسلق ذى البطن الابيض ”

**قوارض شبه منزلية** “ مشاركة” يمكنها المعيشة فى المنازل وخارجها ” الجرذ

المتسلق ذى البطن الابيض, جرذ الحقل النيلي, الجرذ النرويجى ”

**قوارض برية** " حقلية " تعيش فى الحقول ولا تدخل المنازل الا فى حالة عدم

توفر الطعام فى الحقول " الجرذ المتسلق ذى البطن الابيض, جرذ الحقل

النيلى, الجرذ الترويجى "

**قوارض صحراوية** تعيش فى الصحراء ولا تدخل المنازل وتتخذ من النباتات

الصحراوية غذاء لها " جرذ ابو عمايه , اليرابيل "

### حيوانات شبيهه بالقوارض

ابن عرس (العرسة)



"ابن عرس"

ابن عرس أو الدلق أو الرغوب *Mustela nevalis* هو جنس من الحيوانات

يتبع الفصيلة العرسيات *Mustelidae* من رتبة اللواحم *Carnivora*

فهو ليس من القوارض

يخرج عادة في الليل للبحث عن غذائه وقد يخرج بالنهار أيضاً. وبالرغم من

أن هذه الحيوانات هي أصغر أنواع اللواحم، فهي بالغة الجرأة مقدامة غير

هيابة، حيث يهاجم الثدييات الصغيرة بجرأة،

ولابن عرس حاسة شم قوية وحاسة بصر حادة، وله قوة تثير العجب بالنسبة

لحجمه حيث يفترس الفئران والسناجب. وهو يعض الفريسة عادةً في رقبتها

أو في أسفل الجمجمة. ويأكل ابن عرس كذلك ديدان الأرض والحشرات

والضفادع والسحالي والأرانب والدُّباب والحيّات والطيور.

وجسم ابن عرس النحيل يمكنه من أن ينفذ بسهولة إلى جحور الفئران

وشقوق الصخور وأعشاش السناجب. وكثيراً ما يقوم ابن عرس باجتياح

المزارع ويقتل من الدجاج أكثر مما يحتاج إليه في طعامه. ونتيجة لذلك

يناصب كثير من المزارعين ابن عرس العداء رغم أنه يقضي على حشرات المزرعة. وقد جرت العادة على تسميته في الريف المصري بـ«خناق الكتاكيت» لقدرته الفائقة على التخلص من أعداد كبيرة من الكتاكيت، فالعرسة الواحدة يمكنها امتصاص دماء أكثر من مائة كتكوت في اليوم، ولهذا فوجوده في الأماكن القريبة من مزارع الدواجن أو منازل الفلاحين يعد خسارة فادحة تلحق بأصحابها، وقد عبر المثل الشعبي المصري القائل «اللي يخاف من العرسة ما يربيش كتاكيت» عن مدى الخوف من هذا الحيوان دقيق الحجم، والذي يتسم جسمه بالرشاقة والسرعة ولهذا تصاب الدواجن عند رؤيته بهلع شديد. أيضا العرسة المصرية تهاجم الفئران بشدة وتعتبر مسئولة عن القضاء على نسبة منها.

**\*نذه عن طرق مكافحة ابن عرس**

- الحفاظ على النظافة دائما والحرص على التخلص من القمامة والكرابيب

بشكل مستمر

- إضاءة المكان المحتمل وجود ابن عرس لانه يحب الظلام

- المكافحة الحيوية عن طريق تربية الكلاب لانه يخشي المكان اللى فيه رائحة الكلاب.

- استخدام مصائد الفئران و يوضع بها كبده غير مطهية او صغار الطيور او احشاء داخلية للطيور او اي شىء به دم طازج لان ابن عرس ينجذب نحو الطعوم التى بها دم طازج ويوضع بداخله سم ( مييد) مثل اللانيت او فوسفيد الزنك مثلا.

## **الباب الثاني طبائع وسلوكيات وفرائز الفئران**

### لماذا سميت الفئران بالقوارض

تتميز بزوج من القواطع لكل فك تنمو بصفة مستمرة قد تصل إلى أكثر من 12 سم في العام والنمط العام لأسنانها (1003/1003 ) لكل فك أي لا توجد أنياب أو ضروس أمامية و يوجد بين القواطع والضروس الخلفية فراغ يسمى " فراغ الديستيما " وفي هذا الفراغ تشي القوارض شفيتها للداخل فتمنع دخول الشظايا الحادة(أخشاب أو أي مواد أخرى تحتوي علي شظايا حاده)

إلى الفم عند إجراء عملية القرض أو بري القواطع و السماح لها بالخروج عن طريق فراغ الديستينا

لذلك تلجأ إلى قرض الأخشاب و الأسلاك و المواد الأخرى لتقليم أو بري قواطعها باستمرار لوقف نموها فإن تركتها بدون بري تموت. لكن هذا السلوك أثر على الفئران فهي تقرض كل ما يقابلها حتي لو كانت مواد لا تساعد في عملية البري كالأوراق و الصابون وغير ذلك ، معتقدة أنها تقوم بعملية البري أو التقليم ولهذا سميت بالقوارض.





## "القواطع في القوارض"

### اللون والحجم والوزن

يختلف اللون باختلاف انواع الفئران وكذلك باختلاف البيئات التي تعيش فيها  
 الفئران وتتراوح الوان الفئران ما بين البني الي الرمادي على الناحية الظهرية  
 اما على الناحية البطنية فيتراوح اللون بين الابيض الي الرمادي الخفيف  
 وعموما فانه لا يمكن الاعتماد على الالوان في تمييز الانواع حيث ان اللون  
 كباقي الصفات المورفولوجية الخارجية التي تتغير بتغير المناطق الجغرافية  
 ويتحكم في صفة اللون 6 ازواج من الجينات وعلي حسب عدد الجينات

السائدة الموجودة في الفرد يظهر اللون اي انها وراثه كميّة اما بالنسبة للوزن فيتراوح وزن الفأر ما بين 100 : 500 جرام وقد يصل الوزن 25 جم في الفأر المنزلي .

## الحواس

حاسة الإبصار: هي أضعف الحواس في الفئران حيث تقوم الفئران فقط بتحديد الشكل الخارجي للأشياء ولا تستطيع الفئران ان تميز من الالوان المختلفة اي انها لديها عمى الوان Colorblind ، لكن اللون الرمادي و الاحمر أكثر جاذبية يفضلان في تحضير الطعوم السامة.

لايتعدى مدى الرؤية في الجزد النرويجى 9 متر ولكن يميز الهيئات البسيطة الأشكال ومدى الرؤية في الفار المنزلى 13 متر.





### "الإبصار في القوارض"

حاسة اللمس: من أقوى الحواس لدي الفأر وذلك عن طريق الشوارب الطويلة الموجودة في الوجة قرب الانف وكذلك عن طريق هذه الاجزاء تستطيع الفئران ان تتحسس طريقها وتصل الي جحورها وكذلك ان تتعرف على الاشياء المحيطة بها .



### "الشوارب في القوارض"

حاسة التذوق: تماثل حاسة التذوق في الانسان حيث انها تستطيع ان تميز الكيماويات ضعيفة التركيز وعن طريق هذه الحاسة تستطيع ان تتحري بدقة عن المواد الغير مألوفة في غذائها دون ان تتناولها واذا ابتلعت شيء منها فانه لا يمكن اعاتها والتخلص منها من معدتها حيث لا تستطيع أن تتقيأ . أما إذا اكتشفت هذه المواد الغير مألوفة وما زال الطعام في الفم قبل دخوله المعدة فتستطيع ان تلفظه عن طريق الفجوة الموجودة بين القواطع والضروس.



"التذوق في القوارض"

حاسة السمع: قوية جدا وتتفوق حاسة السمع في الفئران عنها في الإنسان وتستطيع الفئران ان تكشف اي ضوضاء عن طريق حاسة السمع القوية فتفر هاربة من اي خطر يقترب منها و هي تستطيع تميز الاصوات التي يزيد ترددها عن 20 الف ذبذبة في الثانية الواحدة. وهناك العديد من الأجهزة التي تحدث أصوات ذات تذبذب عالي ( موجات فوق صوتية ) تستخدم في طرد الفئران نتيجة لفرعها ولقد أجريت العديد من الدراسات لدراسة مدي تأثير الفئران بالصوت الناتجة من هذه الأجهزة و أثبتت هذه الدراسات عدم جدوي مقاومة الفئران بهذه الوسيلة حيث قد اعتادت الفئران على هذه الأصوات بعد مدة وأقبلت على المواد الغذائية القريبة من هذه الأجهزة دون ان تؤثر عليها بشيء.



### "قوة السمع في القوارض"

حاسة الشم: قوية جدا وتلعب دورا هاما في حياة هذه الحيوانات وهناك بعض الشواهد التي تدل على أن تستطيع أن تميز وتتجنب رائحة الإنسان

ولكن استجابتها لرائحة الإنسان لا تستمر طويلا حيث إنها لا تستطيع ان تميز رائحة الإنسان عن طريق اليد في الطعوم والمصايد بعد مدة ، أيضا تستطيع تمييز رائحة المصائد المصتاده فئران من قبل، ولذلك يجب الاهتمام بعمليات غسل المصائد للتخلص من رائحة الإنسان بها او غيرها ولقد أثبتت المشاهدات الحقلية أثناء استخدام المصايد في عمليات المكافحة والتجارب العملية ان الفئران تقبل على المصايد المغسولة أكثر من المصائد الغير مغسولة.



"حاسة الشم في القوارض"



## الاختباء

تتميز القوارض بظاهرة الاختباء خوفاً من الانسان او الاعداء الحيوية فتتخذ الاغراض المنزلية مخبأً لها لتبدأ بناء مأواها للتحرك منه للبحث عن الغذاء او الماء.





## "حاسة الاختباء في القوارض"

### القدرة على التسلق

جميع أنواع الفئران والجرذان لها القدرة على تسلق الحوائط رأسيا إذا كان سطحها خشنا ويعتبر الجرذ المتسلق *Rattus rattus* من أقدر الأنواع على التسلق فهو نشط الحركة ولا يجد صعوبة في التنقل عن طريق المواسير حيث يتسلق الأسلاك والمواسير سواء من داخلها أو خارجها . وجدير بالذكر أن الفئران المتسلقة تتميز بطول الذيل عن الجسم كما شرح سابقا وذلك ليساعد الجسم في عمل إتران أثناء التسلق كما أنها تمتاز بوجود وسادة في



الناحية البطنية للأرجل، هذه الوسادة تساعد في تفريغ الهواء بين الأرجل  
والمبني فتعمل على إلتصاق الأرجل





## "القدرة على التسلق في القوارض"

### القدرة على القفز

يعتبر الجرذ المتسلق *Rattus rattus* من أقدر الأنواع على القفز حيث يمكنه

القفز لمسافة 1 متر رأسياً وبقفز أفقياً لمسافة 1.2 متر على السطوح

المستوية أمام الفار النرويجي فيستطيع ان يقفز رأسياً لمسافة 60 سم

وتقفز الفؤبرات رأسياً لمسافة 30 سم .



## "القدرة علي القفز في القوارض"

### القدرة علي العوم

تختلف مقدرة الفئران علي العوم باختلاف الانواع حيث يعتبر الفار النرويجي اكثر الانواع مقدرة علي العوم حيث يستطيع ان يعوم لمسافة 800 متر ، يليه الفار المتسلق و فار المنزلي ويمكن للفئران النرويجي ان يدخل المنازل عن طريق مواسير المياه والمراحيض.

عادات التغذية

أغلب أنواع الفئران تعتبر كائنات التغذية Omnivorous حيث تأكل أي نوع من

أنواع الغذاء الذي يصادفها و إن كل نوع من الفئران له ما يفضله من بعض

أنواع الأغذية. فمثلا

الفأر النيروبيجي يفضل الطعوم الحيوانية و مخلفات و بقايا أطعمة الإنسان

الفأر المتسلق والنيلي يفضل الأطعمة النباتية والحبوب والثمار والخضروات

الفأر المنزلي يأكل كل ما يقابله مع الميل للتغذية علي الحبوب



**"قدرة القوارض علي التغذية"**

### النشاط العدواني للفئران

تتصف الفئران بأنها عدوانية وشرسة حتي مع الأفراد من نفس نوعها وخاصة عندما يتزايد أعدادها وتصبح في حالة تنافس على الغذاء والمأوي فقد تقتل بعضها البعض وتصبح عصبية ويقوم الذكور المتسلطة بطرد الذكور الأخرى المفضلة لهم وقت ما يشأون بينما يتناول الفئران الأقل قوة طعامهم في غياب الفئران الأكثر قوة .





## "النشاط العدواني للقوارض"

### التكاثر

هل تعلم ان الزوج الواحد من الفئران له القدرة علي التكاثر بمعدل 2000

فار وهذا العدد الذي يكون خياليا ينتج عن الحقائق التالية :

يعمر الفأر حوالي سنه و نصف.

يتكاثر الزوج الواحد من الفئران حوالي 5- 8 مرات في السنة.

بعد ثلاثة اسابيع ينتج عن هذا التكاثر عشرة فئران صغيرة و تشكل الاناث

عادة نصف هذا العدد.

بعد سعة سبعة اسابيع من ولادة الفار تصبح له القدرة علي التكاثر.

وعلي هذا النحو من التصاعد الهندسي يمكن للزوج الواحد من الفئران

ان ينتج اكثر من الفين فرد خلال عام واحد و تعتبر الفئران من الاعداء

الانسان و التي يمكن ان تقضي عليه لولا وجود اعدائها في الطبيعية كالققط

و الكلاب و العصافير و الافاعي و كذلك ارتفاع نسبة الوفيات الناتجة من

الانقراض و الامراض

يقدر تعداد الفئران بالدول المتقدمة بفار لكل شخص وقد يصل هذا التعداد

الي الضعف او اكثر في بعض الدول الأخرى اذ يصل في الهند الي اكثر من

5 فئران لكل شخص هذا في نهاية القرن الماضي و في القرن الحالي تقدر

أعداد القوارض بأنها أكثر من عدد نفوس البشر اذ يعتقد انه في الهند يوجد

أكثر من 5 مليار قارض وفي البرازيل أكثر من 3مليار قارض ويوجد في

شبكات الأنفاق تحت الأرض في المدن الألمانية 120مليون قارض وفي

مدينة نيويورك لوحدها 8 مليون قارض كما يقدر عدد الجرذان والفئران ب

17 مليار قارض أي بمعدل 4 قوارض لكل إنسان.





## "التكاثر في القوارض"

ويتأثر نشاط الفئران البيولوجي وتكاثرها بالاتي:



التغيرات الموسمية: حيث يبدأ التكاثر عقب موسم معين فنجد مثلا الغار النيلبي ينمو و يتكاثر بشدة حيثما وجد الطعام المناسب و الماء و الماوي و ذلك خلال موسم الربيع و الخريف و يقل تعدادها في الشتاء

مراحل نمو النباتات: حيث نجد مثلا يزداد تكاثر الفئران و تعدادها في مرحلة نضج حبوب القمح و تكوين الحبوب و بمجرد الحصاد تظهر اعداد كثيفة من الفئران لتهاجم المحاصيل الصيفية التي سوف تزرع بعده.

العمليات الزراعية: حيث تعتبر الفئران سريعة الاستجابة لأي تغير يطرأ علي المنطقة أو البيئة المحيطة بها، فمثلا عمليات النظافة أثناء الزراعة قد تكون من اهم العوامل التي تحد من تكاثر الفئران ، حيث أنها تؤدي الي حرمان الفئران من الغذاء و الماوي فنجد مثلا ان عمليات التخلص من سفير القصب من اهم العوامل التي تحد من تكاثر الغار المتسلق داخل حقول القصب نوع المحصول: حيث وجود أكثر من نوع من المحاصيل التي تتضج في اوقات مختلفة تهيئ بيئة مناسبة للفئران حيث يؤدي ذلك الي توفير الغذاء دائما حيث تهاجر الفئران عقب حصاد محصول معين الي محصول اخر

نوع الغذاء بالمنطقة

وجود اكثر من نوع للفئران في المنطقة الواحدة في نفس الوقت و مع اتباع طريقة معينة في عمليات المكافحة المتخصصة لنوع معين قد تؤدي الي زيادة اعداد الانواع الأخرى المنافسة له في المنطقة.

### ظاهرة التجنب

شديدة الحذر حتى لا تقبل علي الأكل الجديد في جماعة و لكن يقبل أكبرها في الغالب ( لأنه أكثر جوعا بسبب كبر حجمه) أو أشدها تضحيه و ذلك بعد مناورات كثيرة ، و ينتظر الباقيون قليلا حتى تتأكد من الأمان، أما مات الفأر المقدم فإنها تقرر عدم الإقتراب من هذا الطعم و تبقى رائحته في ذاكرة الفأر لمدة 6 أشهر (قوة ذاكرة الفأر 6 أشهر) لذلك نضع الطعم أولا بدون مييد ثم نضع نفس الطعم بالمبيد في الليلة التالية ولذلك لا يفضل إستخدام المبيدات سريعة المفعول إلا في حالة الكثافة العالية.



"ظاهرة التجنب في القوارض"

11. إنقلاب الفئران الدموي

تحفر الفئران البرية جحور ذا منعطفات كثيرة يمينا ويسارا وصعودا ونزولا، و  
بجحورها ابواب كثيرة وللغفران رئيس يخرج من البيت اولا ويرى الفضاء فاذا  
لم يكن عدو صاح حتى تخرج الفئران كلها . والعجيب انه اذا رأى الرئيس  
عدوا صاح بأعلى صوته حتى ترجع الفئران الى بيوتها فان حدث وغفل  
الرئيس حتى اتى العدو واخذ منها او اطاح منها ، اجتمعت الفئران كلها على  
الرئيس واكلته ( انقلاب دموي )





### "كثافة العشيرة وشراستها في القوارض"

#### المدى الحركي للفئران

تتجنب الفئران الأماكن المكشوفة حيث يكون مسارها في الأماكن المختبئة ويجوار الحوائط و تحت العوائق و يختلف المدى الحركي للفئران للبحث عن الغذاء باختلاف أنواعها و لكل نوع من الفئران مجاله الحركي و عموما فإن الفأر النيروجي يتحرك في حدود دائرة قطرها 15 متر و هو المدى الحركي من الجحر إلى أماكن وجود الغذاء. و يقل المدى الحركي لفأر المنازل عن



ذلك أما الفأر النيلبي فقد يصل المدى الحركي له أكثر من 27 متر كما أن الفأر المتسلق يعتبر من الفئران الرحالة للبحث عن الغذاء و المآوي فيمكنه أن يتجول أكثر من ذلك. و علي كل فإنه تحت ظروف معينة يكون فيها الفأر مجبراً علي الهجرة نتيجة حدوث فيضانات أو كوارث أو عندما يخرج الفأر البالغ لبحث لنفسه عن موطنًا آخر فيمكنه في هذه الحالة أن يتحرك لمسافات أبعد من ذلك.




"المدى الحركي في القوارض"

## الهجرة

تهاجر هذه الحيوانات على هيئة تنقلات كلية وجزئية في بعض مواسم السنة و حسب درجة توافر الغذاء في المكان الذي تعيش فيه.

## المسكن

يعيش الفأر في جحور في التربة و حول الأجران و المخازن و تحت أجوله الحبوب في الشون و المستودعات و المخازن أو في أسقف المنازل الريفية و تصنع الفئران مخازن لنفسها تخزن فيه ما تحصل عليه من غذاء و تحتفظ به لفصل الشتاء أو للأيام التي تسوء فيها الظروف الجوية أو في حالة عدم توفر الغذاء. وتتكون مساكن الفئران من ممرات تحت سطح الأرض و حجرة للمعيشة و حجرة لتخزين الطعام، فلو أخذنا مثال لجحر الفأر النيلبي نجد أنه يتكون عادة من عدة مداخل للاختباء السريع و الهروب و أنفاقه يتراوح طولها ما بين 2-8 متر بقطر 4سم و حجرة للمعيشة بعرض حوالي 25 سم على عمق 50 سم في الشتاء و 15 سم في الصيف ثم يليها حجرة لتخزين الغذاء.



## "توزيع الجحور في القوارض"

### اماكن تواجد الفئران

تختلف انواع الفئران باختلاف الاماكن فمثلا

الفأر المتسلق يتواجد في حدائق الفاكهة و مزارع النخيل و حقول الخضروات و مزارع الدواجن و كذلك حقول القصب و خاصة قبل كسر القصب مباشرة حيث يعمل عشوش من سفير القصب، علاوة على تواجده في المخازن و

الشون و المنازل



الفأر النرويجي يتواجد غي الاماكن الرطبة الغني بالمواد العضوية مثل مقالب القمامة وفي مزارع الانتاج الحيواني وكذلك في مزارع الدواجن والمذابح وبجانب ضفاف نهر النيل احيانا.

الفأر النيلبي و يكثر انتشاره بجوار قنوات الري و الجسور والترع المطهرة حيث يسكن المناطق العشبية

الفأر الشوكي و يكثر تواجده في المباني و المنازل والشون و المخازن وقد يتواجد احيانا في المناطق الصحراوية و المقابر و الكهوف

الفأر المنزلي يكثر تواجدها في المنازل و الشون و المخازن و قد لوحظ تواجدها في مزارع قصب السكر في الوجه القبلي وكذلك بعض الزراعات الحقلية و الخضار في الوجه البحري

ويسكن الفار النرويجي و النيلبي الجحور ، اما الفار المتسلق فيصنع اعشاشا يعيش فيها و تصنع فؤيرة المنازل اعشاش علي هيئة كرات مجوفة من الاوراق و الاقمشة في الاماكن المختبئة و المظلمة

اما الفأر الشوكي فيعيش في سرايب تحت سطح التربة.

## التعرف على وجود الفئران واستكشافها

ان عملية الفحص التي تجري قبل البدء في وضع اي برنامج مكافحة للفئران في مكان ما من العمليات الضرورية والتي عن طريقها يمكن التعرف على أنواع القوارض الموجودة في المكان ومدى كثافة الفئران الموجودة ونظام توزيعها في المكان وهناك العديد من الطرق والعلامات التي يمكن بواسطتها الاستدلال على ذلك ومنها :

❖ مشاهدة الفئران نفسها : متجولة وعلى الترع والمصارف والجسور وهذا يستلزم مراقبتها بعد الغروب مباشرة او في الصباح الباكر حيث كان يلاحظ تجوال الفئران في هذه الفترات.



## "مشاهدة القوارض"

### ❖ جحور الفئران

تحفر القوارض الجحور لتأوي إليها وتختبئ عن عيون أعدائها وتخزن قوتها وتتخذ هذه الجحور حوالي المباني والمستودعات أو الحقول أو حواف الأنهار والقنوات ، وتتكون من نفق رئيسي وقطره يناسب حجم الحيوان ويتفرع عن النفق الرئيسي أنفاق جانبية يؤدي بعضها إلى تجاويف مستديرة أو بيضاوية تستخدم لوضع الصغار أو للراحة والنوم والاختباء. ويحفر الفأر جحره بواسطة القواطع الأمامية ومخالب الطرفين الأماميين ويستخدم الأطراف الخلفية لدفع التراب إلى الخلف. أما جرد الموائئ أو جرد الأسقف فيبني أعشاشه على السقوف وتكون مؤلفة من بقايا المواد المهترئة كالملابس الممزقة والورق والقطن.

وتختلف شكل وطبيعة هذه الجحور باختلاف أنواع الفئران وكذلك المحاصيل

القائمة كالآتي:

بالنسبة للفأر النيلي فيقوم بحفر جحور على حافة الترع والمصارف والجسور المجاورة للمحاصيل الزراعية وقد يقوم بعمل الجحور على حافة المسابي الصغيرة والتي تتخلل الأراضي الزراعية أو تحت أشجار النخيل داخل الأراضي الزراعية وأحياناً يقوم بعمل هذه الجحور داخل الأراضي الزراعية على حافة البتون وقد لوحظ في مزارع القصب ان *الفأر النيلي* يصنع أعشاشاً من السفير داخل هذه المزارع .

*الفأر النرويجي* يعمل جحور في مستوي سطح التربة ويكون قطر الجحور حوالي 8 سم وتوجد هذه الجحور في مقابل الزبالة والمناطق التي يكثر بها المواد العضوية مثل مزارع الدواجن وحظائر الحيوانات فقد لوحظ ان الفئران تعمل جحور حول أسوار هذه الحظائر وكذلك حول أماكن تخزين العلف .

*الفأر المتسلق* يصنع أعشاش من القش وسفير القصب وأوراق النخيل وكذلك يعمل هذه الأعشاش من الورق ومخلفات مزارع الدواجن داخل حوائط الألمونيوم الموجودة داخل العنابر .

الفأر المنزلي يصنع أعشاش على هيئة كرات مجوفة من الأوراق والأقمشة وذلك داخل الحوائط والأرضيات والحواجز الخشبية .

## الفأر الشوكي يعيش في سراديب تحت سطح الأرض.







### "شكل الجحور في القوارض"

❖ الممرات والعلامات التي تتركها الفئران Run & Smeers





"علامات تسببها القوارض"

تصنع الفئران ممرات وطرق معينة وذلك أثناء خروجها وعودتها من وإلى الجحور الخاصة بها تاركة علامات وراءها مثل آثار أقدامها وعلامات الذيل ويمكن من هذه الممرات إلى حد ما تمييز أنواع الفئران كالتالي :

*الفأر النيلي* ممراته تكون واضحة فوق الحشائش و بالقرب من الجحور وبسهل تمييزها

*الفأر النرويجي* يعمل ممرات مميزة خارج المباني سواء على الأرض او على النخيل وهذه الممرات غالبا ما تكون قريبة من اي غطاء او تحته ويمكن الاستدلال على هذه الممرات من بعض العلامات التي تتركها الفئران مثل

اللطخات الدهنية السوداء Black greasy smear

الفئران المتسلقة يصعب على هذه الانواع من الفئران تمييز ممراتها حيث تميل الى التنقل عن طريق المواسير والكابلات وان كان من السهل تمييزها على النخيل أثناء تسلقها حيث يلاحظ وجودها على ساق النخيل والأشجار *الفأر المنزلي* ويمكن تمييز ممراته عن طريق البقع السوداء التي توجد على الأسطح التي تعترض سير الفئران .



ملحوظة :

يوجد على جسم الفئران غدد مسئولة عن إفراز البقع الدهنية السوداء

وتسمى هذه الغدد *Loop smear*.

يمكن إظهار آثار الفئران بعمل جينات صناعية وذلك بنثر التراب الناعم او بودرة التلك أو الرمل الناعم او مسحوق الفحم على الأرض لإظهار آثار الارجل والذيل حيث يظهر الأربع أصبع الخاصة بالقدم الأمامية والخمسة أصبع الخاصة بالقدم الخلفية .

❖ براز الفئران Droppings

يعتبر براز الفئران من الاشياء الهامة للاستدلال على وجود الفئران في الجحور او في اي منطقة معينة فعن طريق هذا الذيل يمكن معرفة اذا كانت الجحور عمالة او غير عمالة فإذا كان البراز طرى لامع يدل على ان الفئران ما زالت تعيش في هذه الجحور اما اذا كان البراز جاف ولونه قاتم فيدل على ان هذه الجحور غير عمالة .

كما انه يمكن تميز انواع الفئران عن طريق البراز حيث يختلف البراز باختلاف أنواع الفئران فمثلا:


*الفأر المتسلق* : يبلغ طول البعيره حوالي 0.5 بوصة وبأخذ شكل موزة تكون مقوسة.

*الفأر النرويجي* : يبلغ طول البعيره حوالي 4/3 بوصة أنبوبي الشكل وغير مستدقة.

*الفأر النيلبي* : كبيرة الشكل ومغزلية ومستدقة من الأطراف وفي مجاميع.

*الفأر المنزلي* : بعيراته صغيرة جدا حوالي 4/1 بوصة غير منتظمة الشكل .

وجود احجام مختلفة من البعيرات من نفس الشكل يدل على وجود اعمار مختلفة من الفئران وعدد البعرات الموجودة لا يعطي في اغلب الاحيان على تعداد الفئران في المنطقة وكذلك فان عدم وجودها لا يدل على عدم وجود اصابة



## "انواع البراز في القوارض"

❖ علامات التلف التي تحدثها الفئران أثناء تغذيتها : Signs of damage

قرض الاشياء والأكياس وتمزيقها وبعثرة محتوياتها، تناثر قطع من البراز و وجود آثار بول و ووجود رائحة مميزة.

يختلف مظهر التلف الذي تحدثه الفئران على الحبوب والثمار باختلاف انواع الفئران والمحاصيل المختلفة فمثلا التلف الذي تحدثه الجرزان يمكن تمييزه

بسهولة عن التلف الذي تحدثه الفئران الصغيرة حيث ان فؤيرة المنازل تقترض الحبوب حول محورها الطولي تاركة أجزاء صغيرة كالفتات بجانب المقروضة اما الجرزان تؤكل أنصاف الحبوب تاركة الأنصاف الاخري مختلطة بأجزاء صغيرة من الحبوب او وجود قروض في الصناديق أو الأثاث أو الأعمدة

❖ أصواتها خاصة أثناء القرض

❖ وجود لطخات دهنية سوداء على الجدران أو الأسقف أو الممرات

❖ وجود آثار الأقدام والذيل على الأماكن المغطاة بالتراب

### الاحكام المتعلقة بالفأر

#### حكم الفأر من حيث الطهارة والنجاسة

ذهب المالكيّة والشافعيّة والحنابلة إلى أنّ الفأر طاهر ذلك أنّ المالكيّة يقولون بطهارة الحيوان الحيّ مطلقاً ، قال الدسوقيّ : ولو كافراً أو كلباً أو خنزيراً أو شيطاناً . وقال النوويّ : الحيوان كلّ طاهر إلاّ الكلب والخنزير والمتولّد من أحدهما . وفي مطالب أولي النهى : وما لا يؤكل من طير وبهائم

مما فوق هرّ خلقةً نجس ، وأما ما دون ذلك في الخلقة فهو طاهر ، كالنمس ، والنّسناس ، وابن عرس ، والقنفذ ، والفأر . وذهب الحنفيّة إلى نجاسة الفأر ،

### حكم الخارج من الفأر

اختلف الحنفيّة في بول الفأرة وخرئها ، ففي الخائيّة : إنّ بول الهرة والفأرة وخرئها نجس في أظهر الروايات ، يفسد الماء والثوب ، ولو طحن بعر الفأرة مع الحنطة ولم يظهر أثره يعفى عنه للضرورة.

وقال الحصكفيّ : بول الفأرة طاهر لتعدّر التّحرّز عنه ، وعليه الفتوى . وخرؤها لا يفسد ما لم يظهر أثره ، وفي الحجّة : الصّحيح أنّه نجس وقال ابن عابدين : والحاصل أنّ ظاهر الرواية نجاسة الكلّ ، لكنّ الضرورة متحقّقة في بول الهرة في غير المائعات ، كالثياب ، وكذا في خراء الفأرة في نحو الحنطة دون الثياب والمائعات ، وأما بول الفأرة فالضرورة فيه غير متحقّقة .

### أكل الفأر



### "القوارض كغذاء"

ذهب الحنفيّة والشافعيّة والحنابلة إلى أنّه لا يحلّ أكل الفأر ، قال المحلّيّ من الشافعيّة : لحرمة سببان : النهي عن أكله ، والأمر بقتله فقد ورد عن النبيّ صلى الله عليه وسلم : « خمس من الدوابّ كلّهنّ فاسق يقتلن في الحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور » .

وعند المالكيّة قولان : قول بالحرمة كمذهب الجمهور ، وقول بالكراهة

قتل الفأر



### "المصيصة القاتلة للقوارض"

اتفق الفقهاء على جواز قتل الفأر في الحلّ والحرم ، للمحرم وغيره ، لما روى نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ، أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « خمس من الدّوابّ من قتلهنّ وهو محرم فلا جناح عليه : العقرب ، والفأرة ، والكلب العقور ، والغراب ، والحدأة » .

## أسباب الزيادة في أعداد الفئران في مصر في السنوات الأخيرة:



"الكثافة للقوارض"



عمليات تطهير الترع والمصارف وعدم إزالة نواتج التطهير واستخدامها في أغراض أخرى مما أدى إلى تراكم هذه النواتج على جانبي الترع والمصارف واستخدام الفئران لها كماوي مثال على ذلك مصرف المحيط الذي يمتد من محافظة المنيا إلى محافظة بني سويف والذي كان يتواجد عليه العديد من الفئران وكذلك مصرف بحر البقر ومصرف فاقوس بالشرقية.

التركيب المحصولي المتبع في مصر والذي لا يسمح بخلو الأرض من الزراعات على مدار السنة مما يتيح الغذاء للقوارض طول السنة بدون انقطاع فلقد كان في الماضي فترات تخلو فيها الأرض من المحاصيل الشتوية والصيفية أو العكس تجهز فيها الأرض وتجري عمليات الخدمة استعداد للمحصول القادم أما حالياً في مصر يزرع عروات من الخضار أو حتى محاصيل أخرى بين هذه المواسم.

قلة الأيدي العاملة لإجراء عمليات حصاد المحاصيل مما يؤدي إلى تركها فترة طويلة في الأرض طوال هذه الفترة فلقد لوحظ في العديد من المناطق

على سبيل المثال تركهم لمحصول القمح بعد حصاده في الأرض أو الأجران لمدة طويلة بدون عمليات الدراس أو نقل المحصول الي المخازن.

سوء عمليات التخزين في مصر وعدم تطوير أساليب التخزين حيث تخزن الحبوب في الشون في العراء مكشوفة مما يسهل للقوارض ان تحصل على غذائها وتجد لنفسها مأوي جيد دون عناء.



"جرذ بمخزن غلال"

التوسع العمراني واستغلال الارض الزراعية واستخدامها في البناء حيث استغلت تقريبا المساحة الزراعية في البناء وإقامة المباني وسط الأراضي الزراعية أعطى الفرصة للعديد من الأنواع التي كانت تعيش في المباني فقط ان تعيش وتهاجم المحاصيل الزراعية مثل المنازل ولقد ظهرت هذه المشكلة بوضوح في محافظة السويس حيث تتواجد منازل الفلاحين ومزارع الدواجن الأراضي الزراعية وبالتالي أعطى الفرصة لقوارض المنازل التي كانت تعيش فقط في المنازل أن تهاجم المحاصيل الزراعية وتعيش بها. استخدام المبيدات الحشرية بصورة مكثفة أدى الي القضاء على العديد من الأعداء الحيوية الخاصة بالقوارض مثل الطيور الجارحة.

إن من أهم أسباب تزايد القوارض في مصر هو إهمال المزارع لأرضه وعدم الاهتمام بعمليات الزراعة الحديثة حيث أصبحت الزراعات التقليدية لا تعطي العائد المنشود منها مما جعل المزارعين يتجهون الي أعمال أخرى أكثر ربحا وفائدة له مثل العمل في المشاريع المختلفة وهذا بدوره أعطى الفرصة للقوارض ان تتزايد وتتكاثر.

الإهمال في صيانة المصارف التي أقامت الدولة العديد منها في أماكن عديدة دون الاهتمام بصيانتها وبالتالي ادي ذلك الي زيادة الأملاح في التربة وأصبحت غير صالحة للزراعة وبالتالي أصبحت مرتعا للقوارض لعمل جحور فيها ومهاجمة المحاصيل المجاورة لها.

### **الباب الثالث الأهمية الاقتصادية للقوارض**

تعتبر القوارض من أخطر الحيوانات التي تؤثر في الإقتصاد العالمي فهي تسبب فقد وإتلاف المواد الصناعية والمحاصيل في الحقل والأجران والمخازن، وهي تستطيع أن تحيل عشرة أمثال ما تستهلكه من حبوب إلى مالا يصلح للإستهلاك الآدمي. وفضلا عن ذلك فان الفئران والجرذان تقرض كل ما يصادفها من غذاء أو ملابس أو مفروشات أو أثاث أو غير ذلك.

وتتقسم الخسائر التي تسببها القوارض الي:

#### **➤ الأهمية الاقتصادية للقوارض "من الناحية الزراعية"**

1- مباشرة ( فقد للمحاصيل في المخزن )

يستهلك الفأر غذاء يومي يعادل 10% من وزنه مما يسبب خسائر عالية  
لمخزون الحبوب والمواد التمويية .



### "أضرار الفئران المباشرة"

2- غير مباشر (قرض الحبوب - بول - ذبل - شعر- مسببات امراض)



**"أضرار الفئران الغير مباشرة"**



وهو عبارة عن التلوث الذي تحدثه للمخزون الغذائي + نمو بعض الفطريات  
الرمية على بقايا آكل القوارض. ونذكر أمثلة متعددة لبعض الخسائر التي  
تسببها الفئران:

تلوث المواد الغذائية و تكاليف إصلاح أدوات الانسان المدمرة.

"تلوث الفئران للمواد الغذائية"

إتلاف الأثاث الخشبي والبلاستيكي والأدوات المنزلية والملابس.

"إتلاف الفئران للخشب والادوات المنزلية"

قرض مواشير الرصاص، والألومنيوم، وكل ما هو قابل للقرض.





### " إتلاف الفئران لمواسير وكابلات الكهرباء "

في مصر بلغت نسبة الإصابة في مصر عام 1982 في بعض محاصيل الحبوب النجيلية حوالي 30 % و بلغت نسبة الخسائر في محافظة المنيا بمحصول القصب 50% عام 1982 وفي قرية طوخ الخيل مركز المنيا في نفس الفترة فإن الفئران كادت تقضي علي المحصول تقريبا.



بالنسبة للمحاصيل الحقلية القائمة في الحقل فان الفئران تهاجمها في جميع مراحل نموها منذ وضع البذور في التربة حيث تقوم بالحفر عليها والتهاجمها مما يؤدي إلى إعادة زراعتها مرة ثانية وتأخير نضج هذه المحاصيل وبعد ذلك تقوم بتقطيع السيقان والتغذية عليها وتستطيع النباتات في هذه المرحلة ان تقوم بعمليات التجديد وتظهر ثمرات حديثة تعطي محاصيل ضعيفة عرضة للإصابات الحشرية وعندما تصل النباتات الي طور النضج فإنها تلتهم الحبوب حيث تقوم بتقطيع سنابل القمح والشعير والأرز والتغذية على الحبوب وفرطها في الأرض مما يؤدي الي ضياع حوالي 15% من المحصول قبل حصاده.

ولقد وصلت نسبة الإصابة في عام 1982 في بعض محاصيل الحبوب النجيلية الي حوالي 30% وقيل ان المشروع المصري الألماني لمقاومة جرد الحقل في تولي مهامه في القضاء على الفئران . أما بالنسبة لمحصول قصب السكر فان الفئران تبدأ في مهاجمته منذ بدء الزراعة حيث تقوم بالنبش على العقل المزروعة والتهاجمها كما تقوم بمهاجمة النموات الحديثة والقضاء عليها وحين وصول القصب الي مرحلة نموه الأخيره وفي اوائل شهر اكتوبر فإنها

تسكن داخل زراعات القصب وتعمل أعشاش من القش وجحور وتهاجم السلميات العليا والسفلي مما يؤدي الي ضياع نسبة كبيرة من المحصول تؤثر على كمية السكر الناتجة.

وقد وجد أيضا في بعض المحافظات مثل المنيا أن نسبة الخسائر في بعض الحقول وصلت الى 50% حيث لوحظ عام 1982 في قرية طوخ الخيل بمركز المنيا أن الفئران قد قضت تقريبا على المحصول.

بالنسبة لحدائق الفاكهة فان الفئران تهاجم قلف الأشجار ويقف سريان العصارة مما يؤدي الي موت النموات الحديثة كما تهاجم الثمار وتؤدي الي فقد نسبة كبيرة من المحاصيل فعلي سبيل المثال وجد أن هناك بعض مزارع العنب في محافظة بني سويف والمنيا قد قضت عليها الفئران تقريبا وذلك عام 1982 ، 1983 حيث كانت تقوم بتقطيع عناقيد العنب والتغذية عليها وتفريطها في الأرض وكذلك كان الحال في حدائق النخيل في محافظة الجيزة والفيوم وأيضا في مزارع الموالح والتفاح والكمثري كانت الخسارة كبيرة في العديد من المحافظات.





### "أعراض الإصابة بالقوارض فى مشاتل الفاكهة"

بالنسبة للخضر فان الفئران تهاجم المحاصيل وهي فى طور النضج حيث كانت الخسائر عالية فى محاصيل الطماطم والفراولة والبطيخ والشمام وغيرها.







### "أعراض الإصابة بالقوارض على ثمار الخضروات"

بالنسبة لمخازن الغلال والشون فان الفئران تهاجم الحبوب سواء كانت معبأة في زرائب أو مكومة على الأرض وتؤدي إلى نسبة فقد كبيرة قد تصل 5 % علاوة على تلوث هذه الحبوب ومنتجاتها ببول وبراز الفئران مما يفقدها الكثير من قيمتها الاقتصادية وقد تصبح غير صالحة للاستعمال الأدمي.



### "أعراض الإصابة بالقوارض في مخازن الغلال"

و يقدر الفقد الحادث في الحبوب و منتجاتها في مصر بحوالي 45000 طن أي ما يوازي 0.5 % من المستهلك و يصل هذا القدر الي 5.3 مليون طن في الولايات المتحدة الامريكية و هو ما يعادل 3 % من الانتاج و يصل الي 10.5 مليون طن و تقدر هيئة الصحة العالمية الفقد العالمي في تلك المواد بحوالي 33 مليون طن.

وقد قدر انه لو ترك زوج من الفئران النرويجي ليتجول بحرية تامة داخل احد مخازن الحبوب فانه يستهلك حوالي 12 كيلو جراما خلال فصل الخريف و الشتاء علاوة علي انها تودع نحو 25000 بعيه (ذبل الفار) ، 1.5 لتر من البول و كثير من الشعر مما يسبب تلغا كبيرا لمحتويات المخزن.



ففي القرن الماضي قد قدر الباحثون في مدينة بومباي بالهند ان مقدار ما تخزنه الفئران في جحورها كافي لغذاء 300000 مواطن من سكان المدينة البالغ عددهم في هذه الفترة 4.5 مليون نسمة.

و في القرن الحالي تستهلك القوارض سنويًا أكثر من 42.5 مليون طن من الحبوب علما أن هذه الكمية تكفي لإطعام 130 مليون شخص. بلغت الخسائر في إحدى المدن الفلبينية إلى ما يقارب 90% من الإنتاج الكلي للرز و80% من الإنتاج الكلي للذرة وان 20% من الإنتاج الكلي للحنطة يفقد بسبب القوارض.





## "أعراض الإصابة بالقوارض في مخازن الغلال"

و في مزارع الدواجن فان الفئران تهاجم عنابر البيض والتربية وتلتهم البيض وصغار الدواجن و الامهات وتقوم بنشر العديد من الامراض بها ، كما تهاجم ايضا مخازن العلف

تخريب السدود الترابية، وقنوات الري نتيجة للأنفاق التي تحفرها القوارض تحت التربية.

الإضرار بالغابات، حيث تقوم القوارض بالتهام البذور والبراعم وقرض الشتلات وتقشير الأشجار الكبيرة.

احتمالية تقدير 15-20% من مواد الطعام المزروع لا تؤكل بواسطة الانسان وذلك بسبب الضرر الناتج من الفئران



### " أعراض الإصابة بالقوارض في مخازن الغلال "

بالنسبة للمنشآت العامة والمصانع فان الفئران تقوم بقرض الأخشاب وأنايب

المياه والكابلات الكهربائية وصفائح الألمونيوم والحديد في مصانع الحديد

والألومنيوم وكذلك تعمل على تلف الكثير من قطع الغيار في المطارات  
والمصانع.



"أعراض الإصابة بالقوارض في المنشآت العامة"

إحداث حرائق بالمنازل أو المصانع، نتيجة لقيام الفئران بقرض أسلاك  
الكهرباء المغطاة، وقد يحدث الحريق نتيجة قيام الفئران بقرض أنابيب الغاز  
المطاطية. وفي المصانع ذات الضغط العالي تقرض الفئران أسلاك الكهرباء  
فتحدث الأعطال مما يسبب خسائر كبيرة في الإنتاج، وبكفي أن نذكر أن قيام  
الفئران بقرض عوازل الكابلات الكهربائية يشكل السبب الرئيسي لنشوب 15-

20% من الحرائق في اليابان وهو رقم أعلنته شركة "ايكاري" أكبر شركات مكافحة القوارض هناك.

25% من الحرائق تقريبا بسبب الفئران في الولايات الأمريكية عن طريق قرص أسلاك الكهرباء.



"أعراض الإصابة بالقوارض في اسلاك الكهرباء"

وقوع حوادث قطارات مروعة، بسبب قضم أسلاك الكهرباء، مما يؤدي إلى تعطيل أجهزة الحاسوب التي تعتمد عليها حركة هذه القطارات.

النقود و العمالة التي تبذل في عمليات مكافحة الفئران.

**➤ الأهمية الاقتصادية للقوارض من الناحية الصحية ( أهم الامراض التي**

### تسببها القوارض)

من أهم الأمراض التي تسببها الفئران :

لم تكن الهواجس من انتقال الأمراض من القوارض للإنسان حديثة العهد، بل كانت قديمة جداً، فكان الفراعنة يرسمون القط كعدو للقوارض وصديق للإنسان ويتعاملون معه بقدسية عالية. كما أن هناك في العقائد الهندية القديمة بأن القوارض هي مخلوقات لها صفات الآلهة، ولا يزال الآن في معبد (دشنوك) في الهند يعيش أكثر من عشرة آلاف من الجرذان داخل المعبد، يقدم لها الطعام وتكرم، وهذا سلوك وثني واضح. أما في التاريخ البابلي القديم فقد وجد العلماء أن سكان العراق القديم، كانوا يستخدمون القير والزفت في البناء، لا لربط مواد البناء ببعضها، بل لمنع دخول القوارض.

أثبت العلم الحديث أن هناك مجموعة من الأمراض تنتقل عن طريق الجردان، إما عن طريق تناول المواد الغذائية الملوثة بالبراز والأتربة التي تختلط ببول وبقايا القوارض، أو عن طريق التنفس، من خلال تلوث الهواء بذرّات الغبار الملوثة ببقايا القوارض، أو عن طريق كائنات حية وسيطة كالقمل والبراغيث والأكاروسات التي تمتص دم القوارض وتعود لامتصاص دم الإنسان والحيوان.

*ومن الأمراض التي يمكن أن تنتقل للإنسان عن طريق القوارض.*

### ❖ الطاعون: Plague



"أعراض الإصابة بمرض الطاعون"



عرف الإنسان مرض الطاعون منذ أكثر من خمسة آلاف عام، ولكن إحصائيات الموتى منه التي دونت، كانت في عام 522 أو 542 ميلادي، حيث انتشر من مصر إلى ما حولها واستمر ستين عاما قضى خلالها على مائة مليون ضحية. كما أنه انتشر في أوروبا الغربية لمدة خمسة سنوات بين عامي 1345 و1350م وأطلق عليه اسم الموت الأسود وراح ضحيته 43 مليون إنسان. وفي عام 1660م كان عدد الوفيات في مدينة لندن كل أسبوع عشرة آلاف. وفي موسكو عام 1700 كانت الوفيات مشابهة لوفيات لندن، وفي مارسيليا قتل عام 1720 ما يزيد عن 68 ألف إنسان. وفي اسطنبول قتل الطاعون عام 1802 ما يقارب 150 ألف نسمة. وفي الهند عام 1896 انتشر من مدينة بومباي واستمر عشرة سنوات فقتل 3.5 مليون إنسان.

في عام 1894 اكتشف عالمان أحدهما ياباني (Kitazato) والآخر فرنسي (Yersin)، لكن كل على حدا، ودون التنسيق فيما بينهما، بأن هناك علاقة بين الطاعون وبكتيريا اليرسينيا الطاعونية أو سابقاً باستوربلا طاعونية (Yersinia pestis ( Pasteurella pestis)) التي وجدت في دم وإدرار

وبراز القوارض المريضة. وفي عام 1897 وجدت العلاقة للبرغوث كناقل للمرض من القوارض للإنسان. لقد وجد أن هناك 200 نوع من القوارض في العالم تنقل الطاعون، وأهمها الجرذ الأسود والجرذ النرويجي. وتستطيع جرثومة الطاعون البقاء حية لعدة شهور في أعماق الجحور حيث تتلاءم الظروف هناك.

يطلق عليه الطاعون الأسود (الموت العظيم أو الموت الفظيع أو الموت الأسود)، للإشارة إلى وباء الطاعون. الطاعون Plague مرض بكتيري معدي حاد ويُعد من مجموعة الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان. ويُصنف كأحد الأمراض المحجرية الخطيرة التي تسبب أوبئة في حالة عدم السيطرة عليها.

تسبب الطاعون في ذعر ورعب أكثر من أي مرض معدي آخر، وقد تسبب في وفاة ما يقرب من 200 مليون شخص، وقد وضع هذا المرض علامة لنهاية العصور المظلمة وسببا من أسباب تقدم البحث الطبي، وقد تسبب



الطاعون في تفضى عدة أوبئة epidemics كما تسبب في ثلاثة أوبئة ضخمة وشهيرة pandemics شملت مناطق كبيرة وممتدة من العالم.

الأول انتشر من منطقة الشرق الأوسط إلى حوض البحر المتوسط خلال القرن الخامس والسادس وتسبب في مقتل نصف سكان هذه المناطق.

و الثاني ضرب أوروبا ما بين القرن الثامن والرابع عشر, وتسبب في وفاة حوالي 40 % من شعوب أوروبا

و الثالث بدأ من الصين عام 1855 ميلادي وانتشر إلى القارات الأخرى.



"وباء الطاعون"

وقد نجح ألكسندر يرسن Alexandre Yersin في عزل الميكروب المسبب للطاعون واستحدث علاجاً كمصل مضاد للمرض, antiserum, وهو أول من توقع أن تكون البراغيث fleas والفئران هي سبب الوباء وذلك أثناء انتشار وبائي للطاعون عام 1894 وقد سمى الميكروب العصوي الشكل المسبب للطاعون باسم *Yersenia pestis* وقد انتشر الوباء في كل القارات عدا قارة أستراليا.

وهو من أهم الأمراض التي تنتقل للإنسان تلعب القوارض الدور الرئيسي فيها مرض الطاعون الذي يعتبر من أخطر الأمراض حيث أهلك الملايين في العالم والذي أصيبت به مصر منذ عام 1899 - 1940 بصورة متقطعة ثم اقتصر حدوثه منذ عام 1941-1947 في بعض المناطق الساحلية وبسبب هذا المرض بكتيريا *Yersinia pestis* وينقلها أساساً برغوث الفأر الشرقي.

الوضع التقسيمي لبرغوث الفأر الشرقي

شعبة مفصليات الأرجل Phylum: Arthropoda

Class: Insecta (Hexapoda) طائفة الحشرات

Order: Siphonoptera رتبة خافية الاجنحة


*Xenopsylla cheopis* برغوث الفأر الشرقي

الشعرة تخرج من امام العين



"برغوث الفأر الشرقي"

خطأ!



### "بكتيريا Yersenia pestis العصوية"

ينتقل الميكروب إلى الإنسان من خلال عض حيوان مصاب مثل الفئران أو من خلال لدغ البراغيث التي تعيش على أجسام الحيوانات المصابة والتي تشمل أنواع متعددة منها الفئران و القطط و الكلاب المستأنسة و السنجاب و الأرانب و الجمال و الخرفان و يطلق على الحيوانات المصابة لفظ العائل للمرض. أما الحشرات الناقلة فيطلق عليها لفظ الوسيط وهو في العادة

البراغيث التي تعيش على أجساد الفئران وتوجد حشرات أخرى من الممكن أن تنقل العدوى منها القمل والقراد.

كما يمكن انتقال العدوى عن طريق الاستنشاق سواء كان الاستنشاق للرداذ الصادر من الأشخاص المصابين بالطاعون الرئوي أثناء السعال، أو للهواء الملوث بالميكروب الذي يطلق أثناء حوادث إرهاب وفترة حضانة الطاعون بين 15- 67 يوماً في الطاعون الذي يصيب الغدد الليمفاوية والنوع التسممي، وما بين 2 - 4 أيام في الطاعون الرئوي.

الطاعون مرض معد حاد يتميز بحمى مرتفعة مع أعراض تسمم بالدم وصدمة مع هبوط في ضغط الدم وسرعة في النبض مع عدم انتظامه والقلق والإعياء والهلوسة والغيوبة وكثيراً ما يحدث احتقان في ملتحمة العين وقد يصل إلى درجة النزف. ويظهر مرض الطاعون في ثلاثة صور وهي:

الطاعون الدملي Baboeic plague

وهو أكثر شيوعاً وفيه تستقر الميكروبات في بعض الغدد الليمفاوية في الأرب والإبط والعنق ويؤدي هذا إلى التهاب هذه الغدد وتتعمق نوعاً وبمتد التهاب لما حول الغدد فيتكون ما يشبه الدمامل وقد ينصرف أو يتقيح ويحتاج لفتح وقد تسوء حالة المريض ويتحول إلى طاعون تسممي أو طاعون رئوي.

#### الطاعون التسممي Septicaemic plague

وهو نادر الحدوث عن الدملي وفيه تستمر الأعراض العامة السابق ذكرها دون ظهور التهاب الغدد الليمفاوية وتنتهي الحالة غالباً بالغيوبة والوفاة.

#### الطاعون الرئوي Pneumonic plague

وغالباً ما يحدث كمضاعف للطاعون الدملي أو التسممي . ويسمى في هذه الحالة طاعون رئوي ثانوي ونادر ما يحدث كإصابة أولى للمرض ويسمى طاعون رئوي أولى وأهم أعراضه المميزة الالتهاب الشديد والبصاق المدمم.

وبتأكد تشخيص الطاعون باكتشاف المسبب النوعي وهو باسيل الطاعون

Yersinia في عينات من الدامل أو الدم أو البصاق حسب الطاعون.

مستودع العدوي ومصدرها:

المستودع الطبيعي للطاعون هي القوارض البريه Wild rodents وتحدث

بينها أو بينه دورية وقد تنقل العدوى. ومنها الفئران المنزلية في الريف أو

الحضر، حيث تلتقي بالقوارض البريه ومصدر العدوى المباشر للطاعون

الدملي هو البرغوث المعدي وللطاعون الرئوي الرذاذ والبصاق المتطاير من

المرضى بطاعون رئوي.

طرق نقل العدوى:

عندما ينتشر الطاعون بين الفئران فإنه يؤدي إلى وفاة عدد كبير منها فتترك

البراغيث أجسام الفئران وتبحث عن مضيف مناسب فتهاجم الإنسان ويتم

نقل العدوى بالطاعون الدملي في الإنسان بواسطة لدغة برغوث الفأر

المصاب بانسداد في معدته نتيجة تكاثر باسيلات الطاعون التي كانت موجودة

في الدم الذي سبق وامتصه من فأر مريض بالطاعون ونتيجة لهذا الانسداد يرتد جزء من الدم ثانية محملاً بميكروبات الطاعون من معدة البرغوث إلى داخل جسم الإنسان. أما في الطاعون الرئوي فتتم العدوى من المريض إلى مضيف جديد بواسطة الرذاذ الرئوي 3 إلى 4 أيام أو أقل. والطاعون الدملي لا ينتقل من شخص لشخص إلا بعد تحوله إلى طاعون رئوي وتستمر البراغيث معدية لأيام وأسابيع وفقاً للظروف ولا تعيش البراغيث المصابة بانسداد في معدتها إلا من 3 إلى 4 أيام - أما الطاعون الرئوي فهو شديد العدوى وخاصة في الأماكن شديدة الازدحام وسيئة التهوية .

العوامل التي تزيد من خطر التعرض للإصابة بالطاعون Risk factors العيش في المناطق الريفية و خاصة الأماكن التي ينتشر بها الطاعون. العيش بأماكن بها فئران مصابة أو حيوانات أخرى من القوارض والتي تشكل عائلاً للمرض.



المشاركة في أنشطة بالبراري مثل المعسكرات والتنزه سيراً على الأقدام

لمسافات بمناطق الإصابة و النوم بهذه المناطق أو الصيد.

التعرض للدغ البراغيث.

مخالطة مرضى الطاعون.

العمل بمجال الطب البيطري.

أعراض وعلامات الطاعون

ارتفاع بالحرارة

قشعريرة و ارتعاش

آلام و أوجاع بالجسم

ألم بالزور

صداع بالرأس

ضعف عام

شعور عام بالمرض والإعياء

ألم بالبطن

شعور بالغثيان و حدوث قيئ

إسهال أو إمساك وبراز ذو لون أسود

ألم بمنطقة المعدة

سعال

قصور بالتنفس

تصلب بالرقبة

عدم انتظام بضربات القلب و هبوط بضغط الدم

تشوش الذهن و حدوث تشنجات

وجود غدد ليمفاوية ملتهبة ومتضخمة بالمناطق من الجسم القريبة من

مواقع لدغ البراغيث

في مناطق النزف بالجلد يتغير لون الجلد إلى اللون الأسود كما بالصورة



**"تشخيص الطاعون"**

للتأكد من التشخيص يطلب الطبيب عمل اختبار مزرعة لعينات من الدم أو البصاق أو الغدد اللمفية . وقد يطلب الطبيب عمل أشعة على الصدر لمعرفة

هل هناك إصابة للرئتين . وعند ثبوت التشخيص يحتاج المريض مساعدة

الطبيب المتخصص في علاج الأمراض المعدية , كما يتم إبلاغ المراكز

المتخصصة في السيطرة والوقاية من الأوبئة والتي تهتم بأخذ عينات للفحص بالمختبرات وتتعبق مصدر المرض وتتعرف على منبعه وتقوم بعمل الإجراءات الوقائية لمنع الخطر الكامن والذي قد يتسبب في انتشار وباء الطاعون.

### خطورة الطاعون

قد يصاب مريض الطاعون بالالتهاب السحائي meningitis كأحد المضاعفات وقد يصاب أيضا بهبوط شديد بضغط الدم والناشئ من العدوى بميكروب الطاعون septic shock كما قد يحدث موت للأنسجة و نزف أو التهاب الأغشية حول القلب pericarditis وكل ذلك قد يؤدي للوفاة.

### الوقاية من الطاعون

يجب تجنب أماكن تواجد الحيوانات العائلة للمرض - وأهمها الفئران- ويجب التخلص منها ومن الحشرات الناقلة - وأهمها البراغيث- عند تواجد الطاعون.

العزل الإجباري للمريض في أماكن خاصة في المستشفيات حتى يتم الشفاء التام.

يجب تطهير إفرازات المريض ومتعلقاته والتخلص منها بالحرق.

يتم تطهير أدوات المريض بالغلي أو البخار تحت الضغط العالي يتم تطهير غرفة المريض جيدا بعد انتهاء الحالة.

يجب تدقيق ملاحظة المخالطين للمرضى وعند ظهور أي أعراض عليهم - مثل ارتفاع الحرارة أو تورم بالغدد الليمفاوية - يجب البدء في إعطائهم المضادات الحيوية كما يمكن إعطاء المخالطين المضادات الحيوية كإجراء وقائي. و في النهاية الطاعون مرض مميت ينتشر بصورة وبائية، ولكن من المهم أن يعلم الناس الاحتياطات الوقائية لأي مرض قبل حدوثه.

علاج الطاعون

حين يتوقع الأطباء أن أحد المرضى مصاب بالطاعون فإنهم يتخذون الاحتياطات اللازمة لعدم انتقال العدوى إليهم من لبس قفازات ومرايل و أقنعة , كما تتخذ كل الاحتياطات الخاصة بعزل المريض ومنع انتقال العدوى إلى الغير, كما يتم الاستمرار في عزل المريض عن الآخرين لمدة يومين أو ثلاثة بعد إعطاء المضادات الحيوية أو حتى تزول العدوى.

قد يحتاج المريض إلى أكسجين لمساعدته في التنفس.

أغلب المرضى يعانون من انخفاض شديد بضغط الدم بسبب العدوى بميكروب الطاعون مما يتطلب متابعة المتخصصين لهم في وحدة العناية المركزة .

يشمل العلاج أدوية متعددة أهمها المضادات الحيوية تأخذ تحت اشراف الاطباء المختصين

هل يمكن استئصال الوباء

وهذا الوباء على خلاف الجدري ليس من الممكن إزالته أو القضاء عليه أو

استئصاله, حيث يوجد الميكروب حيا في ملايين الحيوانات وبلايين البراغيث التي تعيش على أجسام تلك الحيوانات وأيضا لتواجد الطاعون في الصحراء و السهول أو الوديان والمرتفعات الجبلية و الغابات. وهذا المرض يصيب الحيوان العائل للمرض ويسبب وفاته وبعد وفاته تخرج البراغيث من جسمه لتكون معدية لمدة أشهر لاحقة.

وفي الولايات المتحدة يصاب كل عام حوالي 18 شخص بالطاعون وتكون أغلب هذه الحالات في ولايات الغرب الجنوبي مثل نيو مكسيكو و أريزونا و كلورادو و كليفورنيا و يرجع ذلك إلى وجود نوع من السنجاب بهذه المناطق وهذا السنجاب يسهل إصابته بميكروب الطاعون.

وخارج الولايات المتحدة يصاب حوالي 1600 شخص كل عام ,ومعظم هذه الحالات تكون في تنزانيا ومدغشقر وبيرو وزائير وبورما والبرازيل وأوغندا والصين وفيتنام.



## ❖ التولاريميا Tularemia





### "أعراض الإصابة بمرض التولاريميا"

التولاريميا ويسمى أيضا ب (داء توليري- حمى الأرانب - حمى ذبابة الغزلان-  
الحمى المتماوجة ( deerfly fever ) وهو أحد الأمراض المعدية النادرة

تسببه بكتيريا الفرنسيسلة التولارية (*Francisella tularensis*) اكتُشِف عام 1911 بين السناجب الأرضية و تشمل الأعراض الحمى وقرحة الجلد وتضخم الغدد الليمفاوية من حين لآخر، و قد يحدث نوع من الالتهاب الرئوي أو التهاب في الحلق.

يؤثر المرض بشكل رئيسي على الثدييات، وخاصةً القوارض والأرانب والأرانب البرية، على الرغم من أنه يمكن أن يصيب الطيور والأغنام والحيوانات الأليفة، مثل الكلاب والقطط والهامستر. وتعد القوارض والأرانب من أهم الخازنات للبكتيريا المسببة و ينتشر هذا المرض في كل أنحاء العالم، وهو مرض مميت ، وأكثر فترات تناقله تحدث بين شهري حزيران/يونيو الى أيلول/سبتمبر وتستطيع البكتيريا المسببة للمرض أن تحتفظ بحيويتها بين 247- 530 يوما، وأكثر الإصابات تحدث عند السكان القرييين من البساتين والمساحات المائية.

تنتقل التولاريميا إلى البشر بطرق متعددة، من بينها لدغات الحشرات والقراد والتعامل المباشر مع الحيوانات المصابة وتتسم التولاريميا بأنها مرض شديد الخطورة والعدوى ويُحتمل أن يكون مميتاً، وعادة ما يمكن علاجه بفاعلية باستخدام مضادات حيوية معينة إذا تم تشخيصه مبكراً تحت اشراف الطبيب المختص.

### الأعراض

معظم الأشخاص المعرضين للإصابة بداء التولاريميا يمرضون عادة به في غضون ثلاثة إلى خمسة أيام، على الرغم من أن الإصابة قد تستغرق مدة تصل إلى 14 يوماً. يوجد العديد من أنواع التولاريميا، ويعتمد النوع الذي يصيبك على كيفية دخول البكتيريا إلى جسمك وموضع دخولها إليه. لكل نوع من التولاريميا مجموعة من الأعراض الخاصة به.

### **\*\* التولاريميا الغدية التقرحية**

وهذا النوع الأكثر شيوعاً من المرض . تتضمن العلامات والأعراض ما يلي:  
قرحة جلدية تتكون بموضع العدوى، تكون عادة نتيجة لدغة حشرة أو حيوان

## تورم الغدد اللمفاوية ووجود ألم بها

الحمى

قشعريرة

الصداع

الإرهاق

\*\* التولاريميا الغدية

يعاني الأشخاص المصابين بالتولاريميا الغدية من علامات وأعراض

التولاريميا الغدية التفرحية نفسها، لكن بدون قرح جلدية.

\*\* التولارمية العينية الغدية

يصيب هذا النوع العينين وقد يسبب:

ألم العين

إحمرار العين

تورم العين وخروج إفرازات منها

قرحة على الجزء الداخلي من الجفن

حساسية للضوء

\*\* التولاريميا فموية بلعومية

عادةً ما تحدث نتيجة لتناول لحوم الحيوانات البرية التي لم يتم تسويتها بشكل

جيد أو شرب ماء ملوث، وبصيب هذا النوع الفم، والحلق والجهاز الهضمي.

تتضمن العلامات والأعراض ما يلي:

الحمى

ألم الحلق

قرح الفم

قيء

إسهال

التهاب اللوزتين

## تورم العقد للمفاوية في العنق

### \*\* التولاريميا الرئوية

يسبب هذا النوع من التولاريميا العلامات والأعراض التالية النموذجية في

حالات التهاب الرئة:

سعالًا جاقًا

ألم الصدر

صعوبة في التنفس

يمكن أن تنتشر أشكال أخرى من داء التولاريميا إلى الرئتين.

### \*\* التولارمية الخطيرة

يسبب عادة هذا النوع النادر والأكثر خطورة من المرض:

حمى مرتفعة الحرارة

إنهاكًا شديد

## قيئاً وإسهالاً

طحالاً متضخماً (تضخم الطحال)

تضخم الكبد

الالتهاب الرئوي

متى تزور الطبيب: إذا كنت تعتقد أنك تعرضت لعدوى التولاريميا، لا سيما إذا لدغك حشرة أو قراد (اكاروس) أو تعاملت مع حيوان بري في منطقة ينتشر بها داء التولاريميا وتعاني حمى، أو قرحاً جلدية أو غُدّاً متورمة، فيتعين عليك زيارة الطبيب في أقرب وقت ممكن.

الأسباب

لا يحدث داء التولاريميا بشكل طبيعي في البشر ومن غير المعروف ما إذا كان ينتقل من شخص لآخر أم لا ومع ذلك يحدث داء التولاريميا في جميع أنحاء العالم، لا سيما في المناطق الريفية، لأن العديد من الثدييات والطيور والحشرات تصاب بالفرنسيسية التولارية.



قد يعيش هذا الكائن الحي لأسابيع في التربة والمياه والحيوانات الميتة وعلى عكس بعض الأمراض المعدية التي تنتقل من الحيوانات إلى البشر عبر مسار واحد، فإن داء التولاريميا لديها عدة طرق للانتقال. تحدد كيفية إصابتك بالمرض عادة نوع الأعراض وشدها. بشكل عام، يمكنك الإصابة بداء التولاريميا من خلال:

لدغ الحشرات والاكاروسات. على الرغم من أن العديد من الحشرات تحمل التولاريميا ، فإنه من المحتمل أن تنقل الذباب والغزلان المرض إلى البشر. تسبب لدغات القراد نسبة كبيرة من حالات التولاريميا غدية تقرحية.

التعرض للحيوانات المريضة أو الميتة. قد تتجم التولاريميا الغدية التقرحية أيضاً عن طريق حيوان مصاب، غالباً ما يكون أرنباً أو أرنباً برياً أو فئران. تدخل البكتيريا إلى الجلد عبر الجروح الصغيرة أو السحجات أو لدغة، وتشكل قرحة في مكان الجرح، قد يحدث شكل التولاريميا العينية عند فرك عينيك بعد لمس حيوان مصاب.

البكتيريا المحمولة جواً. قد تصبح البكتيريا في التربة محمولة في أثناء البستنة أو البناء أو الأنشطة الأخرى التي تزعج الأرض. قد يؤدي استنشاق البكتيريا

إلى تولاريميا رئوية. يعتبر عمال المختبر الذين يعملون على تولاريميا أيضاً عرضة لخطر العدوى المحمولة جواً.

الطعام أو الماء الملوث. على الرغم من أنه غير شائع، فمن الممكن الإصابة بالتولاريميا من تناول اللحوم غير المطبوخة من الحيوانات المصابة أو شرب المياه الملوثة. تشمل العلامات قيئاً وإسهالاً ومشاكل أخرى في الجهاز الهضمي (تولاريميا فموية بلعومية).

تقتل الحرارة الفرنسيَّة التُّولاريَّة، لذلك قم بطهي اللحم إلى درجة الحرارة المناسبة بحد أدنى 165 درجة فهرنهايت (73.8 درجة مئوية) لـ اللحوم لجعلها آمنة للأكل.

الصيد ووضع الفخاخ. لأن الصيادين يتعرضون لدم الحيوانات البرية وقد يأكلون لحمها، فإنهم معرضون لخطر الإصابة بالتولاريميا.

أعمال البستنة وتنسيق المناظر الطبيعية. يمكن أن يتعرض العاملون في أعمال البستنة وتنسيق المناظر الطبيعية إلى خطر الإصابة بالتولاريميا. فمن

المحتمل أن يستنشق العاملون في البساتين البكتيريا التي تثار أثناء العمل في تنظيف الاعشاب و التربة .

العمل في مجال الطب البيطري أو إدارة الحياة البرية. يزداد خطر الإصابة بالتولاريميا لدى العاملين في خدمات الحياة البرية.

### المضاعفات

قد تكون التولاريميا قاتلة في حالة عدم معالجتها. تتضمن المضاعفات المحتملة الأخرى الآتي:

التهاب الرئتين (الالتهاب الرئوي). قد يؤدي الالتهاب الرئوي لفشل تنفسي — حالة لا تأخذ فيها الرئتان ما يكفي من الأكسجين.

التهاب حول الدماغ والحبـل الشوكي (التهاب السحايا). التهاب السحايا هو التهاب خطير يلحق بالسائل والأغشية (السحايا) المحيطة بالمخ والحبـل الشوكي وقد يكون مُميتاً في بعض الأحيان.

تهيج حول القلب (التهاب غشاء التامور). وهو تورم التامور، وهو الغشاء الرفيع المحيط بالقلب، وتهيجه. قد يتحسن التهاب غشاء التامور الطفيف

بدون علاج، ولكن قد تتطلب الحالات الأكثر خطورة علاجاً بالمضادات الحيوية.

التهاب العظام (التهابُ العَظْمِ والنَّقي). تنتشر بكتيريا التولاريميا أحياناً في العظام.

### الوقاية

لا يوجد لقاح متاح علنياً لداء التولاريميا إذا كنت تعمل بمهنة محفوفة بالمخاطر أو تعيش في مكان يوجد به التولاريميا، فيمكن لهذه الإجراءات مساعدتك في خفض فرص العدوى:

الوقاية من لدغ الحشرات والأكاروسات

استخدم مواد طاردة للحشرات والأكاروسات ولكن اتبع تعليمات جهة التصنيع بحرص و استخدم طارد الحشرات باعتدال ثم افحص نفسك كثيراً خشية وجود الحشرات وأبعدها فوراً إذا وجدت أي منها.

توخى الحذر عند القيام بأعمال البستنة. يجب على القائمين بأعمال البستنة وعاملِي المساحات الخضراء مراعاة ارتداء قناع للوجه عند حفر التربة أو إزالة الأعشاب الضارة أو تنظيفها أو قص الأعشاب.

تعامل مع الحيوانات بحرص. إذا كنت تصطاد الأرانب البرية أو تتعامل معها، فارتدِ قفازات ونظارات واقية واغسل يديك جيداً بالصابون والماء الدافئ بعد لمس الحيوان. اطه كل اللحوم البرية جيداً وتجنب سلخ أو إعداد أي حيوان يبدو مريضاً.

الوقاية من الحيوانات الأليفة. يمكن إصابة الماشية والحيوانات الأليفة بداء التولاريميا في حالة تناولها جزء من أرنب مصاب أو عند لدغها بواسطة قراد مصاب

للمساعدة في سلامة الحيوانات الأليفة، تجنب تركها في الخارج دون إشراف وتزويدها بحماية ضد الحشرات والقراد ولا تسمح لها بالاقتراب من الحيوانات البرية أو الميتة.

## ❖ اللشمانيا: Leishmaniasis

المسبب طفيل اولي(Protozoa) يسمى اللشمانيا Leishmania يتبع طائفة

السوطيات الحيوانية

الليشمانيا Leishmaniasis مرض جلدي معروف في العراق باسم (حبة

بغداد)، منه الرطب والجاف، والمرض منتشر في ايران وآسيا الوسطى

وروسيا. وتعتبر القوارض خازنا للطفيل لهذا المرض والإصابات السنوية فيها

تزيد 40% وتنتقل الى الإنسان عن طريق اللسع في الأذان والمناطق

الحساسة المكشوفة في الإنسان بواسطة الذباب.

تتطفل الليشمانيا على الخلايا للجهاز الليمفاوي للعديد من الفقاريات بما فيها

الانسان و الزواحف والثدييات. التواجد عادة في الخلايا المبطنة للأوعية

الدموية والطحال والعقد اللمفاوية حيث تؤدي الاصابة الى تمزق هذه الخلايا

تعتبر الليشمانيا مرضاً طفيلياً المنشأ ينتقل عن طريق بعض الذباب ك ذبابة الرمل. وهي حشرة صغيرة جداً لا يتجاوز حجمها ثلث حجم البعوضة العادية لونها أصفر وتنتقل قفزاً ويزداد نشاطها ليلاً ولا تصدر صوتاً لذا قد تلتصق بالشخص دون ان يشعر بها . وتنقل ذبابة الرمل طفيلي الليشمانيا عن طريق مصه من دم المصاب (إنسان أو حيوان كالكلاب و القوارض) ثم تنقله إلى دم الشخص التالي فينتقل له المرض ويزداد انتشارها في المناطق الزراعية و الريفية .

. تظهر الليشمانيا الجلدية بعد عدة أسابيع من لسعة ذبابة الرمل على شكل حبوب حمراء صغيرة أو كبيرة ثم تظهر عليها تقرحات ويلتصق على سطحها إفرازات متبسة ولا تلتئم هذه القروح بسرعة , تكبر القرحة بالتدرج وخاصة في حالة ضعف جهاز المناعة عند الإنسان وتظهر عادة هذه الآفات في المناطق المكشوفة من الجسم . تتراوح مدة الشفاء من ستة أشهر لسنة . ومن اهم الانواع *L. Tropica* ليشمانيا تروبيكا الذي يسبب مرض الليشمانيا الخلوية التي تسمى قرحة الشرق Oriental Sore يسبب تقرحاً بالجلد وهو شائع في كثير من انحاء العالم و مصر و المخزن الطبيعي هو القوارض



"أعراض الإصابة بمرض اللشمانيا"

الوقاية والمكافحة



الحيولة دون وصول الناقل (ذبابة الرمل) للعائل انساناً كان او حيوان .

مكافحة هذا الناقل فى اطواره المختلفة بالمبيدات الحشرية .

التخلص من مصادر توالده .

الابتعاد إن امكن عن مخازن العدوى من الحيوانات البرية .

مكافحة القوارض

استعمال العقاقير للتخلص من الطفيل فى مراحل المرض الاولى دون

تأخير تحت اشراف الطبيب.

### ❖ التهاب الكبد المعدي

( داء البريميات- مرض اللبتوسبيرا- مرض اللبتوسبيروزييس ) :

*Leptospirosis*

ينتشر هذا المرض فى أنحاء عديدة من العالم. ويصيب الإنسان والقوارض

والمواشى والكلاب ويعيش ميكروب هذا المرض و اسمه ( *Leptospira* )

icterohaemorrhagiae في (كلى) الجرذان ويطرح مع الإدرار، فيصاب الإنسان إذا ما لامس الماء أثناء السباحة في مناطق ينتشر بها المرض، أو من خلال غبار المخازن المتواجد داخلها الجرذان المصابة، أو تناول أغذية مرت عليها الجرذان. ومن أعراضه الحمى والقشعريرة وآلام الجسم والتقيؤ، وهناك أعراض أخرى غير مباشرة كاليرقان والتهاب السحايا وأنزفة الجلد المخاطية.

ويجب التذكير بأن المواشي والخنازير والكلاب أكثر أهمية من القوارض في نقل المرض للبشر.

مرض اللبتوسبيريا من أهم الأمراض المعدية المشتركة التي تصيب الحيوانات والإنسان والفئران والكلاب وتعتبر القوارض أهم العوائل الحيوانية الناقلة للعدوى عن طريق تلويث ماء القنوات والترع والبحيرات

ويتميز المرض بحمى- بول داكن- صفراء- نزلة معوية - التهاب رمدي- وآلام

عضلية وهزال .وقد سمي المرض بأسماء عديدة مشتقة من أعراضه التي

يسببها

حمى السبعة أيام

الصفراء المعدية

أو من البيئة التي تحيط بالمرض

حمى المستنقعات حمى الطين

حمى الحصاد

حمى الفار

وسمي بمرض ويل

(نسبة للعالم الذي اكتشف مسبب المرض)

(Weil`s disease )

وفي ذلك الوقت تم تسمية الميكروب باسم

( Spirochaeta icterohaemorrhagiae ) .

وبعد ذلك تم تعديل الاسم إلى

(*Leptospira icterhaemorrhagiae*)

الانتشار في الطبيعة:

إن ميكروبات اللبتوسيرا لها انتشار واسع في الطبيعة وتعتبر الفئران

والحيوانات البرية هي العائل الحامل لهذا المرض.

العوائل الناقلة للعدوى:

تعتبر كل الثدييات تقريبا قابلة للعدوى خصوصا الفئران بجميع أنواعها والكلاب

والأرانب وحيوانات المزرعة

وكذلك الحيوانات البرية مثل الوعل- الغزال- الشمبانزي- الأسد- والنمر. كما

ينتقل المرض بالطرق المباشرة وغير المباشرة بالإنسان. ولكن يعتبر الفار

النرويجي والذي يعيش في الأماكن الزراعية وعلى ضفاف الترع

والقنوات هو أهم حامل للعدوى حيث ثبت إن 30-90% من أفرادها تكون  
حاملة للمكروب ( ولا تظهر عليها أي أعراض) وتفرزه مع بولها لتلوث البيئة.

أعراض المرض والصفة التشريحية:

أولا- الإنسان:

فترة حضانة المرض في الإنسان 7-12 يوما

ويمر المرض بمرحلتين

المرحلة الأولى:

ويكون الميكروب خلالها نشطة وتسمى هذه المرحلة التسمم الدموي

البكتيري

تدعى Septicemic or Bacteremic وتدوم من ثلاثة إلى سبعة أيام وتكون

أعراض المرض تشبه أعراض الأنفلونزا وتتميز الأعراض بارتفاع درجة

الحرارة- رعشة- صداع شديد ومستمر-آلام حول العينين- عرق غزير وغثيان

- التهاب رمدي مع تضخم للغدد اللمفاوية بالرقبة والزرور- مع ضعف عضلي

## واضح والآم بالبطن

- وفي نهاية هذه المرحلة يكون البول لونه اصفر داكن أو احمر مصفر أو بني داكن .

وهذه المرحلة يتكاثر الميكروب في الدم والسائل الشوكي للمريض .

### المرحلة الثانية:

تسمى المرحلة المناعية

وتحدث مباشرة بعد فترة من 1-3 أيام بعد المرحلة الأولى

ويمكن أن تدوم في حدود شهر واحد وتحدث في هذه المرحلة أعراض

المرض الأخرى

كالتهاب السحايا والتهاب أنسجة الدماغ والتهاب الشوكي كما تزداد أعراض

الصداع الشديد. وقد لوحظ إن المعالجة بالمضادات الحيوية أثناء الأيام القليلة

الأولى

تساعد على تثبيط سرعة انتشار الميكروب داخل الجسم ،أما في المراحل

التالية تقل درجة كفاءة المضادات الحيوية في العلاج. وهذه البكتيريا تؤدي

إلى خسارة في الأرواح وموت بعض الادميين نتيجة مضاعفات الفشل الكلوي الحاد.

العوامل التي تساعد على انتشار المرض لدى الإنسان

1- مستوى المعيشة المتداني في البلدان التي تنتشر بها أعداد كبيرة من

القوارض

2- تلوث الماء والغذاء بالبول الملوث بالبكتيريا

3- ملامسة المياه الملوثة بخدوش الجلد والأغشية المخاطية

4- نوع الأعمال التي يقوم بها الإنسان كالأطباء البيطريين والأشخاص الذين

يقومون برعاية الحيوانات مباشرة وخاصة المصابة وعمال المناجم والذين

يعملون في المجاري والمصارف .

5- شرب اللبن الغير مغلي الملوث بالبكتيريا .

ويجب التذكير بأن المواشي والخنزير والكلاب أكثر أهمية من القوارض في

نقل المرض للبشر.

❖ مرض التيفوس:









### "أعراض الإصابة بمرض التيفوس"

مرض التيفوس (Typhus) ( الحمى النمشية ) هو واحد من مجموعة من

الأمراض المعروفة التي تسببها أنواع مختلفة من بكتيريا الريكتيسيا

(Rickettsia)

يعرف التيفوس أيضا باسم "حمى السجنين"، إذ في عام 1759 - وبحسب

تقدير السلطات - فإن حوالي 25% من السجناء الإنجليز قد ماتوا بسبب ذلك

المرض؛ ومن هنا اكتسب هذا الاسم، ويعتقد أن غرف السجون القذرة

والمكتظة ساهمت في انتشار القمل بسهولة بين السجناء.

وبعد عام، بدأ مصطلح "التيفوس" يستخدم لوصف هذا المرض، وهو مشتق من كلمة يونانية تعني "دخاني" أو "ضبابي"، تعطي انطباعاً عن حالة الهذيان التي يختبرها المصاب بالمرض.

ويسمى بالحمى النمشية نسبتاً إلى طفح جلدي في الجسم كله تقريباً مع حبوب حمراء صغيرة بشكل نقاط بدون شكل محدد

### الاعراض

يبدأ التيفوس ملى شكل زكام قوي. ويبدأ ارتفاع الحرارة بعد أسبوع أو أكثر مع رجفة أو رعشة وصداع وألم في العضلات والصدر.

-بعد مضي بضعة أيام على ارتفاع الحرارة يظهر طفح جلدي مميز لحمى التيفوس، يبدأ في وسط الجسم ثم ينتشر بعد ذلك على الأطراف لكن الوجه والكف وبطن القدم تبقى خالية منه. ويبدو الطفح وكأنه رضوض صغيرة كثيرة.

-يدوم ارتفاع الحرارة مدة أسبوعين أو أكثر. ويكون التيفوس عادة خفيف

عند الأطفال وشديد. عند الكبار في السن.

-التيفوس الناتج عن القراد يسبب في كثير من الحالات التهاباً واسعاً


ومؤلماً في مكان اللسعة، يصاحبه انتفاخ وألم في الغدد اللمفاوية القريبة

منه

العدوى

تنتقل هذه الأمراض إلى البشر عن طريق بعض المفصليات (الحشرات) مثل:

القمل (Lice)، والبراغيث (Fleas)، والعث (Mites)، والقراد (Ticks).



وقد تنتقل المفصليات المصابة من شخص إلى آخر مباشرة، أو يتم جلبها عن

طريق نواقل كالقوارض والماشية وغيرها من الحيوانات.

وعندما تعض هذه الحشرات المصابة شخصا ما (للحصول على وجبة من دم الإنسان)، فإنها إما تحقن الضحية بسائل معد أو تترك وراءها برازها المليء بالبكتيريا التي تسبب التيفوس. وعند حك مكان العض يفتح الجلد ويسمح للبكتيريا بدخول مجرى الدم، فتتمو وتتكاثر.

### الأنواع

هناك ثلاثة أنواع مختلفة من التيفوس، وهذا التصنيف معتمد على نوع البكتيريا المسببة بالإضافة لجنس الناقل (مفصليات الأرجل):

أولا. التيفوس الوبائي أو التيفوس المنقول بالقمل (-Epidemic "or louse-borne" typhus)

تسبب في حدوث هذا النوع بكتيريا ريكتسيا بروفاتسيكا ( Rickettsia prowazekii) التي يحملها قمل الجسم. يتواجد هذا النوع في جميع أنحاء العالم، ولكن عادة ما يوجد في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية وسوء الصرف الصحي، حيث تشجع هذه الظروف على انتشار القمل.

وعادة ما تظهر أعراض التيفوس الوبائي بشكل مفاجئ وتشمل: الصداع الحاد، وارتفاع درجة الحرارة، والطفح الجلدي الذي يبدأ على الظهر أو الصدر ثم ينتشر، والتشوش والارتباك والذهيان، وانخفاض ضغط الدم، وحساسية العين للأضواء الساطعة، والألم الشديد في العضلات.

ثانياً. التيفوس المستوطن (Endemic typhus)

كان يعرف هذا النوع في السابق بتيفوس الفئران (Murine typhus). تسببه

بكتيريا الريكتسيا التيفوئيدية (*Rickettsia typhi*)، وتحملها براغيث الفئران.

يمكن العثور على التيفوس المتوطن في جميع أنحاء العالم، خاصة بين

الناس القريبين من الفئران أو المناطق التي تعيش فيها الفئران.

أعراض التيفوس المتوطن تستمر مدة 10-12 يوماً، وهي مشابهة جداً

لأعراض التيفوس الوبائي ولكنها عادة ما تكون أقل حدة. وتشمل: السعال

الجاف، والاستفراغ والغثيان، والإسهال.

ثالثا. التيفوس الأكالِي (Scrub typhus)

هذا النوع سببه بكتيريا أوربتيا تسوتسوغاموشي ( Orientia

tsutsugamushi) ويحملها العث.

وهذا النوع من التيفوس أكثر شيوعا في آسيا

وأستراليا وبابوا غينيا الجديدة وجزر المحيط الهادئ. ويسمى أيضا مرض

تسوتسوغاموشي.

وتشمل الأعراض التي تظهر على الأشخاص المصابين بالتيفوس الأكالِي:

تورم العقد اللمفاوية، والتعب، والتهاب الجلد في موضع لدغة، والسعال،

والطفح الجلدي.

تشمل بعض مضاعفات التيفوس ما يأتي:

التهاب الكبد.

النزيف في الجهاز الهضمي.

الالتهاب الرئوي.

تلف الجهاز العصبي المركزي.

الانخفاض في حجم الدم.

وقد يكون تشخيص التيفوس صعبا في بعض الأحيان، وذلك لتشابه أعراضه

مع أعراض بعض الأمراض الأخرى، بما في

ذلك: حمى الضنك والملاريا وداء البروسيلات (Brucellosis).

وتشمل الاختبارات التشخيصية لوجود التيفوس ما يأتي:

خزعة الجلد: حيث تؤخذ عينة الجلد من مكان الطفح ليتم فحصها في المختبر

والتعرف على البكتيريا المسببة له.

الاختبار المناعي باستخدام الأصباغ الفلورية ( Immunofluorescence )

(test): وذلك للكشف عن التيفوس في عينات البلغم.

صباغة الأنسجة المناعية (Immunohistological staining): يمكن لهذه

الطريقة الكشف عن البكتيريا داخل الأنسجة المصابة، والتي عادة ما تكون

أنسجة الجلد.



اختبار الدم الذي يمكن أن تشير نتائجه إلى وجود العدوى.

### العلاج والوقاية

يستعملون لقاحات أعدت خصيصاً للوقاية من هذه الأمراض.

وللسيطرة على انتشار المرض خاصة في ظروف الانتشار الوبائي فإن العاملين في الحقل الطبي كثيراً ما يستخدمون المبيدات الحشرية، إذ يقومون برش الناس وملابسهم بهذه المبيدات التي تقتل الحشرات الحاملة للمرض يستخدم المضادات الحيوية والادوية اللازمة بعد اجراء الفحوصات المطلوب تحت الطبيب المختص


العلاج المبكر بالمضادات الحيوية فعال جداً، والانتكاسات ليست شائعة عندما يلتزم المريض بجرعة العلاج.

ويمكن الوقاية من التيفوس عن طريق الحفاظ على النظافة الشخصية والنظافة العامة، وتجنب السفر إلى المناطق التي وقع فيها هذا المرض أو إلى البلدان المعرضة لمخاطر عالية بسبب نقص المرافق الصحية، وتجنب

الاتصال بنواقل التيفوس كالقمل والبراغيث والقراد، وكذلك تجنب فضلات القوارض.

وفي حال تم العثور على العدوى، يمكن اتباع تدابير خاصة للتخلص من النواقل، مثل: الاستحمام، وغلي الملابس، واستخدام المبيدات الحشرية.

### ❖ السالمونيلا: Salmonellosis





### "أعراض الإصابة بالسالمونيلا"

السالمونيلا هي بكتيريا تعيش في الأمعاء الحيوانية والبشرية ويتم إراققتها عبر البراز، ويصاب بها الإنسان من خلال تناول المياه أو الطعام الملوث أو أطعمة غير مطهية جيداً، ويصاب آخرون بالإسهال والحمى والتشنجات البطنية في غضون ثمانية إلى 72 ساعة.

ويتعافى معظم الأشخاص الأصحاء خلال بضعة أيام دون علاج محدد.

بعض القوارض تحمل بكتيريا السالمونيلا في الجهاز الهضمي الخاص بها، مما يسهل نقل مسبب المرض إلى الإنسان.

من أهم الأعراض التي تميز الإصابة بالسالمونيلا ما يلي:

تراوح فترة حضانة بكتيريا السالمونيلا من عدة ساعات إلى يومين، و تشمل

العلامات والأعراض، ما يلي:

- غثيان.

- قيء.

- مغص.

- إسهال.

- حمى.

- قشعريرة.

- صداع الرأس.

- براز دموى.

وعادة ما تظهر العلامات والأعراض ما بين يومين إلى سبعة أيام، وقد يستمر

الإسهال لمدة تصل إلى 10 أيام وقد يستغرق الأمر إلى عدة أشهر قبل

عودة الأمعاء إلى وضعها الطبيعي.

يضم جنس السالمونيلا حوالي 600 نوع من البكتيريا الممرضة للإنسان والحيوانات (المواشي و الخنازير و القوارض والطيور)، وتُعدّ أنواع هذه المجموعة من البكتيريا من مسببات التسمم الغذائي الذي يصل حد الإصابة المميتة. وتحدث الإصابة عن طريق تناول غذاء ملوث بتلك البكتيريا. وقد شخّصت القوارض كناقل للمرض عن طريق البول والبراز الذي تضعه في الحقول والمخازن قرب المواد الغذائية. ودور فأر البيت هو أكثر خطورة من جرذان الحقل.

ماهى طرق الوقاية من السالمونيلا ؟

يمكن تجنب الإصابة بالسالمونيلا، من خلال اتباع عدة طرق للوقاية منها غسل اليدين، تجنب استخدام المراحيض العامة، غسل اليدين بعد تغيير حفاظات الأطفال وكذلك بعد تنظيف الحيوانات الأليفة.

ماهو علاج السالمونيلا؟

يعتمد علاج مرض السالمونيلا على تناول أدوية التي تعمل على تخفيف الأعراض مثل المضادات حيوية تحت إشراف أطباء متخصصين.

## ❖ حمى عضة الجرذ (Rat bite fever)

كما يشير اسم المرض، الناتج عن تلوث الجروح بأنواع من الميكروبات من فم الفئران في حال أصبت بعضة من جرذ مصاب بالمرض.

لذا من المهم التوجه إلى الطبيب في حال التعرض لذلك، بغض النظر عن ظهور هذه الأعراض أو عدمها:

الحمى

طفح جلدي

صداع وألم في الرأس

قيء

ألم في العضلات.

❖ التهاب السحايا والمشيمات للمفاوى: Lymphocytic

choriomeningitis

التهاب السحايا والمشيميات اللمفاوي هي عدوى يسببها فيروس التهاب السحايا والمشيمي، وتنتقل إلى الإنسان عن طريق القوارض. الحاضن الأساسي للفيروس هو الفأر المنزلي، ولكن القوارض الأخرى قد تكون حواضن للفيروس. يشيع هذا الفيروس بشكل أساسي في الولايات المتحدة ولكنه لا يقتصر عليها؛ بل يمتد ليشمل أجزاء من أوروبا، وشرق آسيا، وأستراليا، واليابان.

مرض فيروسي يصيب فئران المنازل، ولم تكتشف علاقة الفأر إلا من وقت قريب بعد أن عزلت فيروسات من أحشاء فأر المنزل، فوجد أن 50% من مسببات المرض تصل عن طريق فئران المنزل.

الإصابة بالعدوى عند الحوامل تؤدي أحياناً إلى إصابة الجنين بالتخلف العقلي، والاستسقاء الدماغى، والتهاب الشبكية المشيمي.

نقل العدوى:

تنتقل العدوى إلى الإنسان بعد تناوله أطعمة أو مشروبات ملوثة بفضلات القوارض المصابة. من الممكن أيضاً نقل العدوى عن طريق تلوث الجروح

بهذه الفضلات، أو إذا قام القارض بعض الإنسان، ولم تثبت إمكانية نقل العدوى من إنسان إلى آخر.

يبدأ المرض بأعراض تشبه أعراض الأنفلونزا ثم تظهر أعراض المرض بعد عدة أيام، حيث تبدو على المريض حالات عدم اتزان ردود فعله والخمول (النعاس) وأحيانا الشلل، يشفى أكثر المرضى بعد عدة أسابيع من إصابتهم ولكن هناك حالات مميتة. وتكون الإصابة به عن طريق مرحلتين أساسيتين تبدأ بالشعور بالغثيان والقيء والصداع وألم العضلات وقلة الشهية، وتكون المرحلة الثانية من الإصابة بمزيد من تضرر العضلات والتهاب الدماغ.

الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالعدوى:

هذه العدوى تصيب كل الأعمار ومن كلا الجنسين، ولكن الإصابات تتركز عند مربى القوارض

تزداد حالات العدوى عند العاملين في المختبرات الطبية.

من الممكن الوقاية عن طريق ارتداء الملابس المناسبة للعمل في

المختبرات، واتباع الإجراءات الاحترازية للسلامة في بيئة العمل.



## ❖ فيروس هانتا HantaVirus :

هو فيروس خطير يصيب القوارض كالفئران وينتقل للبشر عن طريق

ملامسته لبول القوارض او لعابها

يصيب فيروس هانتا الرئتين

يسبب امراضا قاتلة للانسان مثل الحمى النزفية المصحوبة بالمتلازمة الكلوية

ومتلازمة فيروس هنتا الرئوية وكلاهما مميت للانسان

نسبة معدل الوفيات للمصابين تتراوح بين 30-50% وهي نسبة مرتفعة

للغاية

أعراضه تبدأ تشمل أعراض الإصابة بفيروس هانتا :

التهاب المفاصل الروماتويدي المميت.

التعب وصداع.

## الحمى.

ألم العضلات خاصةً في الفخذين والظهر والوركين وأقل من الكتفين.

الشعور بالدوار والصداع والقشعريرة والقيء والإسهال وآلام المعدة.

بين 4 إلى 10 أيام بعد المرحلة الأولى ، يمكن أن يصاب الشخص بضيق

في التنفس ، وسعال ، وقد تمتلئ رئته بالسوائل. ثم تتحول الي الم عضلي

وضيق تنفس يتحول لفشل حاد في الجهاز التنفسي يتطور الي استسقاء

رئوي ثم الي الوفاه

مصدره الفئران ولا يوجد علاج فعال حتي الان لفيروس هانتا ولكن يتم

استخدام علاجات داعمة للمناعة للمساعدة علي مقاومة الفيروس او

استخدام تهوية ميكانيكية للتنفس في الحالات الحرجة منه

وطبقا للمراكز العلمية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، فإن حالات " فيروس هانتا "نادرة، وتنتشر عادة في المناطق الريفية حيث توفر الغابات والحقول والمزارع موطنًا مناسبًا لمضيفات القوارض للفيروس.

كذلك فإن المناطق المحيطة بالمنزل أو العمل التي قد تعيش فيها القوارض (على سبيل المثال، المنازل والحظائر والمباني الملحقة والمظلات) هي مواقع محتملة قد يتعرض فيها الناس للفيروس.

وتتجم العدوى نتيجة الاتصال الوثيق مع بول أو روث أو لعاب القوارض أو عن طريق استنشاق الهواء الملوث بالفيروس، ويمكن أن تحمله أنواع معينة من الجرذان والفئران،.

وأوضحت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض أن كل سلالة من "فيروسات هانتا" مرتبطة بأنواع مضيغة من القوارض، وأن هذه الفيروسات تنتقل في ما يعرف بـ"الانتقال الجوي"، أي بواسطة الهواء المحيط، عندما تنتقل جزيئات

الفيروس من بول الحيوان أو البراز أو اللعاب في الهواء وتصيب الفرد. وفي حالات نادرة، قد يصاب الشخص بفيروس هانتا، إذا عضه حيوان مصاب.

### ❖ السعار(داء الكلب):

في بعض الحالات نتيجة لعضة القوارض.

### ❖ التسمم الغذائي:

الذي يحدث نتيجة تلوث الغذاء ببراز القوارض التي تكون مصدر الإصابة بمسببات التسمم: الدوستتاريا الباسلية والأميبية ومسببات التيفود عن طريق براز القوارض.

### ❖ الإلتهاب السحائي وشلل الأطفال نتيجة بعض الفيروسات:

التهاب السحايا مرض مدمر يسبب معدلات مرتفعة من الوفيات ويؤدي إلى مضاعفات خطيرة طويلة الأجل (العواقب).

لا يزال التهاب السحايا يطرح تحديًا كبيرًا للصحة العامة في العالم.

تنتشر أوبئة التهاب السحايا في جميع أنحاء العالم، ولا سيما في أفريقيا جنوب الصحراء.

تسبب التهاب السحايا عدة كائنات حية، منها البكتيريا والفيروسات والفطريات والطفيليات.

يشير التهاب السحايا البكتيري قلقًا خاصًا. إذ يتسبب هذا النوع من التهاب السحايا في وفاة 1 من كل 10 أشخاص مصابين به ويعاني 1 من كل 5 أشخاص مصابين به من مضاعفات وخيمة.

### ❖ نقل بعض الأمراض الطفيلية

مثل الديدان الورقية من جنس *Heterophus* وديدان البلهارسيا من جنس

*Schistosoma* والديدان الأسطوانية من جنس *Trichynella spinalis*

التي لم يثبت وجودها في مصر كما تنقل الفئران أمراض أخرى مثل

Rickettsia pox وهي نوع من التيفوس يقوم حلم القوارض بنقلها للإنسان.

وفي كثير من الحالات تكون الفئران مصدر خطر على الصحة، لذا حاول الابتعاد عنها قدر الإمكان وتجنب تناول أي طعام قد تشك أنه ملوث بإفرازاته.

### ❗ أهم فوائد القوارض (الفئران)

و بالرغم من كل هذه الاضرار التي تسببها الفئران علي اختلاف انواعها الا ان لها بعض الفوائد تلخصها فيما يلي:

### ❖ عنصر أساسي في السلسلة الغذائية والتوازن البيئي

تُعرّف السلسلة الغذائية بالإنجليزية FOOD CHAIN: بأنها تسلسل انتقال المادة

والطاقة على شكل غذاء من كائن حي إلى آخر في النظام البيئي، والكيفية

التي تتغذى فيها الكائنات الحية على بعضها، ويوجد العديد من الأمثلة على

السلاسل الغذائية للحيوانات، فمثلاً ينتج العشب غذاءه ذاتياً بالاعتماد على

ضوء الشمس فينمو، ثم يأتي الأرنب ويتغذى عليه، وبعد ذلك يأكل الثعلب

الأرنب، وعندما يموت الثعلب تحلل البكتيريا جسمه لعناصر تعيدها إلى التربة، وهكذا تستمر دورة السلسلة الغذائية. يمكن للكائن الحي أن يكون جزءاً من سلاسل غذائية متعدّدة، فمثلاً يتناول الأرنب العشب إلى جانب نباتات أخرى، أما الثعلب الذي يتغذى على الأرنب فإنه يستطيع أن يتغذى أيضاً على العديد من أنواع النباتات والحيوانات المختلفة، ويجدر بالذكر أنّ السلاسل الغذائية المتشابكة والمتراصة في النظام البيئي تشكّل ما يُسمّى بالشبكات الغذائية (FOOD WEB) حيث تكون الفئران غذاء لمعظم الحيوانات البرية المفترسة مثل البومة وغيرها.

ان التوازن البيئي مهم لحياة البشر، وأي إخلال به سيكون له آثار خطيرة عليه، مشيراً إلى أن مقاومة خطر انتشار الطاعون لا يمكن أن تتلخص في إبادة الفئران، خاصة وأن للفئران أكثر من دور بيئي مهم تقوم به، وفي مقدمة هذه الأدوار كونها محللاً للفضلات البيئية الجافة، والتي يؤدي انتشارها إلى وجود عدد من الحشرات التي تمثل خطورة حقيقية على حياة الإنسان، إضافة إلى كونها الوجبة الرئيسية للثعابين، وغياب

الفئران يعني خروج الثعابين للبحث عن الغذاء، وهو ما يعني مهاجمتها للمنازل.

ما حدث من قبل أن قامت مصر برش الجو لمحاربة انتشار الجوارح، وهو ما أدى إلى إبادة وانتشار الفئران بشكل مبالغ فيه، وتشكيل أكثر من لجنة دولية لإغاثة مصر من خطر انتشار الفئران.


ونشير إلى أن محاربة الفئران لمنع انتشار الطاعون يجب أن تكون عن طريق إجبار الفئران على هجرة المناطق السكنية، ولن يتم ذلك إلا عن طريق النظافة، لأن الفئران لا تسكن المناطق النظيفة، فهي بيئة غير ملائمة لها.

هناك خطورة مؤكدة من إبادة الفئران، خاصة في الموسم الصيفي؛ لأن الفئران هي الوجبة الرئيسية للثعابين، إضافة إلى أن الصيف هو موسم الولادة للثعابين، وهو ما يعني أنها إذا لم تجد الغذاء الكافي لها ستضطر إلى مهاجمة المنازل. هناك مناطق معينة في القاهرة والجيزة مهددة بهجوم للثعابين في حالة التخلص التام من الفئران، وهي مصر القديمة، وشبرا، والعجوزة، ووسط المدينة، والقلعة،



والمقطم، والقطامية، إضافة إلى المناطق العشوائية والأرياف بشكل

عام .



### ❖ تستخدم في اختبار تقييم الادوية والعقاقير الطبية المختلفة

• بدءاً من اختراع أدوية جديدة للسرطانات حتى اختبار

المكملات الغذائية، تلعب الفئران والجرذان دوراً كبيراً في

تطوير الأدوية وتجربتها.

- في الحقيقة تُشكّل الفئران والجرذان نسبة 95% من حيوانات المختبر، وذلك وفقاً لمؤسسة البحوث الطبية (FBR).
- يعود اختيار العلماء للفئران في التجارب لعدة أسباب: منها حجم القوارض الصغير، حيث يمكن الحفاظ عليها وحمايتها بشكل أكبر مقارنةً مع باقي الحيوانات، إضافةً لوجودتها في التكييف مع المحيط الجديد، كما أنها تتكاثر بسرعةٍ وتعيشُ بعمرٍ قصيرٍ -من ستينين إلى ثلاث سنوات- يمكنك من ملاحظة العديد من أجيال الفئران في فترة قصيرة.
- يتمّ شراء هذه الفئران بسعرٍ رخيصٍ، وكمياتٍ كبيرةٍ، من قبل التجّار المتخصصين في بيعها للأبحاث، وتكون معظم الفئران المستخدمة في التجارب متطابقة وراثياً بشكل كامل تقريباً، وهذا ما يجعل نتائج التجارب أكثر نجاحاً، وذلك وفقاً لمعهد بحوث الجينوم البشري الوطني.

- فعلى الأقل، يجب أن تكون هذه الفئران من نفس الأنواع.
- ثمة سبب آخر لاستخدامها، وهو أن خصائصها الجينية والبيولوجية والطبيعية تشبه بشكل كبير خصائص البشر، كما أن معظم الأعراض المرضية على البشر يمكن تجربتها على الفئران، وتقول جيني هالسكي (JENNY) (HALISKI)، ممثلة المكتب الوطني للمعاهد الوطنية للصحة: «(NIH) الجرذان والفئران هي ثدييات تشترك في العديد من العمليات مع البشر؛ لذلك تعدّ ملائمة للإجابة على العديد من التساؤلات البحثية» خلال العقدين الماضيين، تلك التشابهات أصبحت أكثر قوة.
- حيثُ تمكّن العلماء من استيلاد الفئران المعدّلة وراثياً، وأطلقَ عليها فئران معدّلة وراثياً (TRANSGENIC MICE)؛

حيثُ أصبحت هذه الفئران تحمل جينات شبيهة بتلكَ

الجينات التي تسبب الأمراض البشرية.

• كذلكَ يمكننا إيقاف عمل هذه الجينات، أو إلغاء تأثيرها،

وخلق ما يسمّى بفأرة الضربة القاضية (KNOCKOUT)

(MICE، من أجل استخدامها لتقييم تأثيرات المواد

الكيميائية المسرطنة، وسلامة العقاقير عليها، وفقاً

(FBR).

• استخدام القوارض في البحوث يجعل منها أكثر كفاءةً،

وذلك بسبب معرفة الباحثين بعلم التشريح وعلم الوراثة

والفيزيولوجيا الخاصة بهذه الحيوانات، مما يسهّل معرفة

الخصائص والتغيرات السلوكية.

❖ فهي تعتبر صاحبة الفضل في تطوير الأغلبية الساحقة من الأبحاث الطبية و التأكد من أمان الأدوية قبل تجربتها على البشر.



### أسباب اختيار الفئران في معظم البحوث الطبية

تستخدم الفئران في الاختبارات السلوكية والحسية والشيخوخة والتغذية والدراسات الجينية، بالإضافة إلى اختبار الأدوية المضادة للربو القادرة على إنهاء إدمان المخدرات، كما أن استخدام الحيوانات في البحوث أمر بالغ الأهمية، ويساعد على فهم علمي للأنظمة الطبية الحيوية، ويؤدي إلى اكتشاف أدوية وعلاجات مفيدة، ومن أهم أسباب اختيار الفئران في معظم البحوث الطبية هي:

- حجمها صغير، حيث يمكن الحفاظ عليها وحمايتها بشكل أكبر مقارنةً من باقي الحيوانات
- الفئران لا تتأثر سلوكياتها بتغير البيئة المتواجدة في نطاقها بعكس غيرها من الحيوانات، فهي سريعة التكيف مع أي بيئة جديدة تتواجد في نطاقها، وهو ما يضمن للعلماء أن تكون نتائج تجاربهم صحيحة بنسبة كبيرة' أيضا لسهولة التعامل معها
- يمكنها التكاثر بسرعة كما أن عمرها قصير من 2 إلى 3 سنوات، لذلك يمكن الوصول إلى تأثير العلاج و الأدوية على أجيال كثيرة من الفئران في فترة قصيرة.
- يتمّ شراء هذه الفئران بسعر رخيص، وكمياتٍ كبيرة، من قبل المتخصصين في بيعها للأبحاث، وتكون معظم الفئران المستخدمة في التجارب متطابقة وراثيًا بشكل كامل تقريبًا، وهذا ما يجعل نتائج التجارب أكثر نجاحًا
- الفئران تتشارك مع البشر في العديد من الجينات ( DNA ) ، و الكثير من الخصائص الوراثية ، ومع تطور العلم تمكن العلماء من إنتاج


جينوم للفئران يشبه كثيراً الجينوم البشري، و تسمى هذه السلالة باسم  
 ” فئران معدلة وراثياً ” وهي بها جينات تشبه بشكل كبير الجينات  
 المسؤولة عن إصابة البشر بالأمراض الوراثية.

- للفئران خصائص بيولوجية وسلوكية تجعل بحوثها فعالة؛ لأن علم التشريح وعلم وظائف الأعضاء وعلم الوراثة مفهومة جيداً من قبل الباحثين، كما أن الفئران تولد طبيعياً بدون جهاز مناعي، وبالتالي يمكن أن تكون كنماذج لأبحاث الخلايا البشرية العادية والخبيثة.
- الفئران والبشر معرضين للإصابة بالأمراض نفسها تقريباً، لأسباب وراثية كما أن الفئران يمكن التلاعب بها وراثياً لمحاكاة الواقع وإيجاد أسباب للأمراض التي تصيب البشر وتعتبر الفئران على نطاق واسع أفضل نموذج للامراض الوراثية البشرية وتتشارك بنسبة ٩٩ ٪ من الجينات الخاصة بها مع البشر
- يتم تشريح الفئران بكل سهولة و ذلك لأن تركيب أجهزتها الداخلية أمر بسيط و يمكن تتبع مسار الأدوية في أجسامها ببساطة.

- واكبر دليل علي ذلك متابعة العالم بأكمله لاستخدام الفئران في معظم المعامل البحثية العالمية وسباق من الزمن لإجراء التجارب السريرية للبحث عن لقاح ضد "فيروس كورونا المستجد (كوفيد19)" الذي أجتاح العالم من فترة قصيرة منذ ظهوره اخر ديسمبر 2019 بمدينة Wuhan الصينية، الذي تمكن من اكتساح كل قارات الكرة الأرضية، وغزو معظم ما فيها من دول ومناطق وجزر من خلال حصد آلاف ارواح البشر في كل بقاع الارض واصبح يهدد البشرية جمعاء بين عشية وضحاها فهو يعتبر اكبر ازمة صحية تعرض لها العالم طبقا لتصريحات منظمة الصحة العالمية، فيمكن القول بان حقوق الإنسان في عالم الحيوان أكثر أهمية من حقوق الحيوان بدليل موت فئران التجارب لأجل الإنسان!

❖ أحد عناصر الاختبار البيولوجي الذي يستدل علي درجة التلوث البيئي





عن طريق إستخدام القوارض كمؤشر بيولوجي لتقييم الأضرار التي تحدث  
للبيئة نتيجة عوامل التلوث و من المعلوم أن تلوث البيئة قد يكون سببا في

حدوث تغيرات عديدة علي البيئة المحيطة من مزروعات وحيوانات برية التي سببها الانسان.

وتتلخص تلك المؤشرات الحيوية في الاتي:

- دراسة وتتبع الكثافة العددية للقوارض في المنطقة.
- دراسة التغيرات المورفولوجية مثل الظواهر الطفرية التي تحدث علي

الفراء

- دراسات باثولوجية للقوارض مثل ( الكلية والرئة والكبد وغير ذلك ) نتيجة وجود مواد سامة في البيئة.

- دراسة التشوهات النسيجية لبعض الاحشاء الداخلية مثل الخصية و القنوات المنوية في الذكور.

- دراسة مخلفات المواد المشعة نتيجة لإقامة محطات نووية في بعض البلدان و مدي ما تحدثه تلك المخلفات من تأثيرات علي الحيوانات بصفه عامة.

- دراسة تشوهات عظام الجمجمة.

## ❖ تستخدم بعض الانواع الصحراوية في الزينة لجمال منظرها وهدوء

### طباعها

القوارض الليلية التي تعيش في البراري الصحراوية ويتواجد في أغلب

البلدان العربية

مثال اليربوع ويسمى أيضاً الجربوع بالإنجليزية JERBOA :، هو حيوان

ثديي ينتمي إلى رتبة القوارض الصحراوية ذات أرجل وذيل طويل،

ينتشر هذا الحيوان الشبيه بالفار بكثرة في جميع أنحاء

شمال أفريقيا وفي أوروبا الشرقية وآسيا إلى شمال الصين، وتجدر

الإشارة إلى أن هناك حوالي خمسة وعشرين نوعاً من الجرايع، ينتشر

اثتان وعشرون منها في القارة الاسيوية.

خلال ساعات النهار تبدو صحراء الشمال الأفريقي وكأنها خالية من كل

حياة، فالحرارة عالية والسكون شامل، ولكن عندما يتزل الشفق فإن

أنواع مختلفة من الحيوانات تخرج لتبث الحياة في الصخور والرمال وفي

مقدمتها اليرابيع، أو فئران الصحاري، وهي قوارض صغيرة تشابه صغار

الكانجارو لها فرو حريري وذيل يبلغ طوله ضعف طول الجسم، وحيث أنها تعيش في الصحراء فإن لها أرجلا مغطاة بشعر طويل خشن يحميها من الغرق في الرمال، بينما يقوم الذيل الطويل بحفظ توازنها عند الجرى، والأرجل الخلفية شديدة الطول.

اليربوع هو من القوارض الصحراوية الليلية والتي تنشط في نشاطها خلال فترة الليل بحثاً عن طعامها ولا تظهر في فترة النهار فهو من القوارض التي تعيش في البراري. يتواجد هذا اليربوع في كم كبير من البلدان العربية والذي نجد طوله يتراوح فيما بين 13 إلى 25 سم حيث يكون لونه نفس لون التربة الصحراوية مما يجعله نوع من التمويه. تنتمي اليرابيع إلى فصيلة الفئران والقوارض والسناجب فهي تعيش في الصحاري والأماكن الجافة في آسيا وأفريقيا وأوروبا الشرقية، وتتغذى على الحشرات والبذور والنباتات وتعيش في داخل الجحور وتظل بداخلها في حالة السبات الشتوي. اللون الخاص باليربوع هذا يكون بني باهت مثل لون الغزال الصحراوي والتي تكون لها جزءاً من الأسفل لونه أبيض فاتح وتعيش في الجحور بعمق حوالي من 40 إلى 75 سم يتم استخدامها لتخزين الغذاء. تقوم باستخدام الجحور تلك لتخزين الغذاء

وأيضاً لوضع أطفالها بداخلها عندما تقوم بالولادة لهم كما إنها تقوم باستخدامها لتربية الأطفال الرضع وتغذيتهم بداخلها. يكون الرضع في الوقت الخاص بالرضاعة تلك تكون مغمضة العين لمدة حوالي خمس أسابيع ولكن بعد مرور تسعة أسابيع من ولادتها يتم اعتمادهم على أنفسهم بشكل كبير. تقوم اليرابيع بالولادة حوالي ثلاث مرات في السنة الواحدة على أن تكون مدة الحمل الخاصة بها تلك حوالي 25 يوماً. يتم تحينطها من قبل الهواه والمتخصصين واستخدامها كمنظر جمال







### ❖ القوارض تستخدم كغذاء للانسان

الطعام هو بنزين ووقود الحياة الرئيسي بالنسبة لجسم الانسان ، ولذلك تفننت واشتهرت بلدان كثيرة باجمل و أذ الوصفات، والتي يسافر لها البعض مئات بل الاف الاميال لمجرد تذوق هذا الصنف من الطعام. لكن العجيب ان هناك بعض الدول اشتهرت ببعض الوصفات الغريبة للغاية، والتي تصيب الشخص بالغثيان لمجرد سماع مكوثاتها فقط، و مع ذلك تلقي اقبالا شديدا من فئات معينة من الناس

مثل:

- قوارض مشوية تؤكل في امريكا اللاتنية وبالاخص في منطقة

الاندير وبيرو ودولة بوليفيا و كولومبيا وتعد من الاكلات الشعبية

هناك و

في منطقة جنوب شرق اسيا مثل كمبوديا والفلبين و غيرها و الصين والهند

يأكلون اجزاء منها و خاصة الارجل الخلفية







### ❖ استخدام جلودها في الصناعة

دبغ جلودها واستعمالها في الصناعة

مثال: استعمال جلودها في تصنيع جلد ساعة (استيك)

### ❖ تستخدم في نشر الامراض الوبائية الخطيرة

ما هي أهم الأمراض التي تسببها القوارض للإنسان؟

قد تسبب التسمم الغذائي، حمى عضة الجرذ، وقد تنقل الطاعون (الموت

الأسود)، التيفوس، اليرقان اللولبي (داء ويل)، التوكسوبلاسماز (داء القطط)،

الزحار العصوي (الزنتارية)، اللشمانيا، الديدان الشريطية، التهاب السحايا للمفاوي، بعض الأمراض الفيروسية (داء الكلب والحمى النزفية).

### كيف تنقل القوارض الأمراض إلى الإنسان؟

قد تكون القوارض خازناً لمسببات بعض الأمراض؛ فتنتقلها للإنسان عن طريق التماس المباشر مع القوارض، أو ملامسة أسطح ملوثة من القوارض، أو تناول طعام أو شراب ملوث ببول وبراز القوارض، أو بسبب التعرض لعضة القوارض المصابة.

وقد تنقل مسببات المرض ميكانيكياً من خلال شعيرات جسمها؛ حيث إن العديد من الطفيليات تعيش على أجسام القوارض كالبراغيث والقمل والقراد وغيرها.

### كيف يمكن الوقاية من الإصابة بهذه الأمراض؟

أولاً عن طريق منع دخول الجرذان والفئران إلى المخازن والمستودعات والبيوت وغيرها، وذلك بإغلاق الأبواب والنوافذ وإجراء عمليات التحصين،

ووضع القمامة في أكياس خاصة ورميها في صناديق القمامة ( الحاويات)،  
 وعدم تخزين الحبوب في العراء، وعدم تكديس المواد المخزونة مع وضعها  
 في أوعية معدنية مغلقة، ووضع المواد الغذائية على رفوف بارتفاع لا يقل  
 عن 45 سم في حال توقع دخول الفئران إلى المستودع..

وقد تستخدم في نشر الامراض مثل مرض الطاعون وقت الحرب بين

افراد قوات العدو فتعمل على أضعافه



❖ تستخدم في الكشف عن المتفجرات

- تمكن مجموعة من العلماء من تدريب فئران على كشف رائحة المخدرات والقنابل وتبنيه رجال الأمن. وذلك بتركيب أجهزة استشعار بيولوجية على الفئران المدربة، لتتمكن من تسجيل رد فعلها عند شم المواد المحظورة. وتسجل هذه الأجهزة التغيرات التي تحدث في دقات قلب الفئران وتنفسها، حسب ما ذكر. وترسل هذه الأجهزة المعلومات التي سجلتها إلى جهاز كمبيوتر، الذي يحلل بدوره هذه البيانات وينبه رجال الأمن. وقال أحد المسؤولين في إنه من الممكن أن توضع هذه الفئران عند نقاط التفتيش في المطارات لمساعدة رجال الأمن على اكتشاف المتفجرات.









### ❖ تدريب الفئران على ضبط الممنوعات

- تستعد شركة الامن العالمية لإحداث ثورة في عمليات الكشف عن الأسلحة والمخدرات والأموال المهربة عبر المطارات باستخدام فئران مدربة لهذا الغرض.

عن طريق

- إجبار المسافر على الوقوف في حجرة محكمة الإغلاق وتسليط شحنة من الهواء باتجاهه، ثم شفط الهواء باتجاه حجرة أقل حجماً، حيث

تكون مجموعة من ثمانية فئران فى الانتظار.ومن المفترض أن تتضح نتيجة الفحص خلال ثمانى ثوان، حيث يضاء ضوء أخضر فى حال عدم وجود ما يشير الشبهة، وبسمح للمسافر بمواصلة سفره.

أما إذا ظهرت رائحة مريبة لدى الفئران المدربة، فإنها تتجمع فى إطار ما يعرف بالبلاغ الجماعى، وهو ما يؤدى إلى قرع جرس الإنذار.

### ❖ استخدام الفئران فى الارصاد الجوية

جرذ الأرض الأكثر شهرة فى الولايات المتحدة يتوقع حلول الربيع قريبا فى احتفال تقليدي ينظم فى الولايات المتحدة فى الثانى من شباط/فبراير من كل سنة، توقع جرذ الأرض (المرموط) الأكثر شهرة فى البلاد حلول فصل الربيع قريبا.



## المراجع

- الديب، حسن (1990) الفئران و طرق مقاومتها. وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى. مصر، 125.
- دسوقي، عبدالعليم سعد سليمان (2019) محاضرات علم الحيوان الزراعي
- دسوقي، عبدالعليم سعد سليمان & بغدادى, سعودي عبدالوهاب (2019) القوارض (تصنيفها – صفاتها المورفولوجيا-سلوكياتها- مكافحتها) بمجلة الشبكة العراقية لنخيل التمر -  
<https://www.iraqi-datepalms.net>
- دسوقي، عبدالعليم سعد سليمان(2020) كتاب (علم الحيوان والآفات الحيوانية الزراعية) المكتبة الزراعية الشاملة  
[https://www.agro-lib.site/2020/08/blog-post\\_50.html?m](https://www.agro-lib.site/2020/08/blog-post_50.html?m)
- دسوقي، عبدالعليم سعد سليمان(2020) كتاب " أهم الآفات الحيوانية في المنشآت الغذائية و طرق مكافحتها" المكتبة الزراعية



## الشاملة

[https://www.agro-lib.site/2020/06/blog-post\\_307.html](https://www.agro-lib.site/2020/06/blog-post_307.html)

- دسوقي، عبدالعليم سعد سليمان (2020) كتاب "الآفات الحشرية

والغير حشرية ذات الأهمية الطبية والبيطرية" مكتبة الكتب"

<https://books-library.net/free-1180952957-download>

- دسوقي، عبدالعليم سعد سليمان (2022) كتاب "اهم افات الزراعات

المحمية وطرق مكافحتها" - المكتبة الزراعية الشاملة

[https://www.agro-lib.site/2022/03/blog-post\\_368.html](https://www.agro-lib.site/2022/03/blog-post_368.html)

- ديشيش، محمد عبدالفتاح طه (2001) القوارض حياة وسلوك،

مبيدات ومكافحة وتأثيراتها على البيئة. منشأة المعارف

بالسكندرية، 238 صفحة.

- شهاب، عدوان 1996 حصر وتصنيف القوارض في ريف دمشق،

ودراسة بيولوجيا فأر الحقل الاجتماعي *Microtus socilalis*

ومكافحته كيميائياً ، رسالة ماجستير في وقاية النبات كلية الزراعة –  
جامعة دمشق.

- شهاب، عدوان 1999 تحديد أنواع الجنس *Microtus* في سوريا،

ودراسة بيولوجيا فأر الحقل الاجتماعي *Microtus socilalis*

ومكافحته. رسالة دكتوراه في وقاية النبات ، كلية الزراعة – جامعة  
دمشق.

- عبد الحميد، زيدان هندی (2007): المرشد في مكافحة آفات

المنازل والصحة العامة. الطبعة الثانية، كانزا جروب، 656 صفحة.

- مكافحة الفئران في مصر- صادر عن الادارة العامة لمكافحة

القوارض بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي - مشروع مكافحة

فأر الحقل- القاهرة مايو. 1994. 196 صفحة.

- Abd El Gawad. K.H, A.M.Ali, M.G.Mourad and M.A.Ali

1987. An improved preparation of zinc phosphide as

rodent control bite under field conditions. Minia. J. Aric.

Res.& Dev. Vol.9. No 2.835-850.

- Atallah, S.I. 1965 Species of the subfamily Microtinae (Rodenta) in Lebanon. M.S thesis . American University

of Beiru, 32 pp.

- Atallah, S.I. 1977 Mammals of the Eastern Mediterranean region, their Ecology. Systematic and Zoogeographical relationships- sangetierkundliche Mitteilungen 25(4): 241-320 Munchen.

- Atallah, S.I. 1977 Mammals of the Eastern Mediterranean region, their Ecology. Systematic and

Zoogeographical relationships- sangetierkundliche

Mitteilungen 26(1): 1-50 Munchen.

- Buckle, A.P 1994. Rodent Control Methods, Chemical,

pp 127-160 [In:] Rodent pests and their control A.P.

Buckle and R.H.Smith (Editors). Cab international,

Cambridge. 405 pp.

- Desoky A. S. S. 2015. Management Strategies for

Rodents within Different Ecosystems. PP. 87-167. In :

NATURAL ECOSYSTEM AND CLIMATE CHANGE,

Bharti, P.K. and K. Gajananda (eds.) Discovery

Publishing House Pub., Ptv.Ltd., New Delhi.(India).

- Desoky A. S. S. 2016. Studies on Certain Ectoparasites Associated with Some Farm Animals and their Control, Discovery THESIS The International journal, Discovery, 2016, 52(249), 1727-1932  
[http://discoveryjournals.com/discovery/current\\_issue/v52/n249/A6.pdf](http://discoveryjournals.com/discovery/current_issue/v52/n249/A6.pdf)
- Desoky A. S. S. 2016. Rodents Of Economic Importance, ./ CHAPTER/ Free-Ebooks.net.
- [www. Google.com](http://www.Google.com)
- [www.wikipedia.org](http://www.wikipedia.org)
- [www.webteb.com](http://www.webteb.com)

## وقل اعملوا فسيراً لئلا يمدحكم الله ورسوله والمؤمنون"

### صدق الله العظيم

الحمد لله له الشكر وله الحمد وله السناء الحسن، لقد وفقنا الله إلى هذا الموضوع، وإنني قد عرضت رأيي فقط، وأرجوا أن يكون وفقني الله في هذا الأمر، داعين الله عز وجل أن أكون عند حسن ظنكم بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة اله وبركاته.

الدكتور / الفاضل الدكتور / خليفة حسن عبد الجواب "شيف العلم" رحمه الله



استاذ علم الحيوان الزراعي - قسم وقاية النبات - كلية الزراعة - جامعة اسيوط

**الكاتب في سطور**



الأستاذ الدكتور/ عبد العليم سعد سليمان دسوقي الأستاذ

الدرجة العلمية: أستاذ الحيوان الزراعي بقسم وثايق النباتات - كلية الزراعة - جامعة سوهاج

التخصص العام: وثايق النباتات

التخصص الدقيق: الحيوان الزراعي

[abdelalem2011@gmail.com](mailto:abdelalem2011@gmail.com)

ثايقا: المؤتمرات العلمية و النشر العلمي:

1- بكالوريوس في العلوم الزراعية بقسم وثايق نباتات - كلية الزراعة - جامعة اسيوط 2002

2- ماجستير في العلوم الزراعية بقسم وثايق نباتات - كلية الزراعة - جامعة اسيوط 2007

3- دكتوراه في العلوم الزراعية بقسم وثايق نباتات - كلية الزراعة - جامعة اسيوط 2011

ثايقا: النشر الوطني:

1- معيد بقسم وثايق نباتات - كلية الزراعة - جامعة اسيوط (2002)

2- مدرس مساعد بقسم وثايق نباتات - كلية الزراعة - جامعة اسيوط (2007)

3- مدرس بقسم وثايق نباتات - كلية الزراعة - جامعة اسيوط (2011/12/28)

4- مدرس بقسم وثايق نباتات - كلية الزراعة - جامعة سوهاج (2012/10/1)

5- أستاذ علم الحيوان الزراعي المساعد بقسم وثايق نباتات - كلية الزراعة - جامعة سوهاج 2017/1/23

6- أستاذ الحيوان الزراعي بقسم وثايق نباتات - كلية الزراعة - جامعة سوهاج 2022/1/31

**رابعا: عضو في الجمعيات اتية:**

- 1- عضو في الجمعية المصرية للقرارص.
- 2- عضو في الجمعية المصرية الألمانية لعلم الحيوان
- 3- عضو في الجمعية العربية لوثايق النباتات.
- 4- Member of "Asian Council of Science Editors
- 5- عضو اللجنة الاستشارية للمؤتمرات الدولية ببنينديهي - الهند
- 6- عضوا في الجمعية الدولية للتربية والاعتماد (ISDS)
- 7- معتمد دولي أكثر من 100 مجلة دولية

**خامسا: الوظائف القيادية او الإشرافية**

- 1- مدير فرع الاتحاد العربي للتربية المستدامة والبيئة بمحافظة سوهاج بداية من 7/ 11/ 2015 و حتى الآن. و مدرب معتمد لدى الاتحاد العربي للتربية المستدامة والبيئة
- 2- المشرف العلمي لجانحة الأثاث بجامعة سوهاج .
- 3- مدير وحدة مكانحة الأثاث بكلية الزراعة- جامعة سوهاج

**سادسا: الجوائز**

- حاصل فني جائزة الجامعة التكنولوجية في العلوم الزراعية والطب البيطري للعام الجامعي 2016/2015
- حاصل ميدانته في العديد من الجوائز وورش العمل والمؤتمرات على المستوى القومي والدولي
- تلقى ميدانته العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه على المستوى القومي
- ميدانته عضو تحرير ومعتمد في العديد من المجلات العلمية الدولية
- لميدانته أكثر من 100 بحث دولي في مجال التخصصي تم نشرها في مجلات دولية و عالمية . منها ذات معامل تأثير عالي
- لميدانته العديد من المقالات و الكتب العلمية في العديد من الدول العربية مثل المملكة العربية السعودية – الكويت- قطر- السودان- سوريا – الأردن – فلسطين

التصديق