

استعمال المبيدات فى مكافحة الأمراض والآفات

أصبحت المعاملة بالمبيدات من الممارسات الزراعية التى تجرى بصورة روتينية فى حقول إنتاج الخضر. وبالرغم من أن أحد أهداف هذا الكتاب الحد من استعمال المبيدات مكافحة آفات الخضر، إلا أن الاستغناء عنها كلية أمر ليس واردًا؛ فهى أحد العناصر الأساسية فى مكافحة المتكاملة.

تستخدم المبيدات - بصفة أساسية - فى مجال الوقاية من الأمراض والآفات، إما بجعلها على شكل غطاء رقيق يحيط بالأعضاء النباتية، وإما بجعلها فى صورة جهازية داخل النبات. وفى كلتا الحالتين يؤدى المبيد إلى وقاية النبات من الإصابة. كما قد يستخدم المبيد - كعلاج يؤدى إلى موت الآفة - فى الأجزاء النباتية المصابة، أو يوجه نحو الآفة فى بيئة الزراعة. وفى كلتا الحالتين الأخيرتين يكون الهدف من استعمال المبيد هو تحقيق مبدأ الاستئصال.

وتستخدم المبيدات على نطاق واسع فى مكافحة الحشائش. والأمراض الفطرية، والحشرات، والأكاروس، والنيماطودا، والقوارض، كما يوجد القليل من المبيدات التى تستخدم فى مكافحة الأمراض البكتيرية، بينما لا توجد مبيدات تفيد مع الفيروسات النباتية.

يوجد لكل مبيد - عادة - اسمان: يعرف أحدهما بالاسم العادى Common Name، وهو يبدأ - فى الإنجليزية - بحرف صغير، ويعرف الآخر بالاسم التجارى Trade Name، وهو يبدأ - دائماً - فى الإنجليزية بحرف كبير. وقد تنتج المبيد الواحد أكثر من شركة، ويعرف - حينئذٍ - بأسماء تجارية مختلفة، بالرغم من تماثل المادة الفعالة فى كل مبيد منها.

وتتوفر المبيدات على الصور التالية:

١ - مساحيق تعفير dust.

استعمال المبيدات فى مكافحة الأمراض والآفات

- ٢- مساحيق قابلة للبلل wettable powder .
- ٣- مستحلبات مركزة emulsible concentrate .
- ٤- حبيبات granules .

تستعمل مساحيق التعفير بنفس الصورة التى تباع عليها باستعمال العفارات. وتخفف المساحيق القابلة للبلل والمستحلبات بالماء، وتعامل بها النباتات رشا بالتركيزات الموصى بها. أما الحبيبات، فهى عبارة عن كتل طينية صغيرة مشبعة جيداً بالمبيد. وتتم المعاملة بها بالطائرات، أو بآلات التسميد، أو بآلات الزراعة، وتستخدم لمعاملة كل من التربة والنبات. ومن أهم مميزاتهما أنها لا تترك بقايا سامة كثيرة كما فى حالات التعفير والرش.

المبيدات الفطرية

تُصنف المبيدات الفطرية إل فئتين، هما: الوقائية protectants، والعلاجية eradicants.

تُستعمل المبيدات الوقائية كحاجز كيميائى ضد الإصابة بالفطريات، وهى لا تمتص بواسطة النباتات، ولا تؤثر فى الإصابات الموجودة بالفعل، وليس لاستعمالها من هدف سوى منع إنبات الجراثيم الفطرية وإصابتها للنبات. وإذا ما كانت هناك إصابة ما فإن البقع المرضية تتكون وتنتج مزيداً من الجراثيم الفطرية على الرغم من تواجد المبيد الوقائى على السطح الخارجى للنبات. ونظراً لحتمية ملامسة المبيد الوقائى للجرثومة النابتة لكى يكون فعالاً، فإن التغطية غير التامة للسطح النباتى بالمبيد الوقائى يمكن أن ينتج عنها مستويات عالية من الإصابة. ولذا .. تجب المعاملة بالمبيدات الوقائية عدة مرات خلال موسم النمو وبطريقة تسمح بتوفير تغطية مقبولة بالمبيد.

تعد المبيدات الوقائية واسعة المدى broad spectrum ذلك لأنها غالباً ما تكون مؤثرة فى مجموعات متباينة من الفطريات الممرضة.

هذا .. وتعد المبيدات النحاسية من المبيدات الفطرية الوقائية المتوسطة الفاعلية، فضلاً عن كونها من المبيدات البكتيرية الأساسية.

الفصل الخامس

أما المبيدات العلاجية فإنها تسمى - كذلك - بالجهازية systemic لأنها تُمتص داخل النبات، حيث يمكنها التخلص من الإصابات المتواجدة بالفعل. ومن مميزات استعمال المبيدات الجهازية أنها لا تتطلب التغطية الكاملة للأسطح النباتية؛ وبذا لا يلزم معها تكرار المعاملة على فترات متقاربة. ويمكن اللجوء إلى الفحص الدورى للحقل قبل اتخاذ القرار باستعمال مبيد علاجي. هذا .. إلا أن تكرار الاعتماد على مبيد علاجي واحد يمكن أن يترتب عليه تكوين سلالات من الفطر المستهدف تكون مقاومة له. ويمكن الحد من ذلك الخطر باستعمال المبيدات العلاجية مخلوطة بمبيد وقائي واسع المدى.

ويعطى جدول (٥-١) قائمة ببعض المبيدات وبدائل المبيدات الفطرية الشائعة الاستعمال، والمواد الفعالة التي تحتويها، والشركات المنتجة لها.

جدول (٥-١): المركبات الفعالة التي توجد في بعض المبيدات وبدائل المبيدات الفطرية والشركات المنتجة لها.

الشركة المنتجة	الاسم التجارى	الاسم العادى (المادة الفعالة)
Syngenta	Actigard	acibenzolar-S-methyl
Bayer	Aliette	fosetyl-Al
Syngenta	Amistar, Quadris	azoxystrobin
Syngenta	Quadris Opti	azoxystrobin, chlorothalonil
Syngenta	Quilt	azoxystrobin, propiconazole
BASF	Endura, Pristine	boscalid
Syngenta	Bravo 500	chlorothalonil
Syngenta	Bravo Ultrex	
Syngenta	Bravo Weather Stik	
Syngenta	Bravo Zn	
Griffin	Equus	
SIPCAM	Echo	
Griffin	Kocide 101	copper hydroxide
Agrol	Champion	
Agrol	Champ	
Griffin	Basicop	copper sulfate basic
Ceraxagri	Cuprofix Disperse	
Citco	Tribasic Copper Sulfate	

استعمال المبيدات في مكافحة الأمراض والآفات

تابع جدول (١-٥).

الشركة المنتجة	الاسم التجاري	الاسم العادي (المادة الفعالة)
Tennessee Chemical	Citcop 5E	copper resinate
DuPont	Curzate DF	cymoxanil
DuPont	Tanos	cymoxanil, famoxadone
ISK Biosciences	Ranman	cyazofamid
Syngenta	Switch	cyprodinil/fludioxonil
Bayer	Reason	fenamidone
Gowan	Botran	dichloro-nitroaniline
BASF	Acrobat, Forum	dimethomorph
Bayer	Rovral	iprodione
Rohm & Haas, Dow Agrosience	Gavel, Dithane M-45, DF	mancozeb
Griffin	Manzate 200DF	
Cerexagri	Penncozeb	
Cerexagri	Penncozeb DF	
Griffin	Manex II	maneb
Cerexagri	Maneb 80	
Griffin	Manex	
Syngenta	Ridomil Gold Copper	mefenoxam
Syngenta	Ridomi Gold Bravo	
Syngenta	Ridomil Gold EC	
Syngenta	Ridomil Gold MZ	
Dow Agro	Nova	myclobutanil
Uniroyal Chemical	Terrachlor	PCNB
Agrichem	Agri-Fos	phosphorous acid
Nufarm	Phostrol	
Luxembourg	Prophyt	
Bayer	Previcur Flex	propamocarb
Syngenta, Dow Agrosience	Tilt, Propimax	propiconazole
BASF	Cabrio, Headline EC, Pristine	pyraclostrobin
Bayer	Scala	pyrimethanil
Cerexagri	Topsin M	thiophanate methyl
Griffin	Super-tin	triphenyltin hydroxide
Bayer	Flint	trifloxystrobin

الفصل الخامس

تابع جدول (٥-١).

الشركة المنتجة	الاسم التجارى	الاسم العادى (المادة الفعالة)
Bayer	Gem	
Uniroyal Chemical	Procure 50WS	triflumizole
Dow Agroscience	Gavel 75DF	zoxamide

المبيدات البكتيرية

لا يوجد سوى القليل من المبيدات التى يمكن استخدامها فى مكافحة الأمراض البكتيرية، فمثلاً .. أمكن مكافحة اللفحة الهالية فى الفاصوليا فى نيوزيلندا، والولايات المتحدة بالرش بمحلول بوردو. وفى الولايات المتحدة كان محلول بوردو أفضل من الاستربتومايسين.

كما أمكن مكافحة كل من البكتيريا *Xanthomonas phaseoli* و *Pseudomonas syringae*، المسببتين لمرض اللفحة العادية، والتبقع البنى فى الفاصوليا على التوالى برش النباتات بكبريتات النحاس Tribasic Copper Sulphate، أو بأيدروكسيد النحاس Basic Copper Hydroxide.

وتحققت أفضل مكافحة للبكتيريا *Xanthomonas* التى تسبب مرض تبقع الأوراق البكتيرى فى كل من الفلفل والطماطم برش النباتات بمخلوط من الاستربتومايسين مع كبريتات النحاس، لكن كفاءة الاستربتومايسين انخفضت مع ظهور سلالات جديدة مقاومة من البكتيريا (Dixon ١٩٨١).

كما يذكر Kousik وآخرون (١٩٩٤) أن رش نباتات الفلفل دورياً بكل من النحاس مع المانيب كان أفضل وسيلة للوقاية من الإصابة بالبكتيريا *Xanthomonas campestris* pv. *vesicatoria* المسببة لمرض التبقع البكتيرى.

وفيما عدا هذه الأمثلة - وهى التى يمكن اعتبار معظمها من بدائل المبيدات -، فإن استخدام المبيدات فى مكافحة الأمراض البكتيرية يعد قليل الأهمية بالنسبة لطرق مكافحة الأخرى.

المبيدات الحشرية

تصنف المبيدات - حسب طبيعة فعلها على الحشرات - كما يلي:

سموم معدية Stomach Poisons

تحدث هذه السموم تأثيرها بعد أن تصل إلى الجهاز الهضمي للحشرة؛ حيث تؤثر على بروتين الخلايا، وخاصة خلايا الطبقة الطلائية المبطنة للمعدة الوسطى، وتؤدي إلى ترسيبه.

وتتوفر هذه المبيدات على نوعين، كما يلي:

١- سموم معدية جهازية Systemic Stomach Poisons:

هي مبيدات جهازية بالنسبة للنبات؛ لأنها تنتقل إلى جميع أجزائه بعد معاملة أي جزء منه (البذور التي يراد زراعتها، أو الجذور، أو النموات الخضرية) بها. وربما لا تكون المبيدات ذاتها سامة للحشرة المعنية، ولكنها تتحول بعد امتصاص النبات لها إلى مركبات سامة لتلك الحشرة. وتستمر فاعلية هذه المبيدات - عادة - لعدة أسابيع بعد معاملة النباتات بها.

ومن أهم مميزات المبيدات الجهازية ما يلي:

- أ - وقاية النباتات من الآفات الحشرية لفترات طويلة.
- ب- استمرار وصولها إلى النموات النباتية الجديدة التي تتكون بعد المعاملة بها؛ الأمر الذي يفيد في مكافحة الإصابات الجديدة من الآفة.
- ج- يكون تأثيرها ضعيفاً على الطفيليات، والمفترسات، والحشرات النافعة.

هذا .. ولا توجد أية مشاكل تتعلق باستعمال هذه النوعية من المبيدات بالنسبة لحقول إنتاج بذور الخضر المعدة لاستعمالها كتناول. ولكن استعمالها في حقول الخضر المعدة للاستهلاك يجب أن يتوقف قبل الحصاد بعدة أسابيع، وبحد أدنى لا يقل - عادة - عن أسبوعين.

٢- سموم معدنية غير جهازية Non-Systemic Stomach Poisons:

تبقى هذه المبيدات بعد المعاملة بها على سطح الثمرة أو النمو الخضري؛ حيث تحدث تأثيرها على الحشرة بعد قرضها للأسطح النباتية المغطاة بالمبيد.

مبيدات تقتل باللامسة Contact Insecticides

تقتل هذه المبيدات الحشرات بمجرد ملامستها لها، وتدخّل إليها من أى طريق (الجهاز التنفسي، أو الجلد، أو الجهاز الهضمي)، ولا يشترط لفاعليتها أن تكون للحشرة أجزاء فم من نوع خاص؛ فهي تبدأ مفعولها بمجرد ملامسة الحشرة لها.

ومن أمثلة المبيدات التي تقتل باللامسة ما يلي،

١- مبيدات التبخير Fumigants:

تم المعاملة بها دائماً في صورة غازية، فيما يعرف بـ "عملية التبخير". تستعمل هذه المبيدات في الأماكن المغلقة، مثل المخازن، والبيوت المحمية. وهي تؤثر عن طريق الفتحات التنفسية.

٢- الأيروسولات Aerosols:

هي مركبات سامة ذائبة في غاز سائل تحت ضغط؛ حيث تنطلق عند تخفيف الضغط، وتنتشر في الهواء على صورة جزيئات دقيقة جداً من المبيد. وهي - كذلك - تستعمل في الأماكن المغلقة غالباً.

٣- المبيدات العادية التي تستعمل رشا تحت ضغط عال.

وتقسم المبيدات الحشرية التي تؤثر باللامسة - حسب طريقة عملها - كما

يلي،

١- سموم طبيعية Physical Poisons:

يكون تأثير هذه المبيدات طبيعياً بحثاً؛ ومن أمثلتها ما يلي:

أ- الزيوت الثقيلة التي تؤدي إلى اختناق الحشرة (Suffocation)؛ بسبب إغلاقها للأنايب الدقيقة التي تمتد من سطح الحشرة إلى داخلها وتعمل على توصيل الأكسجين إلى جميع أجزائها.

ب- المساحيق الخاملة التي تؤدي إلى تجريح طبقة الجلد، وتعرض الأنسجة الداخلية للجفاف (Dessicating Action)؛ مثل أكسيد الألومنيوم، والشاركول الذي يؤثر على الحشرة؛ بامتصاص رطوبتها وتجفيفها هيجروسكوبياً. وتؤثر تلك المركبات

استعمال المبيدات فى مكافحة الأمراض والآفات

على الغطاء الزيتى أو الشمعى الرقيق الذى يغطى جلد (Cuticle) الحشرة، ويمنع فقدها لرتوبتها.

٢- سموم تنفسية Respiratory Poisons:

تؤثر هذه المبيدات على الجهاز التنفسى أو إنزيمات التنفس.

٣- سموم عصبية Nervous System Poisons:

تؤثر هذه المبيدات على الجهاز العصبى بقدرتها على نفاذها السريع خلال الأنسجة الليبيدية التى تغلف الأعصاب؛ ومنها معظم المبيدات الكلورونية والفوسفورية (عن عزوع وآخريين ١٩٧٢، و Stimmann وآخريين ١٩٨٦).

ويعطى جدول (٢-٥) قائمة ببعض المبيدات وبدائل المبيدات الحشرية الشائعة الاستعمال، والمواد الفعالة التى تحتويها، والشركات المنتجة لها.

جدول (٢-٥): بيان بعض المبيدات وبدائل المبيدات الحشرية والأكاروسية الشائعة الاستعمال والمواد الفعالة التى تحتويها والشركات المنتجة لها.

الشركة المنتجة	المنتج التجارى	الاسم العادى (المادة الفعالة)
Syngenta	Agri-Mek	abamectin
Valent	Orthene	acephate
Cerexagri	Assail	acetamiprid
Certis	Neemix	azadirachtin
Bayer	Guthion	aziphosmethyl
Certis, Valent	Agree, Xentari	<i>Bacillus thuringiensis</i> var. <i>aizawai</i>
Valent, Certis, DuPont	Biobit, Dipel, Javelin, Lepinox	<i>B. thuringiensis</i> var. <i>kurstaki</i>
Mycogen, Novo Nordisk	Novodor	<i>B. thuringiensis</i> var. <i>tenebrionis</i>
Crompton/Uniroyal	Acramite	bifenazate
FMC	Capture	bifenthrin
Bayer, Helena, Wibur-Ellis	Sevin	carbaryl
FMC	Furadan	carbofuran
AMVAC	Fortress	chlorethoxyfos
Dow Agrosciences, Gowan	Lorsban	chlorpyrifos
Bayer	Aztec, Naythroid	cyfluthrin
Syngenta	Warrior	cyhalothrin

الشركة المنتجة	المنتج التجارى	الاسم العادى (المادة الفعالة)
FMC	Ammo	cypermethrin
Syngenta	Trigard	cyromazine
Micro Flo, Gowan, Helena	Diazinon	diazinon
Gowan, Helena, Micro Flo	Dimethoate	dimethoate
Bayer	Di-Syston	disulfoton
Syngenta	Proclaim	emamectin
Bayer, UCPA, Helena, Micro Flo, Drexel	Endosulfan, Phaser, Thiodan	endosulfan
DuPont	Asna XL	esfenvalerate
Bayer	Mocap	ethoprop
Valent	Danitol	fenpropathrin
Bayer	Admire, Provado	imidacloprid
PuPont	Avaunt	indoxacarb
Many	Malathion	malathion
Valent, Bayer	Monitor	methamidophos
PuPont	Lannate	methomyl
Dow AgroSciences	Intrepid	methoxyfenozide
Cerexagri	PennCap-M	methyl parathion
Valent	Dibrom	nbaled
PuPont	Vydate	oxamyl
AMVAC, FMC	Ambush, Pounce	permethrin
Micro Flo	Thimet	phorate
Gowan	Imidan	phosmet
Syngenta	Fulfill	pymetrozine
Valent	Knack	pyriproxifen
Gowan, Cerexagri	Cryolite, Kryocide	sodium alumino fluoride
Dow Agrosciences	Spin Tor/Entrust	spinosad
Dow Agrosciences	Confirm	tebufenozide
BASF	Counter	terbufos
Syngenta	Actara, Platinum	thiamethoxam
Bayer	Larvin	thiodicarb
FMC	Mustang, Mustang MAX	zeta-cypermethrin

معاملة البذور بالمبيدات

تتم معاملة البذور بالمبيدات - بمعرفة شركات إنتاج البذور - بإحدى الطرق التالية:

١- المعاملة الجافة Dry Treatment:

يخلط مسحوق المبيد بالبذور، وسواء أكان المبيد ساماً للإنسان، أم غير سام، فيجب تجنب استنشاقه؛ وذلك باستخدام الأقنعة الواقية؛ لأن وجود الإنسان فى هذا الجو لمدة طويلة يعرضه للأخطار.

٢- المعاملة بالابتلال Wet Treatment:

تتم المعاملة بنقع البذور فى معلق أو محلول المبيد؛ فالكالوميل Calomel مثلاً يكون معلقاً فى الماء، أما السليمانى Corrosive Sublimate، فيذوب فى الماء. وبرغم أن هذه الطريقة سهلة، إلا أنها تتطلب إعادة تجفيف البذور؛ الأمر الذى يزيد من تكاليف المعاملة.

٣- المعاملة بالمعجون الرقيق القوام من المبيد والماء Slurry treatment:

يحضر المبيد فى صورة مركزة تعرف بالـ slurry، وهو معجون رقيق القوام من المبيد والماء. وتتم المعاملة بإضافة كميات محدودة من الـ slurry إلى ماكينات معاملة البذور التى تقوم بخلطها معاً بصورة جيدة، وتخرج البذور من الآلة شبه جافة. فلا تلزم إعادة تجفيفها. وتعبأ البذور - عادة - بعد المعاملة مباشرة.

ومن بين المبيدات الفطرية المستعملة فى معاملة البذور ما يلى:

١- الكابتان captan (يحتوى على كابتان).

٢- ماكسيم Maxim (يحتوى على fludioxonil).

٣- ثيرام (يحتوى على ثيرام).

٤- أبرون Apron (يحتوى على mefenoxam).

٥- أليجانس Allegiance (يحتوى على metalaxyl).

التوقيت المناسب للمكافحة بالمبيدات

يفضل - دائماً - أن يكون الرش فى حالة الأمراض الفطرية وقائياً؛ أى يجرى قبل

الفصل الخامس

ظهور أية أعراض مرضية، خاصة مع المحاصيل التى تتوقف جودتها وسعرها على مظهرها العام؛ مثل: الخس والكرفس. ويجرى الرش كل ٧-١٠ أيام. وقد تقل الفترة عن ذلك فى المواسم الممطرة بسبب إزالة الأمطار الغزيرة للمبيد، وسرعة انتشار الأمراض الفطرية والبكتيرية فى الجو الرطب.

أما فى حالة الإصابات الحشرية، فإن المعاملة بالمبيدات تكون مع بدء توالد وتكاثر الحشرات؛ أى بعد ظهور مبادئ الإصابة.

ويجب دائماً فحص حقول الخضر كل ٢-٣ أيام؛ بحثاً عن ظهور أمراض أو حشرات جديدة، وأطوار مختلفة من الحشرات؛ حتى تجرى المكافحة فى الوقت المناسب للحصول على أفضل النتائج.

إن الحد من استعمال المبيدات، مع تجنب الخسائر المرضية يتحقق بإجراء الرش فى الوقت المناسب فقط؛ الأمر الذى يتوقف على أربعة أمور، هى:

- ١- متابعة حالة الإصابة الفعلية تحت ظروف الحقل disease scouting.
- ٢- متابعة التغيرات فى العوامل الجوية.
- ٣- وجود برامج للتنبؤات المرضية disease forecasts.
- ٤- التعرف على الحدود الحرجة thresholds للإصابات المرضية التى يتعين بدء المكافحة عندها.

وتتوفر برامج للتنبؤ بالأمراض خاصة بأمراض معينة، مثل: الندوة المبكرة والندوة المتأخرة فى البطاطس والطماطم، ولفحة أوراق بوتريتس، والألترناريا، والبياض الزغبى فى البصل، والعفن الأبيض فى الفاصوليا الخضراء.

الأمور التى يجب مراعاتها عند استخدام المبيدات فى المكافحة

يجب عند استخدام المبيدات فى مكافحة أمراض وآفات الخضر مراعاة ما يلى:

- ١- الأمور المتعلقة بالصحة العامة؛ مثل سلامة القائمين بعملية المكافحة (يراعى فى هذا الشأن درجة سمية كل مبيد)، وعدم المعاملة بالمبيدات إلا بعد ضمان مرور فترة لا تقل عن حد معين قبل الحصاد. وتختلف هذه الفترة باختلاف المبيدات، ولكنها نادراً

استعمال المبيدات فى مكافحة الأمراض والآفات

- ما تقل فى المبيدات الحشرية عن أسبوعين. ويستثنى من ذلك المبيدات النباتية، والزيوت المستخدمة فى مكافحة؛ حيث يمكن المعاملة بها قبل الحصاد بأيام قليلة.
- ٢- مراعاة مدى سمية المبيدات على النحل. مع الاحتفاظ بالنحل داخل خلاياه أثناء الرش، ولمدة يوم أو يومين بعد الرش فى حالة المبيدات الشديدة السمية للنحل.
- ٣- التوقيت المناسب للمعاملة بالمبيد بالنسبة لكثافة الإصابة الحشرية؛ فلا يُجرى الرش عند ظهور أفراد قليلة من الحشرات التى يُراد مكافحتها، ولا يُؤجل الرش إلى أن يستفحل خطرهما وتكثر أضرارها.
- ٤- يوقف الرش عندما تزيد سرعة الرياح على ١٠ كيلومترات فى الساعة.
- ٥- يجرى التعفير بمساحيق المبيدات فى الصباح الباكر حينما تكون الأسطح النباتية مبللة بالندى.
- ٦- عدم إجراء الرش وقت اشتداد درجة الحرارة، أو عند توقع اشتداد الحرارة بعد الرش مباشرة (حتى لا تُضار النباتات من جراء ذلك)، أو عند توقع المطر بعد الرش مباشرة؛ حتى لا يغسل المبيد من على الأسطح النباتية بفعل الأمطار.
- ٧- عدم تكرار استخدام نفس المبيد مرة تلو الأخرى؛ حتى لا يؤدي ذلك إلى ظهور سلالات من الآفات مقاومة للمبيد المستعمل.
- ٨- ضرورة أن يغطى محللول الرش كل أجزاء النبات، وأن يكون الرش منتظماً.
- ٩- عدم ترك خطوط بدون رش فى الحقل؛ حتى لا تكون مصدراً لإعادة الإصابة.
- ١٠- يستعان بمصفاة عند ملء الرشاشات لحجز الشوائب التى تؤدي إلى انسداد البشابير.
- ١١- يكون سير العمال عند الرش فى اتجاه الرياح، وتُوقَفُ عمليةُ الرش فى حالة اشتداد الرياح.
- هذا .. ويمكن ضمان وصول المبيد إلى كافة أوراق النبات وتغطية الأوراق من سطحها بزيادة الضغط؛ حتى يكون المبيد فى صور ضباب، فتتعلق قطراته الصغيرة جداً بأوراق وسيقان النباتات، دون أن تتجمع، وبالتالي لا تسقط على الأرض.

الفصل الخامس

وليس المهم كمية الماء المستعملة فى الرش، لكن المهم هو أن يصل المبيد إلى كافة أجزاء النباتات بالمعدل الموصى به لوحدة المساحة.

استعمال المواد المساعدة لزيادة فاعلية المبيدات

يضاف إلى المبيدات عند المعاملة بها مواد تزيد من فاعليتها، يطلق عليها اسم Adjuvants، وهى قد تكون مواد لاصقة للمبيد على الأسطح النباتية stickers، أو ناشرة له spreaders (تقلل من توتره السطحي)، أو منشطة لفعله activators، أو تؤدى إلى استمرار مفعوله لفترة أطول extenders. ومن أمثلة المواد المساعدة ما يلى:

المادة (المنتج التجارى)	طبيعة فعلها
بيو ٨٨ 88 - Bio	ناشرة ومنشطة
بفراكس Buffer x	ناشرة، ومنشطة، وتحمى النباتات من محاليل الرش القلوية
نوفيلم ١٧ 17 - Nu-Film	لاصقة، وناشرة، وتطيل فترة مفعول المبيد
ترايتون بى ١٩٥٦ 1956 - Triton B	لاصقة وناشرة
سوبر فيلم ٧٠ 70 - Super-Film	ناشرة
بيس Pace	ناشرة
توين ٢٠ 20 - Tween	ناشرة
رجيوليد Regulaid	ناشرة

متطلبات الأمان عند استعمال المبيدات

بداية .. يجب التعرف على مدى خطورة المبيدات المستعملة

وتقسم المبيدات حسب سميتها إلى أربع فئات، كما يلى،

١- شديدة السمية (class I) .. وتأخذ العلامة (signal word): "خطر" danger، أو "خطر-سم" danger-poison.

٢- متوسطة السمية (class II) .. وتأخذ العلامة: "تحذير" warning.

استعمال المبيدات في مكافحة الأمراض والآفات

٣- قليلة السمية (class III) وتأخذ العلامة " احتراس " caution.

٤- غير سام نسبياً (class IV) .. وتأخذ العلامة " احتراس " caution.

ويحدد لاستعمال كل مبيدات متطلباته أمان معينة، كما يلي،

- ١- فترة الأمان لأجل دخول الحقل من جديد reentry interval (اختصاراً REI):
وهي الفترة التي يتعين مرورها بين المعاملة بالمبيد ودخول العمال في الحقل العامل من جديد دونما حاجة إلى ارتداء ملابس واقية، علماً بأن نوع الملابس الواقية يختلف باختلاف المبيد المستعمل.
- ٢- فترة الأمان للحصاد pre-harvest interval (اختصاراً PHI):
وهي الفترة التي يجب مرورها بين المعاملة بالمبيد وقبل حصاده: ليكون استهلاكه آمناً.

تطوير المبيدات المرضية لسلاسل مقاومة للمبيدات

- تُقسم المبيدات الفطرية إلى مجموعات مرقمة تحتوي كلا منها على مبيدات معينة أو مجموعات معينة من المبيدات، ويبنى هذا التقسيم (الذي وضع بواسطة الـ Fungicide Resistance Action Committee) في الولايات المتحدة الأمريكية) على أساس أمرين. هما:
- ١- مدى سهولة تطوير الفطريات لسلاسل مقاومة لمبيدات كل مجموعة.
 - ٢- مدى تقارب مبيدات كل مجموعة من بعضها البعض.

وتضم المجموعات التالية مبيدات الخضر الفطرية التي تطور المبيدات المرضية لسلاسل مقاومة لها بسهولة ('at risk fungicides')

المبيدات	المجموعة (Group)
benzimidazoles (ex. thiabendazole, Mertect, and the previous product benomyl, Benlate) and thiophanates (ex. thiophanate-methyl, Topsin M);	Group 1
dicarboximides (ex. iprodione, Rovral and the previously registered product vinclozolin, Ronilan);	Group 2

الفصل الخامس

المبيدات	المجموعة (Group)
Demethylation inhibitors (DMIs) <i>imidazoles</i> (ex. triflumizole, Procure) and <i>triazoles</i> (ex. mycobutanil, Nova; propiconazole, Tilt; and the previous product triadimefon, Bayleton);	Group 3
phenylamides, <i>acylalanines</i> (metalaxyl, Ridomil and mefenoxam, Ridomil Gold or Ultra Flourish);	Group 4
carboxamides (ex. flutolanil, MonCoat and Moncut; boscalid, Endura)	Group 7
anilinopyrimidines (ex. cyprodinil, Vanguard and pyrimethanil, Scala);	Group 9
Quinone outside inhibitors (QoI) (ex. azoxystrobin, Quadris; pyraclostrobin, Headline and Cabrio; trifloxystrobin, Flint and Gem	Group 11
phenylpyrroles (ex. fludioxonil, Maxim)	Group 12
quinolines (ex. Quintec, quinoxifen);	Group 13
aromatic hydrocarbons (ex. dicloran, Botran; quintozene (PCNB), Blocker or Terraclor);	Group 14
cinnamic acids (ex. dimethomorphy, Acrobat of Forum);	Group 15
Quinone inside inhibitors (QII), cyanoimidazole (ex. cyazofamid, Ranman);	Group 21
benzamides (zoxamide, Gavel);	Group 22
glucopyranosyl antibiotic (ex. Streptomycin) (ex. streptomycin sulfate, Agri-mycin 17, and Agricultural streptomycin, and Firewall	Group 25
cyanoacetamideoximes (cymoxanil, Curzate);	Group 27
carbarnates (ex. propamocarb, Previcur Flex).	Group 28

لا يجوز استعمال أى من تلك المبيدات فى المكافحة بصورة مستمرة، وإن كان ولا بد من استعمالها أحياناً فإن ذلك يجب أن يتم بالتبادل مع مبيدات من مجموعات أخرى من تلك المبيدات أعلاه، أو مع مبيدات من تلك المبيدات أدناه، والأفضل الاعتماد على مبيدات المجموعات المبيدات أدناه، وهى التى لم تعرف معها أى مشاكل تتعلق بتطوير المسببات المرضية مقاومة ضدها.

استعمال المبيدات فى مكافحة الأمراض والآفات

وفيما يلى قائمة مجموعات المبيدات الفطرية التى لا توجد خطورة من استعمالها فيما يتعلق بتطوير مقاومة خضعا،

المبيدات	الجموعه (Group)
2,6-dinitroanilines (ex. fluazinam, Omega)	GROUP 29
organo tin compounds, tri phenyl tin compounds (ex. fentin hydroxide, Super Tin)	GROUP 30
phosphonates, ethyl phosphonates (ex. fosety-Al, Aliette), and phosphorous (ex. fphosphorous acid, ProPhyt and Phostrol);	GROUP 33
(multi-site activity);	GROUP M
inorganics (ex. Coppers, Kocide, Champion, etc.; and sulfur, Microthiol Disperss);	GROUP M1
phthalimides (ex. captan, Captan); dithiocarbamates (ex. mancozeb, Dithane, Manzate, Penncozeb; maneb, Maneb 75DF. Manex; metiram, Polyram; thiram, Thiram 50WP; ziram, Ziram 76DF; Group 4 <i>phthalimides</i> , captan (seed treatment only);	GROUP M2
<i>chloronitriles</i> (ex. Chlorothalonil, Bravo, Applause, Echo, Equus);	GROUP M5
(host plant defense induction)	GROUP P
Benzo-thiadiazole (ex. acibenzolar-S-methyl, Actigard)	GROUP P1
harpin protein (ex. Messenger)	GROUP P2
Biologicals (ex. Fungal and bacterial species, Contans, Serenade, Sonata, and T-22)	GROUP B

وتجدر الإشارة إلى أن اللجوء إلى استعمال المبيدات التى تطور المسببات المرضية سلالات مقاومة لها بسهولة (وهى التى تعرف باسم 'at risk' fungicides) عند اشتداد الإصابة يزيد كثيراً من فرصة ظهور تلك السلالات المقاومة (جامعة Carnell – الإنترنت – ٢٠٠٨).

وعندما خلط المبيد الجهازى مثل الميتالاكسيل مع مبيد آخر وقائى مثل الكلوروثالونيل chlorothalonil فإن الأخير يمنع الطفرات لمقاومة للأول من الاستمرار فى إحداث إصابة جديدة وتكوين سلالة جديد مقاومة منها.

الفصل الخامس

ومن أهم ما تجب مراعاته لتجنب تطوير مقاومة فطرية للمبيدات هي حقل
الزراعة ما يلي،

١- استعمال المبيدات الجهازية قبل بداية ظهور الأعراض المرضية وليس بعد ظهورها.

٢- استعمال المبيدات الجهازية المخلوط معها مبيدات وقائية أو خلطهما معاً.

٣- استعمال المبيدات الجهازية بالتبادل مع المبيدات الوقائية، أو بالتبادل مع مبيدات جهازية تنتمي إلى مجموعات كيميائية مختلفة تماماً تجنباً لتطوير سلالات مقاومة لكلا المبيدين.

٤- عدم استعمال مبيد جهازى واحد فى أكثر من ثلث إلى نصف عدد الرشاش فى الموسم الواحد (Isakeit & Philley ٢٠٠٧).

ويعطى جدول (٥-٣) مدى احتمال تطوير الفطريات لسلالات مقاومة لبعض المبيدات، ومدى تباين فعل تلك المبيدات على أيض الفطريات؛ لأجل تنويع استخدام المبيدات بناء على فعلها؛ حتى يمكن إبطاء ظهور سلالات جديدة مقاومة.

أما جدول (٥-٤) فيعطى قائمة من الأمثلة لحالات مقاومة للمبيدات الفطرية والبكتيرية حدثت بالفعل فى بعض الفطريات والبكتيريا.

هذا .. وتعد مبيدات الاستروبيلورين strobilurin من أكثر المبيدات التى ظهرت طفرات مقاومة لها بين الفطريات، ويعطى جدول (٥-٥) أمثلة كثيرة لتلك المقاومة.

جدول (٥-٣): احتمالات تطوير الفطريات لسلالات مقاومة لبعض المبيدات، وتباين فعل تلك المبيدات على أيض الفطريات.

المادة الفعالة	الاسم التجارى	المقاومة	تبيان فعل المبيدات على أيض الفطريات
ciorothalonil	Bravo, Echo, Equus	منعممة إلى منخفضة	M
cooper	كثيرة	منعممة إلى منخفضة	M
Manzate, mancozeb/maneb, Penncozeb/Maneb, Manex	Dithane,	منعممة إلى منخفضة	M

استعمال المبيدات في مكافحة الأمراض والآفات

تابع جدول (٥-٣).

تبيان فعل المبيدات على أيض الفطريات	احتمالات تطویر المقاومة	الاسم التجارى	المادة الفعالة
M	منعدمة إلى منخفضة	Microthiol, Thiolux Jet	sulfur
M	منعدمة إلى منخفضة	Ziram	ziram
11	عالية	Amistar, Quadris	azoxystrobin
7	متوسطة	Endura	boscalid
7, 11	متوسطة إلى عالية	Pristine	boscalid(7) + pyraclostrobin(11)
21	متوسطة إلى عالية	Ranman	cyazofamid
27	متوسطة إلى عالية	Curzate	cymoxanil
27, 11	عالية	Tanos	cymoxanil (27) + famoxodone (11)
9, 12	منخفضة إلى متوسطة	Switch	cyprodinil (9) + fludioxonil (12)
15	متوسطة	Acrobat, Forum	dimethomorph
11	عالية	Reason	fenamidone
33	منخفضة	Aliette	fosety-Al
2	متوسطة	Rovral	ipridione
M, 22	منخفضة إلى متوسطة	Gavel	mancozeb (M) + zoxamide (22)
4	عالية	Ridomil	mefenoxam
3	متوسطة	Nova	myclobutanil
28	منخفضة إلى متوسطة	Propimax, Previcur Flex	propamocarb
3	متوسطة	Tilt	propiconazole
11	عالية	Cabrio, Headline	pyraclostrobin
9	متوسطة	Scala	pyrimethanil
1	عالية	Topsin	thiophanate-methyl
11	عالية	Flint, Gem	trifloxystrobin
3	متوسطة	Procure	triflumizole
P	منعدمة إلى منخفضة	Actigard	acibenzolar-S-methyl
	منعدمة إلى منخفضة	Messenger	harpin

(أ) M: تعنى أن المبيد يؤثر على عديد من المواقع الأيضية multi-site activity، وهي مبيدات باللامسة

ولا يلزم تبادل استعمال غيرها معها.

أما المبيدات التي تأخذ رقمًا أو أرقامًا، فهي تؤثر في مواقع محددة من أيض الفطريات وتتباين تلك المواقع بتباين الأرقام، وهي المبيدات التي يجب تبادل استخدامها معًا، مع استعمال مبيدات تتباين في الأرقام المقابلة لها.

الفصل الخامس

جدول (٤-٥): أمثلة لحالات مقاومة للمبيدات الفطرية والبكتيرية في الفطريات والبكتيريا (عن Ishii ٢٠٠٦).

المبيد ^(١)	المسبب المرضي الذي ظهرت فيه المقاومة (ب)
Polyoxin	<i>Alternaria alternata</i>
Kasugamycin	<i>Magnaporthe grisea</i> , <i>Pseudomonas avenae</i> **
Benzimidazoles	<i>Botrytis cinerea</i> , <i>Venturia nashicola</i> , <i>Monilinia fructicola</i> , <i>Colletotrichum theae-sinensis</i> , <i>Gibberella fujikuroi</i> , <i>Tapesia yallundae</i> , <i>Fusarium graminearum</i> , <i>Cercospora kikuchii</i> , <i>B. allii</i> , <i>C. gloeosporioides</i> , <i>Elsinoe fawcetti</i> , <i>E. ampelina</i>
Organophosphorous fungicides	<i>M. grisea</i>
Dicarboximides	<i>B. cinerea</i> , <i>A. alternata</i>
Streptomycin*	<i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>pruni</i> ** , <i>P. syringae</i> pv. <i>lachrymans</i> **
Phenylamides	<i>Pseudoperonospora cubensis</i> , <i>Phytophthora infestans</i>
Sterol demethylation inhibitors	<i>Podosphaera (Sphaerotheca) fusca</i> , <i>Erysiphe (Blumeria) graminis</i> f. sp. <i>tritici</i> , <i>S. aphanis</i> var. <i>aphanis</i> , <i>Mycovellosiella natrassii</i>
Fluazinam	<i>B. cinerea</i>
Oxoline acid*	<i>P. glumae</i> ** , <i>P. avenae</i> **
Qols (Strobilurins)	<i>P. fusca</i> , <i>P. cubensis</i> , <i>M. natrassii</i> , <i>Corynespora cassiicola</i> , <i>C. gloeosporioides</i>
MBI-Ds	<i>M. grisea</i>

أ- جميع المبيدات فطرية ما عدا تلك المؤثر عليها ب ه فهي بكتيرية.

ب- جميع المسببات المرضية فطرية ما عدا المؤثر عليها ب ه ه فهي بكتيرية.

جدول (٥-٥): أمثلة لحالات مقاومة لمبيدات الاستروبيلورين strobilurin بين الفطريات الممرضة تحت ظروف الحقل^(١) (عن Ishii ٢٠٠٦).

المرض	الفطر الممرض
Wheat powdery mildew	<i>Erysiphe (Blumeria) graminis</i> f. sp. <i>tritici</i>
Wheat speckled leaf blotch	<i>Mycosphaerella graminicola</i>

استعمال المبيدات في مكافحة الأمراض والآفات

تابع جدول (٥-٥).

الفطر المرض	المرض
<i>E. graminis</i> f. sp. <i>hordei</i>	Barley powdery mildew
<i>Alternaria solani</i>	Potato early blight
<i>Podosphaera (Sphaerotheca) fusca</i>	Cucurbit powdery mildew
<i>Pseudoperonospora cubensis</i>	Cucumber downy mildew
<i>Corynespora cassiicola</i>	Cucumber Corynespora leaf spot
<i>Didymella bryoniae</i>	Cucurbit gummy stem blight
<i>Mycovellosiella natrassii</i>	Eggplant leaf mold
<i>Mycosphaerella fijiensis</i>	Banana black Sigatoka
<i>Plasmopara viticola</i>	Grapevine downy mildew
<i>Uncinula necator</i>	Grapevine powdery mildew
<i>Venturia inaequalis</i>	Apple scab
<i>A. alternata</i>	Apple Alternaria leaf blotch
<i>A. alternata</i>	Pistachio Alternaria late blight
<i>Botrytis cinerea</i>	Citrus gray mold
<i>Puccinia horiana</i>	Chrysanthemum white rust
<i>Colletotrichum graminicola</i>	Turf grass anthracnose
<i>Pyricularia grisea</i>	Turf grass leaf spot
<i>Pythium aphanidermatum</i>	Turf grass blight

أ - تمنع مبيدات الـ strobilurin الفطرية التنفس بـالميتوكوندريا، ومن أوسعها انتشاراً وأكثرها مبيعاً المبيد .azoxystrobin.

ولقد طُوِّرَ الفطر *Phytophthora infestans* سلالات مقاومة للمبيد metalaxyl (الموجود في Ridomil)، كما تتوفر مقاومة واسعة الانتشار ضد المبيد benomyl (الموجود في Benlate) في الفطر المسبب للفحة الساق الصمغية في القرعيات.

إجراءات حماية النحل من أضرار المبيدات

إن من أهم إجراءات حماية النحل من أضرار المكافحة الكيميائية للآفات، ما يلي:

- ١- لا يُستخدم المبيدات إلا عند الضرورة.
- ٢- لا تُستخدم المبيدات الحشرية عندما تكون النباتات في مرحلة الأزهار المتفتحة.

الفصل الخامس

- ٣- المعاملة بالمبيدات حينما لا يكون النحل طائراً، علماً بأنه يكون نشطاً في الطيران بين ١٣، و ١٦ م^٥ وبين الثامنة صباحاً والخامسة بعد الظهر.
- ٤- عدم تلويث الماء بالمبيدات.
- ٥- استخدام أقل المبيدات سمية.
- ٦- استخدام أقل تراكيب المبيدات سمية، فالمبيدات المجهزة في صورة كبسولات دقيقة microcapsulated هي الأكثر سمية، والمساحيق أكثر خطورة من السوائل، بينما المركبات المستحلبة أقل خطورة من المساحيق القابلة للبلل.
- ٧- التأكد من عدم تواجد حشائش مزهرة جاذبة للنحل قبل معاملة الحقل بالمبيدات.
- ٨- نقل خلايا النحل أو تغطيتها بالخيش أثناء المكافحة.

وتقسم المبيدات وبيئات المبيدات حسب سميتها للنحل إلى ثلاثة فئات كما يلي (من Sanford ٢٠٠٦)،

أولاً: مبيدات عالية السمية:

تحدث هذه المبيدات خسائر كبيرة بالنحل إذا ما استعملت أثناء تواجده أو إذا تواجد خلال يوم واحد من المعاملة بها، وهي تتضمن المبيدات التالية (وجميعها مبيدات حشرية أو أكاروسية أو نيماتودية):

المبيد (المادة الفعالة)	الاسم التجاري
aldrin	Aldrin
chloprpyrifos	Dursban
fenamiphos	Nemacur
permethrin	Ambush
etrimfos	Ekamet
methomyl	Nudrin
arsenicals	
acephate	Orthene
azinphos-ethyl	Ethyl Guthion
avermectin	
parathion	Parathion

استعمال المبيدات فى مكافحة الأمراض والآفات

الاسم التجارى	المبيد (المادة الفعالة)
Azodrin	monocrotophos
Famophos	famphur
Baygon	propoxur
Phosdrin	mevinphos
Baytex	fenthion
Folithion	fenitrothion
Dimecron	phosphamidon
Bidrin	dicrotophos
Furadan	carbofuran
Pounce	permethrin
Bux	bufencarb
Gardona	stirofos
Pydrin	fenvalerate
FMC-35001	carbosulfan
Guthion	azinphosmethyl
Synthrin	resmethrin
Cygon	dimethoate
Sevin	heptachlor
Cythion	carbaryl
Imidaz n	malathion
Spectracide	phosmet
Dasanit	diazinon
Lannate	fensulfothion
Sumithion	methomyl
DDVP	fenitrothion
Lorsban	dichlorvos
Sumithrin, d	chlorpyrifos
Dibrom	dhenothrin
Malathion	naled
Supracide	malathion
Decis	methidathion
	decamethrin

الفصل الخامس

الاسم التجارى	المبيد (المادة الفعالة)
Matacil	aminocarb
Tamaron	methamidophos
De-Fend	dimethoate
MesuroI	methiocarb
Temik	aldicarb
Spectracide	diazinon
Parathion	methyl parathion
Alderin	dieldrin
Monitor	methamidophos
Vapona	dichlorvos
Dimecron	phosphamidon

ثانياً: مبيدات متوسطة السمية:

يمكن المعاملة بمبيدات هذه المجموعة حول النحل إذا ما استعملت بطريقة صحيحة فيما يتعلق بالجرعة والتوقيت وطريقة المعاملة، ولكن لا يجب رشها - مباشرة - على النحل فى الحقل أو على خلايا النحل.

مبيدات حشرية

الاسم التجارى	المبيد (المادة الفعالة)
Abate	temephs
DDT	
Agritox	trichloronate
Di-Syston	disulfoton
Sevin	carbaryl
Bolstar	sulprophos
Dyfonate	fonofos
Sevimol	carbaryl
Carzol	formetanate HCL
Endrin	endrin
Systox	demeton
Chlordane	chlordane

استعمال المبيدات في مكافحة الأمراض والآفات

الاسم التجارى	المبيد (المادة الفعالة)
Korlan	ronnel
Thimet	phorate
Ciodrin	crotoxyphos
Larvin	thiodicarb
Thiodan	endosulfan
Counter	terbufos
Metasystox-R	oxydemeton-methyl
Trithion	carbophenothion
Croneton	ethiofencarb
Mocap	ethoprop
Vydate	oxamyl
Curacron	profenofos
Perthane	ethylan
Zolone	phosalone

ثالثاً: مبيدات غير سامة نسبياً:

يمكن استعمالها حول النحل بدون أضرار تذكر.

مبيدات حشرية وأكاروسية

الاسم التجارى	المبيد (المادة الفعالة)
Acaraben	chlorobenzilate
Fundal	chlordimeform
	pyrethrum (natural)
Pynamin	allethrin
Galecron	chlordimeform
Rotenone	rotenone
Altosid	methoprene
	<i>Heliothis polyhedrosis virus</i>
	sabadilla
Baam	amitraz
Kelthane	dicofol

الفصل الخامس

الاسم التجاري	المبيد (المادة الفعالة)
Sayfos	menazon
Bactur, Bactospeine, Bakthane, Dipel, Thuricide	<i>Bacillus thuringiensis</i>
Mavrik	fluvalinate
Sevin	carbaryl
Marlate	methoxychlor
Sevin	carbaryl
Mitac	amitraz
Smite	sodium azide
Birlane	chlorfenvinphos
Morestan	oxythioquinox
Tedion	tetradifon
Comite	propargite
Morocide	binapacryl
Kryocide	cryolite
Murvesco	fenson
Tokuthion	prothiophos
Delnav	dioxathion
Nicotine	nicotine
Torak	dialifor
Dessin	dinobuton
Omite	propargite
Taxaphene	toxaphene
Dimilin	diflubenzuron
Pentac	dienochlor
Zardex	cycloprate
Dylox	trichlorfon
Pirimor	pirimicarb
	ethion
Plictran	cyhexatin

استعمال المبيدات في مكافحة الأمراض والآفات

مبيدات فطرية:

الاسم التجارى	المبيد (المادة الفعالة)
Afugan	pyrazophos
Dessin	dinobuton
Morestan	oxythioquinox
Arasan	thiram
Difolatan	captafol
Morocide	binapacryl
Bayleton	triadimefon
Dithane tD-14	nabam
Mylone	dazomet
Benlate	benomyl
Dithane M-22	maneb
Phaltan	folpet
	bordeaux Mixture
Dithane M-45	manzeb
Plantvax	oxycarboxin
Bravo	chlorothalonil
Dithane Z-78	zineb
Polyram	metiram
	captan
Du-Ter	fentin hydroxide
Ridomil	
	copperoxychloride sulfate
Dyrene	anilazine
Sisthane	fenapanil
	copper 8-quinolinolate
	ferbam
Smite	sodium azide
	copper sulfate
	glyodin
	sulfur

الفصل الخامس

الاسم التجارى	المبيد (المادة الفعالة)
Cuprex	dodine
Hinosan	edifenphos
Thylate	thiram
	cupric oxide
Indar	butrizol
	thyfural
Kocide	cupric hydroxide
Karathane	dinocap
Vitavax	carboxin
Delan	dithianon
Lesan	fenaminosulf
Zerlate	ziram

مبيدات حشائش:

الاسم التجارى	المبيد (المادة الفعالة)
AAtrex	atrazine
	dichlorprop
Paarlan	isopropalin
	alachlor
	dinoseb, dinitrobutylphenol
	paraqual
Alanap	naptalam
	diqua
Planavin	nitralin
Alopex	clofop-isobutyl
Dual	metolachlor
Pramitol	prometon
Amex 820	butralin
Accelerate	endothall, sodium salt
Preforan	fluorodifen
Amiben	chlormben

استعمال المبيدات في مكافحة الأمراض والآفات

الاسم التجارى	المبيد (المادة الفعالة)
Eptam	EPTC
Princep	simazine amitrole
Eradicane	EPTC + safener
Probe	methazole
Ammate	AMS
Evik	ametryn
Prowl	pendimethalin
Aquathol K	endothall, Dipotassium
Evital	norflurazon
Ramrod	propachlor
Avenge	difenzoquat
Folex	merphos
Radox	CDAA
Balan	benefin
Garlon	triclopyr
Ronstar	oxydiazon
Banvel	dicamba
Goal	oxyfluorfen
Roundup	glyphosate
Basagran	bentazon
Hoelon	diclofop-methyl
Sancap	dipropetryn
Hydrothol 191	endothall monopotassium salt
Sencor	metribuzin
Silvex	2,4,5-TP
Basalin	fluchloralin
Betanal	phemmedipham
Hyvar	bromacil
Sinbar	terbacil
Bladex	cyanazine

الفصل الخامس

الاسم التجارى	المبيد (المادة الفعالة)
Igran	terbutryn
Smite	sodium azide
Blazer	acifluorfen
IPC	propham
Surflan	oryzalin
	butachlor
Karmex	diuron
Sutan	butylate
	butam
Kerb	pronamide
	2,4,5-T
	cacodylic acid
Lasso	alachlor
Telvar	monuron
Cambilene	2,3,6-TBA
Lorox	linuron
Tenoran	chloroxuron
Caparol	prometryn
Maloran	chlorbromuron
TOK	nitrofen
Casoron	dichlobenil
	MCPA
Tolban	profluralin
Chloro IPC	chlorpropham
Methar	DSMA
Tordon	picloram
Cotoran	fluometuron
Milogard	propazine
Treflan	trifluralin
	2,4-D
Modown	bifenox
Turf Herbicide	endothall, disodium

استعمال المبيدات فى مكافحة الأمراض والآفات

الاسم التجارى	المبيد (المادة الفعالة)
Vegadex	mSMA
Desiccant L-10	cDEC
Mylone	arsenic acid
Zorial	dazomet
Devrinol	norflurazon
Nortron	napromamide
	ethofumesate

مبيدات نيماتودا ومتنوعات:

الاسم التجارى	المبيد (المادة الفعالة)
Mocap	endothall
Polaris	ethoprop
Exhalt ® 800	glyphosine
Mylone	dazomet
Smite	sodium azide
	gibberellic acid
N-Serve	nitrapyrin
Sustar	