




تنظيم جسم النبات :



تتميز الخلايا النباتية بوجود 3 اجزاء اضافية (غير موجودة في الخلايا الاخرى) :

- 1- الجدار الخلوي
- 2- فجوة مركزية كبيرة
- 3- البلاستيدات الخضراء

وظائف الخلايا الثلاثة والتي تشكل معظم الانسجة النباتية :

- 1- انتاج وتخزين الغذاء
- 2- القوة
- 3- المرونة
- 4- الدعم



الخلايا النباتية

الخلايا السكليرنشيمية	الخلايا الكولنشيمية	الخلايا البرنشيمية
الخصائص : 1-تفتقر الى السيتوبلازم و المكونات الخلية الاخرى عندما تنضج . 2-سميكة وصلبة 3-تشكل معظم استخدامات الخشب مثل صناعة الاسقف و الوقود و المنتجات الورقية 4-الوظائف : • الدعم للنبات • نقل المواد عبر جسم النبات	الخصائص : 1- تكون بشكل سلاسل طويلة او اسطوانات تدعم الخلايا . 2- سمك الجدران بشكل متفاوت 3- تعطي النبات المرونة اللازمة عند الاتحاء دون ان ينكسر 4- الوظائف : • دعم الانسجة المحيطة • توفير المرونة للنبات • اصلاح الانسجة واستبدالها	الخصائص : 1- اكثر الخلايا مرونة 2- جدران رقيقة 3- الوظائف : • البناء الضوئي : عندما تحتوي على البلاستيدات الخضراء في الاغصان والاوراق حيث تنتج الجلوكوز . • التخزين :عندما تحتوي على


	<ul style="list-style-type: none"> • **علل: تعطي الخلايا الكولنشيمية المرونة بسبب نمط النمو حيث تتوسع الاجزاء الارفع في جدار الخلية كلما نمت هذه الخلايا 	<ul style="list-style-type: none"> • فجوات مركزية كبيرة تخزن النشا والماء والزيوت . • تبادل الغازات • الحماية • اصلاح الانسجة واستبدالها
--	---	--

الخلايا السكليرنشيمية نوعين :


الالياف	الخلايا المتصلبة (الحجرية)
اطول من الخلايا المتصلبة	اقصر من الالياف
ابرية الشكل	تتوزع بشكل عشوائي وغير منتظم
تشكل الالياف القوية المطاطة	تساهم في النقل
تستخدم في صنع الحبال والكتان والجنفاص والقماش والمنسوجات الاخرى	توجد في البذور والجوز




خلايا برنشيمية لها بلاستيدات خضراء خلايا برنشيمية بدون بلاستيدات خضراء



خلايا كولنشيمية



خلايا حجرية



الياف

الانسجة النباتية :

النسيج : عبارة عن مجموعة من الخلايا تعمل معا لاداء وظيفة معينة .

- بحسب الوظيفة يمكن للنسيج ان يتكون من نوع واحد او عدة انواع من الخلايا وهناك اربعة انواع من الانسجة وهي :

-النسيج المولد :

تمكن النبات من الاستمرار في انتاج خلايا جديدة في انسجتها طول حياتها وهي مناطق تنقسم فيها الخلايا باستمرار تحتوي على :

- نواة كبيرة
- فجوات صغيرة او لا توجد فجوات على الاطلاق
- عند النضج تتطور الى الانواع المختلفة من الخلايا النباتية منها الجذعية .
- يوجد منه ثلاثة انواع بحسب الموقع :

www.almanahj.com

النسيج المولد الجانبي :

الوظيفة : زيادة قطر الساق او الجذر (النمو الثانوي)
وجوده : النباتات البذرية غير المزهرة وذوات الفلقتين وقليل من ذوات الفلقة الواحدة.

النسيج المولد البيني :

الوظيفة : الزيادة في طول الساق او الورقة
الموقع : في طول الساق او الورقة
*يتواجد في النباتات احادية الفلقة

النسيج المولد القمي :

الوظيفة : الزيادة في الطول (النمو الاولي)
الموقع : قمة الساق والجذر
• النباتات ثابتة في مكانه ولهذا تدخل السيقان والجذور في مناطق مختلفة من نفس البينات

يقسم النسيج المولد الجانبي الى :


الكميوم الفليني :

الشكل : الطبقة الخارجية الواقية على السيقان والجذور
تشكل انسجة اللحاء الخارجي على النباتات الخشبية

الكميوم الوعائي :

الشكل : اسطوانة رقيقة من الانسجة المولدة
الموقع : طول السيقان والجذور
الوظيفة : انتاج خلايا جديدة للنقل

- علل : تستمر الاعشاب بالنمو بعد القص الاول؟؟
لوجود النسيج المولد البيئي الذي يزيد من طول الاعشاب بعد القص الاول
- روبرت هوك اول من شاهد الانسجة الفلينية تحت المجهر



نسيج البشرة (نسيج جلدى) :

www.almanahj.com

طبقة من الخلايا تشكل الغطاء الخارجي في النبات

- الشكل تحت المجهر :تلال وانخفاضات متشابكة
- الوظيفة :
- 1- الحماية ومنع دخول مسببات المرض
- 2- تفرز مادة دهنية تقلل من فقدان الماء من النبات بابطاء التبخر

تكيفات او تحورات البشرة :

الشعيرات الجذرية	الشعيرات	الثغور
<ul style="list-style-type: none"> • ملحقات هشة لخلايا البشرة • الوظيفة :تزيد من المساحة السطحية للجذر وتمكن الجذر من امتصاص اكبر قدر ممكن من المواد 	<ul style="list-style-type: none"> • هي بروزات شعرية على الاوراق والسيقان • الوظيفة : 1-تعطي مظهرا زغيبا يساعد على حماية النبات 2-تطلق مواد سامة عند لمسها 3-ابقاء بعض النباتات باردة (علل) :لأنها تعكس الضوء 	<ul style="list-style-type: none"> • هي فتحات صغيرة يمر من خلالها ثاني اكسيد الكربون والماء والاكسجين • توجد في الاوراق والسيقان الخضراء • تشكل الخليتان الحارستان الثغور . • كيف تفتح وتغلق الثغور؟ • بسبب تغيرات في اشكال الخلايا الحارسة

الانسجة الوعائية

الوظيفة :

1-نقل الماء والغذاء والمواد المذابة

2- الدعم

وتقسم الى نوعين :



اللحاء :

- ينقل السكريات الذائبة والمركبات العضوية الاخرى الى جميع اجزاء النبات
- ينقل اللحاء المواد من الورقة للساق والجذر ومن الجذر للاوراق
- يتكون من انبوب غربالي وخلية مرافقة
- هناك خلايا متصلبة واللياف مرتبطة باللحاء (خلايا سكليرنشيمية توفر الدعم) لا علاقة لها بالنقل

الخشب :

- ينقل الماء والمعادن الذائبة عبر الجذر الى الاوراق
- ينقل الماء بعيدا عن الجذر
- يتكون من عناصر وعائية وقصبيات
- يتحول كل عنصر وعائي وقصبية الى جدار خلوي

يقسم نسيج الخشب الى :


القصبية (الانابيب الصغيرة)	العنصر الوعائي
<ul style="list-style-type: none">• خلايا اسطوانية ذات اطراف مثقبة• تشكل شرائط انبوبية• لها جدران طرفية• الكفاءة اقل	<ul style="list-style-type: none">• خلايا انبوبية تتراس طرفا لطرف• تفتح العناصر الوعائية عند طرفيها باشرطة تشبه الحاجز عند الفتحات• تفقد في بعض النباتات جدرانها• الكفاءة اعلى في النقل
	
القصبية	الوعاء الخشبي

- معرفة البذور يتكون الخشب فيها من قصبيات فقط وبالتالي تعيش في بيئات اقل تنوعا لان كفاءة القصبيات اقل من الاوعية .
- في مغطاة البذور يتكون الخشب من اوعية وقصبيات ولهذا تعيش في بيئات اكثر تنوعا (علل) :لان كفاءة الاوعية اكبر في نقل الماء والمواد الغذائية .

اللحاء يتكون من :

الخلية المرافقة	الانبوب الغربالي
- توجد بجانب الانبوب الغربالي - لها نواة - تساعد نواتها الانبوب الغربالي مكتمل النمو	- يحتوي على سايتوبلازم - يفتقر للنواة والرايبوسوم - هناك صفائح غربالية في نهاية الانابيب الغربالية في النباتات الزهرية تحتوي على مسام كبيرة يتدفق المواد الغذائية خلالها

- يعتقد ان نواة الخلية المرافقة وظيفة تجاه الخلية المرافقة والانبوب الغربالي تصنع الكربوهيدرات في الاوراق او الساق في بعض النباتات المصدر



تنتقل الى: (عملية الانتقال المكاني تنتقل فيها الكربوهيدرات من المصدر الى المخزن)

www.almanahj.com

المخازن (عضو تخزين) (مثل الخلايا البرنشيمية في قشرة في الصفائح الغربالية الموجودة بين الانابيب الغربالية. لاحظ وجود ثقبوب

النسيج الاساسي :

التكوين : انواع الخلايا الثلاثة (برنشيمية , كولنشيمية , سكليرنشيمية)

الوظائف :

- 1- التمثيل الضوئي :مثل السيقان والاوراق التي تحتوي على بلاستيدات خضراء
- 2- التخزين :مثل جذور وسيقان وبذور النباتات التي تحتوي فجوات كبيرة تخزن النشا والسكريات والزيوت والمواد الاخرى
- 3- الدعم :عندما تنضج بين الانواع الاخرى من الانسجة

القسم (2) الجذور والسيقان والاوراق


الجذور:

- الجذر يكون اول هيكل ينمو من البذور عند التبرعم
 - الوظائف:
 - 1- امتصاص الماء والمعادن ونقلها الى باقي اجزاء النبات
 - 2- تثبيت النبات بالتربة
 - 3- التخزين
 - تنمو الجذور عادة من 0.5-5 امتار وتتشعب احيانا حتى يصل الى نصف كتلة النبات
- تكيفات لبعض الجذور تساعد على الحصول على الموارد المائية المحدودة:
- 1- نبات الميسكيت: هو نبات تنمو جذوره نحو الاسفل بعمق 50 مترا تجاه المياه المتاحة
 - 2- نبات الصبار: له جذور متفرعة وضحلة وتنمو من الساق في جميع الاتجاهات بطول 50 مترا

بنية ونمو الجذور:

- 1- القلنسوة: تغطي الجذر وتتكون من خلايا برنشيمية تساعد على حماية انسجة الجذر
 - 2- النسيج المولد القمي: يزيد من طول الجذر ويتواجد في القمة النامية للجذر
 - 3- الشعيرات الجذرية: تزيد من المساحة السطحية لامتصاص الماء والمعادن
- تنتج الخلايا الجذرية مادة غروية لزجة تقوم مع الطبقة الخارجية للخلايا بتشكيل مواد تشحيم تقلل من الاحتكاك عند نمو الجذر في التربة وخلال شقوق الرصيف

انسجة الجذر:



البشرة تليها القشرة ثم البشرة الداخلية يطوق كل خلية بشرة داخلية شريط كاسبار الذي ينظم انتقال الماء والمعادن خلال الادمة الباطنية ثم تليها طبقة الى الداخل باتجاه الجذر تسمى (الدائرة المحيطية) وهو النسيج الذي ينتج الجذور الجانبية ويتكون الكامبيوم الوعاني في الدائرة المحيطية حيث يسهم في زيادة قطر الجذور


الانسجة الوعائية في مركز الجذر

مقارنة بين جذر ذوات الفلقة الواحدة وذوات الفلقتين :



www.almanahj.com

انواع الجذور :



الجذور العرضية

تنمو حيث لا تنمو الجذور عادة وتساعد على دعم فروع الأشجار مثل: الأشجار الاستوائية ومع تطور هذه الجذور تشبه الجذوع

توفر التنفسية

تساعد على امدادها بالاكسجين مثل السرو والقرم

تخزن الماء




اشجار المناطق القاحلة وهي جذور كبيرة

الجذر الليفي

تفرعات عديدة نفس الحجم تنمو من نقطة مركزية مثل البطاطا الحلوة وهي تخزين الغذاء

الجذر الوتدي

سميك له تفرعات جانبية اصغر و قليلة مثل: الفجل و البنجر والجوز وتخزن الغذاء في الخلايا البرتشمية



السيقان :

هناك انواع عديدة من السيقان :

نوع الساق	الوصف
السيقان العشبية	لينة ومرنة تقوم بالبناء الضوئي بسبب احتوائها على بلاستيدات خضراء مثل :النباتات السنوية ,الهليون
الصلبية والليفية	مثل النخيل والخيزران
سيقان خشبية	قوية مثل : الأشجار والشجيرات المعمرة
سيقان مغطاة بلحاء	النباتات الاكبر سنا - النسيج القليني يحميها من الاضرار المادية وغزو الحشرات و حتى حرائق الغابات

وظائف السيقان :

- 1- دعم الاوراق والتراكيب التناسلية
- 2- تنقل الانسجة الوعائية الماء والمواد المذابة الى جميع اجزاء النبات
- 3- تخزين المواد الغذائية في بعض انواع السيقان

نمو الساق :




مقارنة بين سيقان ذوات الفلقة الواحدة و الفلقتين :



ذوات الفلقتين

الحزم الوعائية تنتظم بشكل حلقة او حلقات حول المحيط



ذوات الفلقة الواحدة

الحزم الوعائية مبعثرة ومتناثرة

www.almanahj.com

هناك تكيفات للسيقان تساعد على البقاء على قيد الحياة مثل :

- 1- تخزين المواد الغذائية الزائدة
- 2- تحمل الجفاف والبرد والحرارة

بصلة :

ساق قصيرة مضغوطة محاطة
باوراق طرية

مثل :البصل والخزامي والزنبق
المخطط والنجس

تخزن مواد غذائية



الدرنة :

ساق منتفخة تحت الارض
بترعمات تمكن من نمو نبات
البطاطس البيضاء الجديدة

تخزن مواد غذائية



الرايزوم

سيقان افقية تحت الارض

تخزين المواد الغذائية والتكاثر
اللاجنسي مثل السراخس
والسوسن



الكعب:

تتألف من نسيج الساق مع بعض الاوراق
الحرشفية في القمة

مثل الزعفران والدلبوث

تخزين المواد الغذائية



الساق الجارية:

سيقان افقية تنمو على سطح التربة مثل
:الفراولة وبعض الحشائش ونبات الغيلان
وظيقتها :

التكاثر اللاجنسي




الاوراق:


- تختلف اشكال والوان اوراق الشجر حسب النوع .
- الحجم : يتراوح من 2متر كقطر كبير الى اقل من 1 ملم في الطول
- العدد : يختلف في موسم التزاوج من القليل في النرجس الى مئات الالاف في الاشجار الخشبية الناضجة .
- الوظيفة : القيام بالبناء الضوئي

هيكل الورقة:

- 1- شفرة او نصل : يوفر مساحة سطحية اكبر لامتصاص ضوء الشمس
 - 2- السويق : يربط الشفرة بالساق (النسيج الوعائي فيها يرتبط بالنسيج الوعائي للساق)
- الاعشاب لا تحتوي على سويق ترتبط مباشرة الورقة بالساق



انسجة النبات :



الحزمة الوعائية (العروق)

تنقل الماء والسكريات
عبر الورقة .

النسيج المتوسط

يقسم الى :

الاسفنجي

العمادي

البشرة العلوية والسفلية

الوظيفة: الحماية والنتح وتبادل
الغازات

*تحتوي البشرة على ثغور على

الجانب السفلي اكثر من العلوي


*ينتقل الماء الى اعلى من الجذر

الى الاوراق لاستبدال المياه

المستهلكة في التمثيل الضوئي

والتي تفقد بعملية النتح واهمية

النتح تسحب عمود الماء للاعلى



النسيج المتوسط الاسفنجي	النسيج المتوسط العمادي (الطبقة الباليسيدية)
الشكل : غير منتظمة و غير متماسكة وتوجد فراغات محيطة بها	الشكل : خلايا مكذبة مباشرة اسفل البشرة العليا وعمودية
الوظيفة : نقل الاكسجين و ثاني اكسيد الكربون وبخار الماء عبر الفراغات	الوظيفة : تجري فيها معظم عمليات البناء الضوئي
يحتوي على بلاستيدات خضراء اقل من العمادي	


النية فتح وغلق الثغور :

الخلايا الحارسة مسؤولة عن فتح وغلق الثغور فعندما يدخل الماء الى الخلايا الحارسة يتغير شكلها فتفتح الثغور اما عندما يغادرها الماء يتغير شكلها فتغلق

وظيفة الثغور : التبادل الغازي

علل : توجد ثغور اكثر على الجانب السفلي للاوراق من العلوي ؟

لان الثغور في الجانب العلوي معرضة للانسداد بفعل الغبار او قطرات المطر او فقدان الماء اكثر بالنتح لانها تواجه الشمس



خصائص الاوراق :

نحدد النباتات بالاختلاف في الحجم والشكل واللون والملمس

تتميز النباتات حسب :

النصل وتقسم الي :

مركبة (متعاقبة)	بسيطة
لها نصل او شفرة مقسم الى وريقات	النصل غير مقسم الى وريقات
	

ترتيب الاوراق على الساق :

النمو دائري	النمو المتبادل	النمو المتعكس او المتقابل
وجود ثلاثة اوراق او اكثر متباعدة بشكل متساوي عن الساق	تتبدل اماكن الاوراق على الجانبين	ورقتين تتجه عكس بعض

ترتيب العروق في الورقة :

الاوردة الريشية	العروق المتوازية	العروق المتشعبة او المتفرعة
	ذوات الفلقة الواحدة	النباتات ذوات الفلقتين

تعديلات للاوراق تمكنها من القيام بوظائف اخرى غير البناء الضوئي :


تحولت الاوراق الى اشواك للحد من فقدان الماء و الحماية من اكلات الاعشاب	الصبار-النباتات العصارية-
تتضخم الاوراق وتمتلئ بالماء عند توفره وتساعد على البقاء على المدى الطويل	تخزين الماء -العصارية-
تتغير الالوان استجابة الى عدد ساعات الظلام في البيئة مسؤل: البوينيسيتياو جذب الملقحات	تغير الالوان-النباتات الاستوائية
تصطاد الحشرات	اصطياد الحشرات-نبات النديّة -
نبات الابريق اوراقه تمتلئ بالماء وتساعد على اغراق الحشرات والحيوانات الصغيرة	1الاوراق المعدلة الاسطوانية
يسبب تهيج البشرة الشديد للناس (وسيلة حماية لمنع الاقتراب من النبات)	اللبلاب السام او البلوط
تنتج الغدد مواد تمنع الحشرات من الاقتراب مثل الطماطم والقرع	الشعيرات ذات الغدد
سيقان واوراق والاوراق تخزن الغذاء حيث توفر غذاء جاهر لنمو البصيلة	البصيلات

غلل: تفترس بعض النباتات الحشرات ؟ للحصول على المواد الغذائية مثل النتروجين

علل: تتلون اوراق لنباتات الاستوائية بالوان فتبدو مثل البتلات الملونة ؟
لجذب الحشرات الملقحة

القسم 3 (هرمونات النبات واستجاباتها)



- الهرمونات: مركبات عضوية تصنع في جزء معين من الكائن الحي ثم تنتقل الى جزء اخر حيث تؤثر .
- كم يحتاج الكائن الحي من الهرمونات ؟
 - يحتاج الى كمية ضئيلة جدا من الهرمون لاحداث التغيير



1- الاكسين

- من اولى الهرمونات النباتية التي تم اكتشافها
- مثال: اندول حمض الخلبيك
- اين ينتج ؟؟؟
- -في الانسجة المولدة القمية والبراعم والاوراق الصغيرة .
- كيف ينتقل عبر جسم النبتة ؟
- -ينتقل (باتجاه واحد فقط بعيدا عن مكان الانتاج) :
- 1- بالنقل النشط من خلية برنشيمية لآخرى 2- تنتقل في اللحاء
- الوظيفة: يحفز تمدد الخلايا او استطالتها ظاهرة سيادة القمة النامية -تكون الثمر وتاخير اسقاطها

www.almanahj.com





• يختلف بحسب تركيزه وموقعه

- تركيز الاكسين الذي يعزز نمو الساق قد يثبط نمو الجذر في بعض الاحيان
- التركيز المنخفض يسبب استطالة الخلية
- التركيزات العالية تثبط الاستطالة
- تعدل الهرمونات الاخرى من تاثير الاكسين

• سيادة القمة النامية :ظاهرة تحدث عندما ينمو النبات نحو الاعلى دون فروع جانبية او القليل منها .

• لماذا تحدث؟؟؟

-لان الاكسين الذي ينتج من القمة النامية يثبط نمو الفروع الجانبية .

• متى تنمو الفروع الجانبية؟؟؟

-عند ازالة القمة النامية حيث يقل تركيز الاكسين

• علل :في نهاية موسم النمو تسقط الثمار الناضجة على الارض؟؟؟؟

-لان نضج الخلايا يصاحبه بظا انتاج الاكسين وعندما يقل تركيزه تسقط الثمار الناضجة .

الجبـرلين

: الوظيفة :

1- استطالة الخلية

2- تحفيز الانقسام

3- تؤثر في نمو البذور

www.almanahj.com

• كيف ينتقل؟؟ في الانسجة الوعائية

• لماذا تكون بعض النباتات قزمة؟ ويعود ذلك لسببين :

1-تفتقر الى الجينات المسؤولة عن انتاج الجبرلين.

2-تفتقر الى الجينات المسؤولة عن المستقبلات البروتينية للجبرلين .

• ماذا يحدث اذا وضع الجبرلين على نبتة لديها مستقبلات للجبرلين ولكنها لا تحتوي على جينات انتاج الجبرلين؟؟

-سيزداد طولها

الايثيلين :

• الايثيلين : هرمون غازي يتكون من ذرتي كربون واربع ذرات هيدروجين

: الوظيفة :

1- يؤثر في الثمار الناضجة والاوراق المتساقطة والازهار حيث يسبب بشكل اساسي في نضج الثمار

2- يتسبب في اضعاف جدران خلايا الثمار غير الناضجة وتحليل الكربوهيدرات المعقدة الى سكريات بسيطة .

• علل :يمكن للايثيلين ان ينتشر في الفراغات بين الخلايا؟؟

-لانه غاز

• علل :تشحن الثمار غير ناضجة ثم يوضع عليها اثيلين عندما تصل لوجهتها؟؟

- لان الثمار والخضراوات الناضجة معرضة للاصابة بالكدمات بسهولة اثناء الشحن وعندما تصل الى وجهتها

تعالج بالايثيلين مما يسرع نضجها

إذا وضعنا عليها إيثيلين
ستبدو مثل الطماطم على
اليمين



الساييتو كاينين :

الوظيفة : يعزز الساييتوكاينين انقسام الخلية من خلال تحفيز انتاج البروتينات اللازمة للانقسام المتساوي وانقسام السيتوبلازم

• ينتقل من خلال الخشب

• علل : يضاف الى اوساط نمو مستخدمة في استنبات انسجة نباتية (زراعة النباتات من قطع من الانسجة النباتية)

• عند خلط الاكسين (اندول حمض الخليك) مع الساييتوكاينين فانه يعزز سرعة انقسام الخلايا ويسرع نموها .

وجه المقارنة	الاكسين	الجبرلين	الايثيلين	الساييتوكاينين
الوظيفة	تمدد الخلايا واستطالتها تكون الثمار وتاخر سقوطها - سيادة القمة النامية	استطالة الخلية وتحفز الانقسام	نضج الثمار بشكل اساسي	يحفز انقسام الخلايا
ينتقل عبر	الخلايا البرنشيمية - اللحاء	الانسجة الوعائية	ينتشر في الفراغات بين الخلايا لانه غاز - ينتقل داخل اللحاء	عبر الخشب

استجابات النبات :

استجابات الانتحاء

*الانتحاء : هو استجابة نمو النبات لمؤثر خارجي اذا كان نمو النبات باتجاه المؤثر يسمى انتحاء موجب واذا بعيدا عنه يسمى انتحاء سالب

انواعه :

1-الانتحاء الضوئي

2-اللمسي

3-الارضي

استجابة الحركة

*استجابة النبات التي تسبب حركة قولا تعتمد على اتجاه المؤثر (استجابة المؤثر). ويمكن تكرارها

امثلة :

1-تفتح الاوراق اثناء النهار وانغلاقها في الليل لحفظ الحرارة

2-حركة وريقات الميموزا بوديكا نبات المستحية عند لمسها

3-اطباق نبات صائد الذباب فينوس لاوراقه

الانتحاء الضوئي :

هو استجابة نمو النبات للضوء .

السبب: التوزيع غير المتساوي للاكسين اذ تكون كمية الاكسين صغيرة في الجانب المقابل لمصدر الضوء وكبيرة في الجانب البعيد عن مصدر الضوء والاكسين يسبب استطالة الخلايا في الجانب البعيد عن الضوء فيزيد طول الساق وينحني الساق باتجاه مصدر الضوء .

الانتحاء الارضي :

هو استجابة استجابة نمو النبات للجاذبية .

- الجذر يظهر انتحاء ارضي موجب - الساق انتحاء ارضي سالب



www.almanahj.com

الانتحاء اللمسي :

هو استجابة النمو لؤثرات ميكانيكية مثل ملامسة جسم او كائن حي اخر او حتى الرياح .

مثل: نبات العنب يلتف حول اي جسم قريب مثل شجرة او سياج

اوراق عمل :

س1 : اختر الجواب الصحيح :

- 1- اي من الخلايا النباتية التالية تكون ميتة عند البلوغ :
 - خلية البشرة
 - خلية مرافقة
 - خلية وعاء خشبي
 - خلية كولنشيمية
- 2- تسمى الخلية البرنشيمية الناقلة في النسيج اللحائي لنبات زهري :
 - الانبوب الغربالي
 - القصيبة
 - الثغر
 - الكيوتكل
- 3- في السوق الخشبية تستبدل البشرة الخارجية ب :
 - كمبيوم وعائي
 - خلايا فليينية
 - نسيج مولد قمي
 - صفائح غربالية
- 4- النمو الاولي هو :
 - انبات البادرة
 - نمو قطر ساق النبات
 - نمو النبات طوليا
 - النمو القطري
- 5- تقوم الجذور بجميع الوظائف عدا :
 - امتصاص الماء والاملاح من التربة
 - القيام بالبناء الضوئي
 - تثبيت النبات في التربة
 - تخزين الماء والمركبات العضوية
- 6- احد الفوارق بين سوق ذوات فلقة واحدة وذوات فلتتين ان سوق ذوات فلقة واحدة :
 - لها حزم وعانية متناثرة
 - تنمو قطريا
 - ذات نمو ثانوي
 - تستبدل الانسجة الاولية بالثانوية
- 7- يظهر المقطع العرضي لساق شجرة تسع حلقات كم يبلغ عمر هذه الشجرة :
 - تسعة اشهر
 - تسع سنوات
 - تسعين سنة
 - سنة واحدة
- 8- تسمى الورقة المقسمة الى وريقات :
 - مركبة
 - متوازية
 - ذات عروق
- 9- معظم البناء الضوئي يجري في :
 - الحزمة الوعائية
 - النسيج المتوسط الاسفنجي
 - النسيج المتوسط العمادي
 - البشرة العليا
- 10- الاوراق التي تنمو تحت الشمس مباشرة :
 - الاكثر سمكا
 - لها بلاستيدات خضراء اقل
 - الورقة اكبر مساحة
 - لا شي مما سبق

11- ان اندول حمض الخليك هو هرمون :

-الايثيلين
-السايتوكاينين

-الاكسين
-الجبرلين

12- ان الهرمون الذي يسبب الانتحاء الضوئي هو :

-الاكسين
-الجبرلين

-السايتوكاين
-الايثيلين

13- يطلق على استجابة النبات التي لا تعتمد على اتجاه المؤثر :

-استجابة حركة
-لا شئ مما سبق

-استجابة انتحاء
-انتحاء لمسي

14- ان النباتات القزمية تفتقر الى الجينات المسؤولة عن انتاج :

-الايثيلين
-السايتوكاينين

-الاكسين
-الجبرلين

15- اي مما يلي مثال على استجابة حركة :

-نبات فينوس

-نبات الميموزا بوديكا

-كل ما سبق

-تفتح الاوراق خلال النهار

www.almanahj.com

16- ان الهرمون الذي يسبب تكون الثمار وتأخير سقوطها هو :


-الاكسين

-الايثيلين

-الجبرلين

-السايتوكاينين

س2) الشكل التالي يمثل قطاعا عرضيا في ساق نبات تمعنه جيدا ثم اجب عن الاسئلة :



1- هل هذا ساق نبات ذوات فلقة واحدة ام فلقتين ؟


.....

2- علل اجابتك :

3- اذكر وظيفتين للساق :

.....

س3) : امعن النظر في الشكل التالي ثم اجب عن ما يلي :



• ماذا يمثل الشكل ؟

• ماذا تسمى التراكيب المشار اليها بالارقام :

1-.....

2-.....

3-.....

4-.....

• اهمية وجود معظم الثغور على الجانب السفلي للورقة ؟

.....

• ما الذي يتحكم في فتح الثغور واغلاقها ؟

.....

.....

س3) : اذكر انواع الجذور واذكر مثالا عليها :

.....

.....

.....

س4) : صف تحورات البشرة :

.....


.....

.....

س5) : اكمل جدول المقارنات التالي :

وجه المقارنة	معرفة البذور	مغطة البذور
وجود العناصر الوعائية	الخلايا البرنشيمية	الخلايا الكولنشيمية
الوظائف	الخلايا الحجرية	الالياف
الشكل	الورقة البسيطة	الورقة المركبة

س6) : تمعن الصور التالية والتي تبين الانتحاءات تمعنه جيدا ثم حدد انواعه :



.....-1

.....-2

.....-a

.....-B

س7) : علل ما يلي تعليلا علميا دقيقا :

1- الخلايا الكولنشيمية توفر المرونة للنبات

.....

2- لا يتوقف نمو العشب بعد عملية الجز الاولى

.....

3- النباتات الزهرية تنمو في بيئات اكثر تنوعا من معرفة البذور

.....

4- للجذور المتحورة اهمية كبيرة

.....

5- في نبات البوينسييتيا تتلون الاوراق باللون زاهية

.....

حلول مراجعة القسم والفصل

القسم 1 التقييم

1. تتضمن الأشجعة المولدة الخلايا القمية والخلايا البينية والخلايا الجانبية. وتتضمن الخلايا الجلدية خلايا البشرة وفطلي الجزء الخارجي للنبات. تكوّن الخلايا الحارسة الثغور. وتتضمن النسيج الوعائي الخشب الذي يتكوّن من نوعين من الخلايا - الأنايبب الصغيرة والعناصر الوعائية. يتكوّن اللحاء من خلايا أعضاء الأنايبب الغربالية والخلايا البرافقة. يحتوي النسيج الأساسي على كل أنواع الخلايا.
2. الخلايا البرنشيمية: جدران رقيقة وتحفظ بالقدرة على الانقسام المتساوي عند التضخ: الخلايا الكولنشيمية، غير مستوية وتحتوي على جدران خلايا سميكة وتحفظ بالقدرة على الانقسام المتساوي عند

- التضخ: الخلايا السكليرنشيمية، جدران سميكة للغاية، وتمتدع المكونات الحية عند التضخ
3. الشعيرة الجذرية - امتداد لخلايا بشرة الجذر تزيد من مساحة السطح
4. الكامبيوم الوعائي - ينتج خلايا نعل جديدة في الجذور والسيقان
5. الأنايبب الصغيرة - خلايا أنبوبية طويلة ذات أطراف مثقبة، العناصر الوعائية - خلايا أنبوبية مترابطة طرفاً لطرف
6. يجب أن تحدد الجداول كل نوع من أنواع الأشجعة بأسلوب منظم.
7. الحركة الحرة للماء والمواد الحرة المذابة
8. يجب أن تكون القصيدة الخماسية الفكاهية دقيقة علمياً.

القسم 2 التقييم

1. فلتسوة الجذر - الخلايا البرنشيمية التي تحمي الجذر وتزلقه، القشرة - الخلايا البرنشيمية التي تشارك في عمليات التخزين والنقل في الجذر، الأدمة الباطنية - شريط مقاوم للماء يُسمى "شريط كاسير" يرغم الماء والمعادن المذابة على المرور عبر خلايا الأدمة الباطنية
 2. يمدّ النسيج المتوسط العمادي طبقة من الخلايا المترابطة بإحكام في الورقة وهو الموقع الذي تحدث فيه أغلب عملية البناء الضوئي، بينما يتكوّن النسيج المتوسط الإسفنجي من خلايا متباعدة، وتسمح الفراغات الموجودة بين الخلايا بانتقال الماء والغازات عبر الورقة.
3. تُمثّل الأشواك حوزراً للأوراق لحمايتها من أن يتم أكلها.
 4. تكثيف أوراق النباتات العصارية لتخزين الماء.
 4. يجب أن تتضمن رسومات الطلاب المعلومات الموجودة في الشكلين 10 و 11.
 5. تُمدّ الثغور مهبة لأنها تسمح بانتقال الأكسجين إلى النبات وإخراج ثاني أكسيد الكربون وبخار الماء منه.
 6. 6 أفراد تقريباً (لمدة سنة واحدة)

www.almanahj.com

القسم 3 التقييم

1. إن هرمونات النباتات هي تلك المواد الكيميائية التي تؤدي إلى حدوث تغيرات في النباتات حيث يؤدي كل من الجبرلين والسايبتوكابنتين إلى انقسام الخلايا. ويؤدي الأكسين والسايبتوكابنتين إلى استطالة الخلايا. في حين يؤدي الجبرلين إلى إنبات البذور ويؤدي الإيثيلين إلى إنباح الثمار.
 2. إن الانتحاء الضوئي هو استجابة نمو النبات للضوء، والانتحاء الأرضي هو استجابة نمو النبات للجاذبية. أما الانتحاء للمسي، فهو استجابة نمو النبات للمس.
 3. إن الانتحاءات هي استجابات النمو في النباتات التي تعتمد على اتجاه المؤثر. أما استجابة الحركة، فهي استجابة في النبات لا تعتمد على اتجاه المؤثر.
4. يجب أن يُظهر ضاحك الطلاب أنّ الأكسين يتحرك بسرعة وفي اتجاه بعيد عن مكان إنتاجه فقط.
 5. نموذج الإجابة، إنّ لهذه المغولة أساس. فالنتاحة المتعنتة نتيجة زيادة نضجها تُطلق إيثيلين بكمية تكفي لزيادة نضج التفاح الموجود حولها. ويمكن لهذا التفاح الزائد في النضج أن يتسبب في تعفن تفاح آخر. في النهاية يمكن أن يؤدي التأثير المتتابع لإنتاج غاز الإيثيلين إلى تلف كل التفاح الموجود في البرميل.

مراجعة المفردات

1. للخلايا السكليرنشيمية جدران سميكة للغاية وتموت عند النضج، للخلايا الكولنشيمية جدران سميكة غير مستوية وتبقى حية عند مرحلة النضج. بحمل الخشب الماء والمعادن المذابة إلى أعلى الساق وصولاً إلى الأوراق وينقل اللحاء المواد كالكسكريات والأحماض الأمينية إلى أجزاء النبات العلوية والسفلية.
2. تغطي البشرة الورقة. بينما تكوّن الخلايا الحارسة الثغور في البشرة.

فهم الأفكار الأساسية

4. C
5. A
6. D
7. A
8. C

الإجابة المبنية

9. تعمل الأنابيب الصغيرة والأوعية كالتى في الشكل على إتاحة نقل المواد إلى كل أجزاء النبات.
10. يُعدّ كل من الشعيرات الجذرية والشعيرات وسائل تكيف للخلايا البشرية. غير أنّ الشعيرات الجذرية موجودة على الجذور في حين أنّ الشعيرات موجودة على الأوراق.
11. تتحكّم الخلايا الحارسة والثغور في كمية الماء والغازات الموجودة في الأوراق من خلال التحكم بكمية كل عنصر مسموح بمروره.

التفكير الناقد

12. يجب أن تتضمن منظمات البيانات المعلومات التالية: ثمة أنواع ثلاثة للخلايا في النسيج المولد؛ كمية وبينية وجانبية. ويتكوّن النسيج المولد من خلايا سريعة الانقسام موجودة في الجذور والأوراق والسيقان. ثمة أنواع أربعة للخلايا الجلدية. فخلايا البشرة تغطي الأجزاء الخارجية للنبات. وتكوّن الخلايا الحارسة الثغور. وتتواجد الشعيرات على شكل تنوءات تشبه الشعر على الأوراق. والشعيرات الجذرية عبارة عن امتدادات هشة على خلايا بشرة الجذر. كما يوجد نوعان للنسيج الوعائي: الخشب

واللحاء. فالخشب يتكوّن من نوعين من الخلايا: الأنابيب الصغيرة وهي عبارة عن خلايا أنبوبية طويلة ذات أطراف مثقبة، والعناصر الوعائية، وهي عبارة عن خلايا أنبوبية مترابطة طرفاً لطرف. ويتكوّن اللحاء من نوعين من الخلايا: أعضاء الأنابيب الغربالية التي لا تحتوي على نوى، والخلايا المرافقة التي تحتوي على نوى. ويتكوّن النسيج الأساسي من كل أنواع الخلايا المذكورة في الفئات السابقة. تقوم هذه الخلايا بوظائف متنوعة وتكوّن معظم أجزاء النبات.

13. نموذج الإجابة: يشبه النسيج الجلدي جلد الإنسان في أنّ كليهما يحمي الكائن الحي. لكن النسيج الجلدي في النباتات لا يشبه جلد الإنسان لأنّ جلد الإنسان لا يحتوي على بلاستيدات خضراء أو ثغور. إنّ للنسيج الجلدي فاعلية أكبر بالنسبة إلى النباتات لأنّها تحتاج إليه في صنع الغذاء. أما جلد الإنسان، فهو ذو فاعلية أكبر بالنسبة إلى جسم الإنسان لأنه يتميز بالمرونة وبوفر آلية تبريد تجعل الجسم يحافظ على الاتزان الداخلي.

القسم 2

مراجعة المفردات

14. إنّ الدائرة المحيطية عبارة عن طبقة من الخلايا داخل الأدمة الباطنية تنتج جذوراً جانبية جديدة.
15. يساعد النتج على شدّ الماء إلى أعلى في النبات وصولاً إلى الأوراق التي ترتبط بالساق بواسطة السويقة.
16. إنّ خلايا النسيج المتوسط الإسفنجي هي خلايا غير منتظمة تحيط بها فراغات هوائية لكن خلايا النسيج المتوسط العادي عبارة عن خلايا تشبه الأعمدة تقترب من بعضها بشدة.

فهم الأفكار الأساسية

17. B
18. D
19. D
20. D
21. C

الإجابة المبنية

22. ستتوّع الإجابات لكن ينبغي أن تتضمن درجة الحرارة والجفاف والرياح.
23. يتكوّن شريط كاسير لخلايا الأدمة الباطنية حواجز مقاومة للماء بين قشرة الجذر والنسيج الوعائي. وتبقى الطريقة الوحيدة التي يمكن للمواد أن تدخل بها إلى النسيج الوعائي هي المرور عبر خلايا الأدمة الباطنية. وهذا ما يُطلق عليه المرور عبر الغشاء نصف النفاذ.

التفكير الناقد

24. ستتوّع الإجابات. لكن ينبغي أن يبيّن الطلاب التحور ويربطوه بوظيفته المحددة.
25. نظرًا إلى احتواء سيقان النباتات ذات الفلقتين على كامبيوم وعائي ينتج عنه نمو جانبي، يمكن أن يزيد حجم سيقان النباتات ذات الفلقتين.

القسم 3

مراجعة المفردات

26. إنّ الهرمونات عبارة عن مواد كيميائية ينتجها أحد أجزاء النبات لتؤثر في جزء آخر منه. والأكسين هو أحد أنواع الهرمونات.

C.33 الإجابة المبنية

34. نموذج الإجابة، بضمن الانتقال من خلية إلى أخرى من خلال النقل النشط، أن تكون تأثيرات الهرمون موضعية. إذا انتقل الهرمون عبر الجهاز الوعائي، فسيتم الشعور بالتأثيرات في كل أجزاء النبات.
35. كما يظهر في الشكل، فإن الأكسجين يسبب انخفاض الرقم الهيدروجيني (pH). وتسبب الأحماض رخاوة جدران الخلايا ويمكن للخلايا أن تتمدد أو تستطيل.

36. تحدث استجابات الانتحاء عادةً بسبب تغيّرات في تركيب الخلية، في حين تحدث استجابات الحركة غالباً بسبب التغيّرات في ضغط الماء.

التفكير الناقد

37. ستتوّع الإجابات، لكن ينبغي أن تتضمن ضابطاً غير مُعالج.
38. ستتوّع الإجابات، لكن ينبغي أن يراعي الطلاب أن الجبرلين يعجّل إنبات البذور.
39. ستتوّع الإجابات، لكن ينبغي أن يقرّر الطلاب بأن المزارعين والعلماء والمستهلكين يراعون تأثيرات استخدام الهرمونات في النباتات. ويجب أن تكون المقارنات بصناعة الألبان منطقية ومعقولة.

التقويم الختامي

40. صُممت تراكيب النباتات لأداء وظائف محددة. فلكل خلية ونسيج وتركيب غرض محدد ومن ثم يكون له تصميم خاص. على سبيل المثال، يختلف نظام الجذور لكل من زنابق الماء وصبار ساجوارو بشكل كبير ولكل منهما تركيب مختلف.
41. ستتوّع الإجابات لكن ينبغي أن تتضمن إشارة إلى استجابات الحركة.
42. يجب أن تكون الهرمونات التي يكتب عنها الطلاب مستندة إلى مبادئ علمية.

27. إن الإيثيلين عبارة عن غاز يؤثر في إنباج الثمار. في حين أن الجبرلين سائل يؤثر في انقسام الخلايا وإنبات الجذور. وكلاهما من الهرمونات.
28. تعتمد استجابات الانتحاء على اتجاه المؤثر، في حين أن استجابات الحركة لا تعتمد عليه.

فهم الأفكار الأساسية

- A. 29
A. 30
B. 31
C. 32

اسئلة حول مستند

Maherali, H., and DeLucia, E. H. 2000. Interactive effects of elevated CO₂ and temperature on water transport in ponderosa pine. *Amer. Journal of Botany* 87: 243-249

43. المجموعة ذات درجة الحرارة المرتفعة، 0.22% المجموعة ذات درجة الحرارة المنخفضة، 0.38%
44. يؤدي ارتفاع درجات الحرارة إلى زيادة قطر الأنابيب الصغيرة.

تدريب على الاختبار المعياري

الاختيار من متعدد

1. C 5. D
2. A 6. A
3. A 7. C
4. B 8. C

إجابة قصيرة

9. قد تتنوع الإجابات. طالما أنها تصف خاصية أحد الأقسام التي ليست متوفرة في قسم آخر.
A. تراكيب تكاثرية على شكل هراوة
B. أنسجة وعائية متفرعة
10. قد تتنوع الإجابات. تحتوي الخيوط الفطرية المقشمة على جدران عرضية تسمى الحواجز وتشتمل على ثقب واسع. تسمح الثقوب الواسعة بانتقال السيتوبلازم والمغذيات والعضيات وأحياناً النوى بين الخلايا. لا تحتوي الخيوط الفطرية غير المقشمة على جدران عرضية مما يسمح للسيتوبلازم والعضيات بالتدفق بحرية. كما يمكن أن ينتقل السيتوبلازم في الخيوط الفطرية غير المقشمة بسهولة أكبر من تنقله في الخيوط الفطرية المقشمة.
11. قد تتنوع الإجابات. تتمثل إحدى الفرضيات في أنّ وسائل التكيف الخاصة بتخزين الغذاء الفاضل تمكن النباتات من البقاء على قيد الحياة في أوقات لا تناسب فيه الظروف إنتاج الغذاء. وقد تتضمن هذه الظروف الجفاف أو برودة الطقس. اقبل بالإجابات المعقولة.
12. قد تتنوع الإجابات. وتتضمن الإجابات المحتملة ما يلي.

المعمرة	ثنائية الحول	الحولية
تنمو من بذور؛ تُزهر كل عام؛ صوت الأجزاء الموجودة فوق سطح التربة فقط خلال الأشهر الباردة	تنمو من بذور؛ تزهر خلال العام الثاني	تنمو من بذور؛ تعيش وتزهر خلال عام واحد فقط

13. ينقل الخشب الماء والمغذيات المذابة من الجذور إلى كل أجزاء النبات. وينقل اللحاء السكريات المذابة والبروتينات العضوية الأخرى في كل أجزاء النبات.

14. قد تتنوع الإجابات. وتتضمن الإجابات المحتملة ما يلي:
A. ذاتية التغذية حيث تنتج غذاءها بنفسها
B. جدران الخلية التي تحافظ على التركيب
C. الغذاء المخزن على هيئة نشا
15. تحتوي الأنسجة الوعائية في الورقة على خشب ولحاء لنقل الماء والمغذيات المعدنية إلى الورقة وإخراج السكريات منها.

إجابة موسعة

16. قد يكون من النظريات. فالخلية تحتوي على جدار للخلية وفجوات لكنها تفتقر إلى بلاستيدات خضراء. وقد تكون خلية نباتية من الجذر أو من باطن الساق. وحيث إنها خلية حقيقية النواة، فلا يمكن أن تكون خلية بكتيرية أو من الكائنات الحية القديمة. كما لا يمكن أن تكون خلية حيوانية لأنها تحوي جداراً للخلية.
17. إنّ الثايلاكويد عبارة عن تركيب مطوي مما يمنحه مساحة سطحية كبيرة. وعلى طول غشاء الثايلاكويد يحدث نقل الإلكترونات لإنتاج جزيئات أدينوسين ثلاثي الفوسفات (ATP). يتيح التركيب المطوي إمكانية حدوث المزيد من تفاعلات نقل الإلكترونات مرة واحدة، فتتحقق أقصى استفادة من الطاقة الضوئية التي نستقبلها الورقة.

سؤال مقالي

18. ينبغي أن تعكس الإجابات أنواع النباتات التي يمكن أن تنمو في المنطقة، وكذلك أوقات نموها في العام. ففي المناطق الاستوائية أو شبه الاستوائية، تنمو نباتات كثيرة طوال العام. وهذه إحدى الطرق لجعل الحديقة تنمو طوال السنة. أما في المناطق المعتدلة، فيجب أن تحتوي على خليط من النباتات المعمرة والحولية. فضلاً عن ذلك، يجب أن تحتوي على بعض النباتات غير المتساقطة التي ستظل خضراء طوال العام، إلى جانب النباتات المزهرة التي تزهر فقط في أوقات معينة.