



حشرات نصفية الاجنحة الضارة بالنباتات الاقتصادية

تأليف

الاستاذ الدكتور نزار مصطفى الملاح

و

الاستاذ المساعد الدكتور نبيل مصطفى الملاح

حشرات نصفية الأجنحة الضارة بالنباتات الاقتصادية

تأليف

الاستاذ المساعد الدكتور

نبيل مصطفى الملاح

الاستاذ الدكتور

نزار مصطفى الملاح

كلية الزراعة والغابات

جامعة الموصل

الأهداء

الى أم العطاء وزهرتها

نور وأمنيه

الى ام الخير وزهراتها الأربعة

انقال وسراء

مروة وفرح

الى الاحفاد (مالك وزكريا وجنيد)

الذين منحونا دورا جديدا في الحياة

الى الحفيدات (لجين وسدره وجمانه)

اللواتي اضفن لحياتنا عبقا لم نعده من البهجة والسرور

المؤلفان

المقدمة

ان كتاب حشرات نصفية الاجنحة الضارة بالنباتات الاقتصادية يمثل اسلوبا جديدا في عرض موضوع الحشرات الاقتصادية على مستوى الوطن العربي حيث يهدف هذا الاسلوب الى الخروج عن الاسلوب الرتيب والممل الذي اعتمدته كتب الحشرات الاقتصادية في عرض مفردات مقرر الحشرات الاقتصادية لما تحويه من تكرار لنفس الفقرات عند الكلام عن اي من الحشرات الاقتصادية وهي (الاسم العلمي والعائلة والرتبة - الاسم العربي الشائع - الانتشار والاهمية الاقتصادية - العوائل الغذائية - الطور الضار - مظهر الإصابة - وصف الاطوار - تاريخ الحياه - المكافحة) هذه الفقرات التسعة تتكرر مع كل نوع من الحشرات الاقتصادية، وعليه فاذا احتوى مقرر الحشرات الاقتصادية خلال الفصل الدراسي على (60) نوع حشري فان الطالب سيجد نفسه امام (540) فقرة ينبغي عليه حفظها والاحاطة بها وهي عملية مرهقه لذهن الطالب.

اضافة لما سبق فان كتب الحشرات الاقتصادية تميل الى تقسيم الحشرات الاقتصادية بحسب العوائل النباتية التي تهاجمها فعند الاشارة الى حشرات النجيليات مثلا سنجد ان هناك حشرات من نصفية الاجنحة ومن حرشفية الاجنحة وغمدية الاجنحة تهاجم النجيليات، وعليه فأنا سننقل الطالب من مجموعه حشرية معينه الى مجاميع اخرى وهذا يعقد المسالة اكثر لان الطالب لن يتمكن من الخروج بأسس يمكن الاعتماد عليها في دراسة مقرر الحشرات الاقتصادية، وعليه فان الطالب سيلجأ في النهاية الى الحفظ الاصم البعيد عن

الفهم القائم على الربط بين المتشابه من الحشرات للوصول الى وضع الاسس العامة المشتركة بين الانواع الحشرية التابعة لكل مجموعه حشرية. ان الفلسفة التي اعتمدها في كتابنا الحالي تهدف الى تجاوز السلبيات السابقة وذلك من خلال التركيز في البداية على نقاط التشابه التي تجمع ما بين مجاميع حشرات نصفية الاجنحة والتي ادت بالنتيجة الى وضعها في رتبة نصفية الاجنحة، ومن ثم بيان الاسس التي تشترك فيها كل مجموعه حشرية تعود لرتبه نصفية الاجنحة مثل مجموعه المن ومجموعه البق الدقيقي والحشرات القشرية وغيرها. وذلك من خلال بيان الموقع التقسيمي للمجموعة والانتشار والاهمية الاقتصادية والانواع التابعة للمجموعة والمسجلة في الوطن العربي مع الإشارة الى اهم الصفات المظهرية المميزة للمجموعة ودورة الحياة العامة ثم الإشارة الى واحد او أكثر من الانواع المهمة التابعة لتلك المجموعة الحشرية والموجودة في العراق واخيرا التطرق الى الطرائق المعتمدة في مكافحة تلك المجموعة الحشرية.

ان المقدمة الحالية قد تكون غير كافية لتوضيح الفكرة التي يهدف هذا الكتاب لتحقيقها الا اننا على ثقة تامه بان قراءه الفصول التسعة لهذا الكتاب ستوضح للقارئ الفكرة التي أردنا ايصالها للقارئ الكريم، وان نجاح هذا الكتاب في عرضه الاهم من الحشرات الضارة للنباتات الاقتصادية سيكون البداية للكتابة عن المجاميع الحشرية الاخرى. اخيرا نرجو ان نكون بعملنا هذا قد قدمنا منها جديدا لدراسة الحشرات الاقتصادية.

والله الموفق

المحتويات

الصفحة	الموضوع
أ - ب	المقدمة
	الفصل الأول
	مقدمة في حشرات نصفية الأجنحة
3	المقدمة
4	الموقع التقسيمي لرتبة نصفية الأجنحة
4	مميزات رتبة نصفية الأجنحة
6	الاسس المعتمدة في تقسيم حشرات رتبة نصفية الأجنحة
14	أجزاء الفم الثاقبة الماصة تركيبها والية عملها
17	الاهمية الاقتصادية لحشرات رتبة نصفية الأجنحة
20	نصفية الأجنحة حشرات ضاره ام حشرات اقتصاديه
21	الاهمية النسبية لحشرات نصفية الأجنحة
	الفصل الثاني
	حشرات المن واقاربها
	التصنيف والأهمية والحياتية والمكافحة
27	المقدمة
27	التصنيف
28	الأهمية النسبية لعائلات المن
29	عائله حشرات المن Aphididae
29	الصفات المميزة للعائلة
30	تقسيم عائلة المن

31	الانتشار
32	المظهر الخارجي للمن
36	المصطلحات الخاصة بدورة حياة المن
38	دوره حياه المن
42	تعدد المظاهر Polymorphism
45	المن والنمل
47	الاضرار العامة للمن
57	انواع المن من عائلة Aphididae في الوطن العربي
65	انواع المن من عائلة Aphididae الاكثر شيوعا
78	حشرات المن من عائلة Eriosomatidae
الفصل الثالث	
الحشرات القشرية والبق الدقيقي	
الآفات الجالسة	
103	المقدمة
103	تقسيم فوق عائله كوكسويدا Coccoidea
105	واقع الحشرات القشرية والبق الدقيقي في الوطن العربي
106	مميزات فوق عائله الحشرات القشرية
110	الأهمية الاقتصادية لفوق عائلة كوكسويدا
116	اهم الملامح الحياتية لحشرات فوق عائله كوكسويدا
126	النمل وحشرات فوق عائلة Coccoidea
128	دورة الحياة العامة للحشرات القشرية والبق الدقيقي
128	عوائل الحشرات القشرية ذات الأهمية الاقتصادية
129	- عائلة الحشرات القشرية المدرعة Diaspididae
140	- عائلة الحشرات القشرية الرخوة Coccidae

148	- عائلة البق الدقيقي Pseudococcidae
157	- عائلة القشرييات العملاقة Margarodidae
169	مكافحة الحشرات القشرية والبق الدقيقي
الفصل الرابع	
الذباب الأبيض	
أفة الزراعة المكشوفة والمغطاة	
183	المقدمة
183	الموقع التقسيمي لعائلة الذباب الأبيض
184	الذباب الأبيض في البلاد العربية
186	الأهمية الاقتصادية للذباب الأبيض
189	الخصائص البيئية للذباب الأبيض
191	الذباب الأبيض والفايروسات
193	انتشار الذباب الأبيض في الأنظمة الزراعية
196	تاريخ حياة الذباب الأبيض
198	الأضرار العامة للذباب الأبيض
199	أنواع مهمة من الذباب الأبيض
204	إدارة الذباب الأبيض الضار
الفصل الخامس	
بق النبات الحقيقي	
أفة زراعية مهمة	
217	الموقع التقسيمي لبق النبات
217	أهم الصفات الحيوية لتحت رتبة مختلفة الأجنحة
219	عوائل البق الحقيقي نباتية التغذية

222	- عائلة البق النتن Pentatomidae
232	- عائلة بق الازهار Miridae
243	- عائلة بق البذور الحقيقي Lygaeidae
253	- عائلة البق الطرز Tingidae
271	- عائلة البق الناصع (السونة) Scutellaridae

الفصل السادس

البسليد او قمل النبات القافز

287	الموقع التقسيمي لقوق عائله Psylloidea
287	عائله البسليد او قمل النبات القافز Psyllidae
289	تاريخ الحياة العام للبسليد
289	اهم الصفات المظهرية والحياتية للبسليد
292	انواع البسليد الضارة في الوطن العربي
293	- بسليد الزيتون
295	- بسليد الفستق
298	- بسليد الكمثرى
301	- ادارة حشرات البسليد

الفصل السابع

حشرات السيكاذا

افات زراعية معمرة ومغردة

307	الموقع التقسيمي للسيكاذا
309	مجاميع السيكاذا
311	الاضرار ومظاهر الإصابة بالسيكاذا
313	التاريخ العام لحياء السيكاذا

316	وصف الاطوار المختلفة للسيكادا
318	الغناء في السيكادا
319	سيكادا العنب
321	ادارة حشرات السيكادا

الفصل الثامن

قافزات الاوراق سيكادية المظهر

327	المقدمة
327	عائله قافزات الاوراق Cicadellidae
328	الصفات المميزة لعائله Cicadellidae
329	الانتشار والاهمية الاقتصادية
330	تغذية القافزات
331	الاضرار ومظاهر الإصابة بالقافزات السيكادية
332	تاريخ الحياة العام لعائله Cicadellidae
334	قافزات الاوراق من Cicadellidae في الوطن العربي
339	عائله القافزات الضفدعية Cercopidae
340	القافزات الضفدعية في البلاد العربية
341	الاضرار ومظاهر الإصابة
342	تاريخ الحياة العام
344	وصف الاطوار
345	عائله قافزات الاشجار Membracidae
346	اداره الحشرات القافزة

الفصل التاسع

قافزات النبات المتألقة او الفلكوريدية المظهر

351	المقدمة
-----	---------

351	مميزات فوق عائلة Fulgoroidea وعائلاتها
352	القافزات المتألقة في البلاد العربية
354	القافزات المتألقة، انتشارها وأهميتها الاقتصادية
355	القافزات المتألقة، الأضرار ومظاهر الإصابة
356	وصف أطوار القافزات المتألقة
356	عائلات القافزات المتألقة في الوطن العربي
357	- عائلة Delphacidae
360	- عائلة Fulgoridae
360	- عائلة Tropiduchidae
363	- إدارة القافزات المتألقة
369	المصادر العربية
372	المصادر الأجنبية

الفصل الاول

مقدمة في حشرات نصفية الاجنحة

المقدمة

الموقع التقسيمي لرتبة نصفية الأجنحة

مميزات رتبة نصفية الاجنحة

الاسس المعتمدة في تقسيم حشرات رتبة نصفية الاجنحة

أجزاء الفم الثاقبة الماصة تركيبها والية عملها

الاهمية الاقتصادية لحشرات رتبة نصفية الاجنحة

نصفية الأجنحة حشرات ضاره ام حشرات اقتصاديه

الاهمية النسبية لحشرات نصفية الاجنحة

المقدمة

تعد رتبة نصفية الاجنحة من الرتب الحشرية المهمة حيث تضم معظم الحشرات الضارة بالنباتات الاقتصادية التي تتغذى على العصارة النباتية في الوطن العربي والعالم، مثل المن والذباب الابيض والبق الدقيقي والحشرات القشرية وغيرها فضلا عن ذلك فان رتبة نصفية الاجنحة تضم العديد من الانواع المفترسة للحشرات والعديد من الطفيليات التي تتغذى على دم الحيوانات الكبيرة الحجم، انواع اخرى من نصفية الاجنحة تعد انواع مفيدة حيث تستعمل في انتاج الاصباغ والشيلاك Shellac ان هذا التنوع في الانواع التابعة لرتبة نصفية الاجنحة مكنها من العيش في بيئات مختلفة، لذلك نجد ان بعض عوائل هذه الرتبة قد تكيفت ايضا للمعيشة المائية. ان الاسم نصفية الاجنحة Hemiptera مشتق من الكلمة اليونانية Hemi وتعني نصف و Pteron وتعني جناح وذلك اشارة الى الاجنحة الامامية لحشرات هذه الرتبة التي يكون نصفها القاعدي متصلب او جلدي والنصف الطرفي للجناح غشائي، كما تسمى اجنحة هذه الرتبة بالأجنحة نصف الغمدية Hemelytron اما الاجنحة الخلفية لحشرات هذه الرتبة فتكون غشائية وهي اقصر من الامامية عادة. تتباين الانواع الحشرية التابعة لهذه الرتبة بشكل كبير في شكلها العام، الا انها تشترك جميعها في امتلاكها لأجزاء فم ثاقبة ماصة Piercing Sucking & وهي تشترك بذلك مع رتبة هذبية الاجنحة Thysanoptera وبعض انواع رتبة Phthiraptera.

ان الانواع التابعة لهذه الرتبة كانت تعود سابقا لرتبتي متشابهة الاجنحة Homoptera ومختلفة الاجنحة Heteroptera، وذلك استنادا الى

الاختلافات في تركيب الاجنحة وموقع اجزاء الفم او الخرطوم Rostrum، ثم دمجت هاتين الرتبتين في رتبة واحدة وهي نصفية الاجنحة Hemiptera والتي ستكون محل اهتمام هذا الفصل.

الموقع التقسيمي لرتبة نصفية الاجنحة Hemiptera

يعد التقسيم الطبيعي للحشرات الذي اعتمده نظام المعلومات التصنيفي المتكامل Integrated Taxonomic Information System ويختصر بـ (ITIS) وهو النظام التقسيمي الاحدث، ووفق هذا النظام فان الموقع التقسيمي لرتبة نصفية الاجنحة يكون كالآتي:-

Phylum: Arthropoda
Subphylum : Hexapoda
Class : Insecta
Sub class : Pterygota
Infra class : Exopterygota
Super order : Neoptera
Order : Hemiptera (Linnaeus .1758)

مميزات رتبة نصفية الاجنحة

تعد الحشرات نصفية الاجنحة من مجاميع الحشرات التابعة لتحت صف الحشرات خارجية الاجنحة Exopterygota والتي تتراوح اطوالها من اقل من 1-110 ملم والتي تضم حشرات تختلف كثيرا في صفاتها التركيبية والسلوكية وتتواجد في بيئات مختلفة او واسعة.

لهذه المجموعة من الحشرات مميزات عامة يمكن بواسطتها التمييز بينها وبين مجاميع او رتب الحشرات الاخرى وهي:

1-) اجزاء فمها ثاقبه ماصه قد تنشأ من مؤخرة الرأس وتسمى سفلية اجزاء الفم Hypognathous (كما في الحشرات من رتبة Sternorrhyncha)

او تنشأ من مقدمة الرأس وتسمى امامية اجزاء الفم Prognathous (كما في الحشرات من تحت رتبة Heteroptera) وقد تكون ضامره او اثريه في ذكور الحشرات القشرية.

2-) لمعظم بالغات هذه الحشرات اجنحة امامية نصف غمديه Hemelytra حيث يكون نصفها القاعدي متصلب وجلدي والنصف الطرفي للجناح غشائي اما الاجنحة الخلفية فتكون غشائية بالكامل (كما في الحشرات من تحت رتبة Heteroptera) او قد تكون الاجنحة الامامية والخلفية غشائية بالكامل (كما في الحشرات من تحت رتبتي Sternorrhyncha & Auchenorrhyncha) في حين تخلو بعض بالغات هذه الرتبة وجميع الحوريات من هذه الاجنحة مثل بق الفراش والحشرات القشرية وبعض انواع قمل النبات.

3-) تطوي هذا الحشرات اجنحتها عند عدم الاستعمال على شكل جمالون يغطي الجسم (كما في الحشرات من تحت رتبة Sternorrhyncha) او تطوى وقت الراحة بشكل متراكب وأفقي فوق الجسم (كما في الحشرات من تحت رتبة Heteroptera).

4-) لهذه الحشرات زوج من العيون المركبة المتطورة بشكل جيد وقد تحتوي على 2-3 من العيون البسيطة ocelli.

5-) قرون الاستشعار قد تكون قصيره مؤلفة فقط من عدد قليل من العقل او تكون خيطية طويلة متطورة بشكل جيد وظاهرة في الانواع الارضية.

6-) لبالغات هذه الحشرات وحورياتها ثلاثة ازواج من الارجل وواحد او اثنين من المخالب claws التي ترتبط برسغ بعض هذه الارجل على الاقل.

7-) التطور في الحشرات غير كامل او تدريجي باستثناء الذباب الابيض والحشرات القشرية اذ يكون فيها التحول أكثر تعقيدا لوجود طور جالس غير متحرك قبل ظهور الحشرة الكاملة.

8-) يعد شكل وطول كل من قرون الاستشعار، الارجل والخرطوم مهما في التمييز بين عوائل هذه الرتبة، كذلك فان شكل الجسم ووجود او غياب العروق في الاجنحة الغشائية يعد مهما في تمييز بعض مجاميع هذه الحشرات.

الاسس المعتمدة في تقسيم حشرات رتبة نصفية الأجنحة

هناك العديد من الاسس التي يمكن اعتمادها لتقسيم الانواع الحشرية التابعة لرتبه نصفية الاجنحة، وذلك لتسهيل دراستها، ومن اهم هذه الاسس ما يأتي:

اولا) بحسب نظام المراتب التقسيمية Hierarchy Classification :-

وعلى هذا الاساس تقسم رتبه نصفية الأجنحة الى اربعة تحت الرتب هي:

S.o : Auchenorrhyncha

S.o : Coleorrhyncha

S.o : Heteroptera

S.o : Sternorrhyncha

ان تحت رتبة Auchenorrhyncha تقسم الى:

1-) Infra order:- Cicadomorpha

Super Family:- Cicadoidea

Family:- Cicadidae

2-) Infra order:- Fulguromorpha

Super Family:- Fulguroidae

وتضم العوائل:

Acanaloniidae, Achilidae, Cixidae, Delphacidae , Derbidae , Dictyopharidae, Flatidae , Fulgoridae , Issidae , Kinnaridae, Tropiduchidae

اما تحت رتبة Coleorrhyncha فتضم عائلة واحدة هي Peloridiidae ،
اما تحت رتبة مختلفة الاجنحة Heteroptera فتضم سبعة رتبيات
Infraorder وكما يأتي:

1-) Infra order: Cimicomorpha
Super Family: Cimicoidea

وتضم العوائل:

Anthocoridae, Cimicidae, Nabidae, Polycetenidae
Super Family : Joppeicoidea

Joppeicidae وتضم العائلة:

Super Family: Miroidea

وتضم العوائل

Microphysidae , Miridae
Super Family : Redovoidea

Reduvidae , Phymatidae وتضم العائلتين

Super Family: Thaumastocoroidea

Thaumastocoridae وتضم العائلة

Super Family: Tingidea

تضم عائله Tingidae فقط.

2-) Infra Order : Dipsocoromorpha

Super Family : Dipsocoroidea

Ceratocombidae, Dipsocoridae , Schizopteridae وتضم العوائل

3-) Infra order : Enicocephalomorpha

Super Family : Enicocephaloidea

Enicocephaloidea وتضم العائلة

4-) Infra order : Gerromorpha

Super Family : Gerroidea

Gerridae, Veliidae

وتضم العائلتين

Super Family: Hebroidea

وتضم العائلة Hebridae

Super Family : Hydrometroidea

وتضم العائلتين Hydrometridae , Macrometroidae

Super Family : Mesovelioidae

وتضم العائلة Mesoveliidae

5-) Infra order :. Leptopodomorpha

Super Family : . Leptopodoidea

وتضم العائلتين Leptopodidae , Saldidae

6-) Infra order :. Nepomorpha

Super Family :. Corixoidea

وتضم العائلة Corixidae

Super Family :. Gelastocoroidea

وتضم العائلتين Gelastocoridae , Ochteridae

Super Family :. Naucoroidea

وتضم العائلة Naucoridae

Super Family :. Nepoidea

وتضم العائلتين Belostomatidae , Nepidae

Super Family :. Notonectoidea

وتضم العائلتين Notonectidae , Pleidae

7-) Infra order :. Pentatomomorpha

Super Family :. Aradoidea

وتضم العائلتين Aradidae , Termitaphididae

Super Family :. Coreoidea

وتضم العوائل:

Alydidae, Coreidae, Hypocephalidae, Rhopalidae,
Stenocephalidae
Super Family :: Idostoloidea

وتتضمن العائلتين Henicocoridae , Idiostoloidae

Super Family :: Lygaeoidea

وتتضمن العوائل الأتية

Berytidae, Blissidae, Cryptorhamphidae, Cymidae,
Geocoridae, Heterogastridae, Lygaeidae, Malcidae,
Ninidae, Oxycarenidae, Pachygronthidae, Piesmatidae,
Rhyarochromidae Artheneidae , Colobathrisidae
Super Family :: Pentatomoidea

وتتضمن العوائل

Acanthosomatidae, Cydnidae, Pentatomidae, Plataspidae,
Scutelleridae, Tessaratomidae , Thyreocoridae
Super Family :: Pyrrhocoridae

وتتضمن العائلتين Largidae , Pyrrhocoridae

اما تحت رتبة Sternorrhyncha فتتضمن خمسة فوق عوائل وكما يأتي:

1-) Super Family :: Adelgoidea

وتتضمن العائلتين Adelgidae , Phylloxeridae

2-) Super Family :: Aleyrodoidea

وتتضمن العائلة Aleyrodidae

3-) Super Family :: Aphidoidea

وتتضمن العائلتين Aphididae , Eriosomatidae

4-) Super Family :: Coccoidea

وتتضمن العوائل

Aclerididae, Asterolecaniidae, Coccidae, Conchaspididae
,Dactylopiidae, Diaspididae, Eriococcidae, Kermesidae,
Kermidae, Lacciferidae, Margarodidae, Ortheziidae,
Pseudococcidae

5-) Super Family :. Psylloidea

وتضم العائلة Psyllidae

مما سبق يتبين ان تحت رتبة Sternorrhyncha تضم جميع العوائل التابعة لرتبه متشابهة الاجنحة Homoptera، ان جدول (1-1) يمثل خلاصه التقسيم المعتمد على المراتب التقسيمية.

الجدول (1-1) خلاصة تقسيم رتبة نصفية الاجنحة المعتمد على المراتب التقسيمية

أعداد			تحت الرتب
Family	Super Family	InFra order	Sub orders
13	2	2	Auchenorrhyncha
1	0	0	Coleorrhyncha
63	24	7	Heteroptera
19	5	0	Sternorrhyncha
96	31	9	المجموع

ثانياً) التقسيم بحسب الحد الاقتصادي الحرج:- وعلى هذا الاساس تقسم حشرات رتبة نصفية الاجنحة الى المجاميع الاتية:

1-) انواع رئيسية:- وتمتاز هذه الانواع بان قيمة الحد الاقتصادي الحرج لها دون مستوى التوازن الطبيعي وتسمى هذه الانواع حينذاك بألافه الرئيسية Key pest لأنها تشكل الهدف الرئيسي الذي يوضع على اساسه نظام ادارتها.

2-) انواع دائمية:- وهي الانواع التي يكون حدها الاقتصادي الحرج فوق مستوى التوازن الطبيعي بقليل مما يجعل من عملية التدخل لخفض اعدادها ضروريا باستمرار كلما حدثت زيادة في اعدادها لذلك تسمى

بالآفات الدائمة والمستمرة وذلك لوجودها على عائلها بمستويات ضاره باستمرار .

3-) انواع بالمناسبات:- وتمتاز هذه المجموعة بارتفاع الحد الاقتصادي الحرج بها كثيرا عن مستوى التوازن الطبيعي وان اعدادها لاتصل الى مستوى الحد الاقتصادي الحرج الا عندما تتأثر اعدادها بظروف بيئية مناسبة لتكاثرها او زيادة اعدادها او نتيجة استخدام المبيدات بشكل خاطئ يؤدي الى استبعاد اعدادها الحيوية.

4-) انواع نادرة:- وتضم العديد من الانواع الحشرية التابعة لنصفية الاجنحة التي تلاحظ متغذية على المحاصيل المختلفة الا ان اعدادها لا تصل ابا الى مستوى الحد الاقتصادي الحرج او قد تكون اعدادها كبيرة الا ان مقدار ما تسببه من ضرر لا يرقى الى مستوى الخسارة الاقتصادية كما في حالة من اللوبيا *Aphis craccivora* على الجت.

ثالثاً) بحسب مجاميع الانواع الضارة للنباتات الاقتصادية:- تضم رتبة نصفية الاجنحة مجموعه كبيره جدا من الانواع الضارة بالنباتات الاقتصادية والتي يمكن تقسيمها الى ما يأتي:-

1-) مجموعة المن:- وتضم انواعا تتبع العوائل

Eriosomatidae و Aphididae, Phylloxeridae, Adelgidae

2-) مجموعة الحشرات القشرية والبق الدقيقي: وتضم العديد من الانواع

التابعة للعوائل الاتية, Asterolecaniidae, Coccidae, Diastididae,

Dactylopiidae, Eriococcidae, Kermesidae, Kermidae,

Lacciferidae, Margarodidae, Orthezidae,

Pseudococccidae.

3- مجموعة حشرات الذباب الابيض:- وتضم العديد من الانواع التابعة لعائلة Aleyrodidae.

4- مجموعة حشرات بق النبات:- وتضم العديد من الانواع التابعة للعوائل الأتية: Coreidae, Lygaeidae, Miridae, Pentatomidae, Pyrrhocoridae, Scutelleridae, Tingidae, Tropiduchidae

5- مجموعة البسليد:- وجميع انواعها تعود لعائلة Psyllidae.

6- مجموعة حشرات السيكاذا:- وتضم العديد من الانواع التابعة لعائلة Cicadidae.

7- مجموعة القافزات:- وتضم الانواع التابعة للعوائل Membracidae, Fulgoridae, Delphacidae, Cicadellidae, Cercopidae

ان المجاميع السابقة تحتل الانواع الضارة للنباتات الاقتصادية في الوطن العربي وهذا لا يعني عدم وجود انواع ضارة اخرى على النباتات الاقتصادية في مناطق اخرى في العالم.

رابعاً تقسيم حشرات رتبة نصفية الأجنحة تبعا لعوائلها الغذائية:- وعلى هذا الاساس تقسم حشرات الرتبة الى

1- حشرات العائلة النجيلية: مثل من الحنطة ومن الذرة والحشرة القشرية الرخوة وبق الحنطة الدقيقي وغيرها.

2- حشرات العائلة البقولية: مثل من الباقلاء الاسود ومن العدس ومن الجت المرقط وقفاز الاوراق.

3- حشرات القطن ومنها بقة بذرة القطن ومن القطن وذبابة القطن البيضاء.

4- حشرات البنجر السكري: مثل قفاز الاوراق ومن الباقلاء الأسود.

5- حشرات التبغ: ومنها من الخوخ الأخضر، ذبابة القطن البيضاء.

- 6- حشرات المحاصيل الزيتية: مثل قفاز الأوراق، الذبابة البيضاء، من الخوخ الأخضر والبق المطرز.
- 7- حشرات القرعيات: ومنها من القطن وذبابة القطن البيضاء.
- 8- حشرات العائلة الصليبية: ومنها من اللهانة ومن الخوخ الأخضر.
- 9- حشرات العائلة الباذنجانية: ومنها ذبابة القطن البيضاء.
- 10- حشرات العائلة الخبازية: بقة بذرة القطن ومن البطيخ.
- 11- حشرات العائلة الرمرامية: ومنها قفاز الأوراق.
- 12- حشرات الحمضيات: مثل البق الدقيقي والحشرة القشرية السمراء ومن العدس.
- 13- حشرات الزيتون: حشرة الزيتون القشرية ويسليد الزيتون.
- 14- حشرات اللوزيات: ومنها بق اغصان اللوزيات ومن اوراق المشمش، من ساق الخوخ ومن تجعد اوراق الخوخ.
- 15- حشرات التفاحيات: مثل البق المطرز ومن التفاح القطني وبق التفاف اوراق الكمثرى.
- 16- حشرات الفستق وحبّة الخضراء: ومنها بق الفستق الدقيقي ومن حافات اوراق الحبة الخضراء وقفاز الاوراق ويسليد الفستق.
- 17- حشرات العنب: وتضم بق الحمضيات الدقيقي، قفاز اوراق العنب وسيكادا العنب.
- 18- حشرات الرمان: ومنها من الرمان وذبابة الرمان الأبيض.
- 19- حشرات التين: مثل حشرة التين الشمعية.
- 20- حشرات اشجار الغابات: بق القوغ المطرز ويسليد تجعد اوراق القوغ ومن تدرن القوغ ومن الثويا.


21-) حشرات نباتات الزينة: قشرية الروز وقشرية الفل، من الداؤودي.
مما سبق يتضح المدى العائلي الواسع لحشرات رتبة نصفية الأجنحة.
ان لكل من التقسيمات السابقة اهداف معينة كما انها تحقق او توفر المرونة
اللازمة للتعامل مع مجاميع الانواع الحشرية التابعة لهذه الرتبة بشكل سهل.
في هذا الكتاب سيتم الاستعانة بالتقسيم الاول والثالث لتنظيم فصول الكتاب
من اجل تقديم هذه المجموعة الحشرية بشكل يسهل على القارئ فهمها. اضافة
لما سبق فان هذه التقسيمات تشير الى ان الغالبية العظمى من الانواع الضارة
للنباتات الاقتصادية تعود لتحت رتبتين هما Heteroptera او البق الحقيقي
True bugs وال Sternorrhynha او Homoptera. ان الفروقات الحيوية
بين هاتين المجموعتين تمت تلخيصها في الجدول (1-2).

اجزاء الفم الثاقبة الماصة، تركيبها واليه عملها

اجزاء فم حشرات نصفية الأجنحة تكون بشكل خرطوم طويل يتكون من الشفة
السفلى Labium والتي غالبا ما تكون مقسمة الى عدد من العقل وتعمل كغمد
تحوي اربعة اجزاء ابريه ثاقبه Piercing stylets هي عبارة عن زوج من
الفكوك Mandibles وزوج من الفكوك المساعدة Maxillae اما الشفة العليا
Labrum فهي قصيره توجد عند قاعده الخرطوم. لا تنقب الشفة السفلى
النسيج حين الوخز ولكنها تميل او تتحني سائده الاجزاء الإبرية عندما تدخل
في نسيج ما وحينما تكون الفكوك والفكوك المساعدة متقاربة سوية فأنها تكون
قناتين، قناة غذائية Food canal وقناه لعابيه Salivary canal، اما
الملامس الفكيه فهي مختزلة او معدومة (الشكل 1-1). ان الرمح المكون من
الفكوك المساعدة يحوي قناة اللعاب التي توجه او تحقن اللعاب الى داخل

حشرات نصفية الأجنحة الضارة بالنباتات الاقتصادية

النبات فيما تقوم قناة الغذاء المتكونة من الفكوك بامتصاص الغذاء او عصارة النبات الى القناة الهضمية للحشرة وخلال عملية التغذية فان الرمح هو فقط الذي يخترق النسيج النباتي الى ابعاد متباينة حسب نوع الحشرة (الشكل 1-1-2).



الشكل (1-1)

(a) منظر امامي لأجزاء فم ثاقبه ماصه

(b) مقطع عرضي في اجزاء فم ثاقبه ماصه


(c) مقطع جانبي تتضح فيه اجزاء الفم الثاقبة الماصة

لحشرات نصفية الاجنحة

الجدول (1-2) الفروقات الحيوية للتمييز بين تحت رتبتي Heteroptera

و (Homoptera) Sternorrhynha

Sternorrhyncha (Homoptera)	Heteroptera
(-1) ليس لجميع أنواعها أسلاف مشتركة	(-1) لجميع أنواعها سلف أوجد مشترك
(-2) الأجنحة الأمامية جلدية بالكامل والخلفية غشائية	(-2) الجزء القاعدي من الأجنحة الأمامية جلدي والجزء الطرفي غشائي والأجنحة الخلفية غشائية
(-3) عدم وجود Scutellum أو الدرع	(-3) حشرات ذات تركيب يشبه الدرع في ترجمة الصدر يسمى ال Scutellum ويقع بين مقدم الأجنحة
(-4) غدد الرائحة غير موجودة	(-4) كرياتها وبالغاتها غدد رائحة في منطقة البطن
(-5) جميع أنواعها متغذيات نباتية	(-5) أنواعها إما نباتية التغذية أو مفترسات حشرية والقليل من أنواعها يتغذى على دم الفقريات من ذوات الدم الحار
(-6) جميع أنواعها تعيش على اليابسة	(-6) العديد من أنواعها مائية المعيشة
(-7) لا تعد مجموعة مستقلة لأنها تمتلك جينات مشتركة مع أسلاف أو أجداد متباينة	(-7) على أساس التقسيم التأسيلي أو النشوي تعد أنواع مختلفة الأجنحة مجموعة مستقلة وذلك كونها وحيدة الشعبة أو الأصل Monophyletic
(-8) أنواعها تتغذى على العصارة الخلوية أو على الأوعية الناقلة كالخشب أو اللحاء وبالتالي فإنها تحصل على نايتروجين أقل مقارنة بالحشرات التي تتغذى على الأجزاء التكاثرية	(-8) العديد من أنواعها وخاصة التابعة لرتبة Pentatomorpha تفضل الأجزاء التكاثرية للنبات كالأزهار والمبايض والبذور الناضجة وغير الناضجة وبذلك تحصل على نايتروجين أكثر وذلك لنشاط تلك الأجزاء فسلجيا.
(-9) أنواعها أقل منافسة وضررها غير مباشر لتغذيتها على العصارة الخلوية	(-9) أنواعها أكثر منافسة وضررها مباشر لتغذيتها على الثمار والبذور
(-10) أنواعها تعد ناقلات جيدة لمرضات النبات وذلك لأنها تغرز أجزاء فمها في خلايا النبات مثل المن والحشرات القشرية أو تغرزها في الأوعية الناقلة مثل قفازات الأوراق حيث تمتص سوائلها حيث توجد الممرضات النباتية في داخل خلايا النبات أو في أوعيته الناقلة	(-10) أنواعها لا تنقل الممرضات النباتية وذلك لأنها تغرز رمحها أو أجزاء فمها بين خلايا أنسجة النبات وبذلك لا يلامس الرمح الممرضات النباتية التي قد توجد داخل خلايا النبات
(-11) أنواعها صغيرة الحجم والألوان التحذيرية نادرة جدا في أنواعها	(-11) أنواعها كبيرة الحجم وتمتلك ألوان تحذيرية تكون طاردة للمفترسات



الشكل (1-2): عملية التغذية في حشرات نصفية الأجنحة حيث يلاحظ ان عملية اختراق الرمح للنسيج النباتي يتطلب انحناء او تقوس الشفة السفلى لتعمل كدعامة للرمح اثناء عملية الاختراق.

الاهمية الاقتصادية لحشرات رتبة نصفية الأجنحة

لاشك ان الاهمية الاقتصادية لهذه المجموعة الحشرية وغيرها تمثل الحاصل النهائي لعملية الموازنة ما بين الاضرار التي تحدثها وبين الفوائد التي يمكن ان تعود بها للإنسان والبيئة. وعليه سيتم تناول هذا الموضوع من خلال المحورين الآتيين:-

أولاً) الاضرار:- وتشمل

1- ان الكثير من انواع هذه المرتبة تعمل على امتصاص العصارة النباتية بما يؤدي الى خفض انتاجية النباتات المصابة فمثلا وجد ان البرسيم الحجازي *Therioaphis maculatus* سبب خسارة في الولايات المتحدة الامريكية قدرت بـ 42 مليون دولار في احدى السنوات، ناهيك عما سببته حشرة البق الدقيقي لزراعة الحمضيات في امريكا.

2- تشوه الاجزاء النباتية والثمار المصابة والمتمثلة بالتفاف الاوراق وتشوهها وتكوين الاورام وتشوه الثمار نتيجة العديد من حشرات المن وبق النبات وافرازها العديد من التوكسينات، مثال ذلك حشرة فيلوكسيرا العنب المسماة *Phylloxera vitifoliae* PI التي تعد من أخطر الآفات الحشرية على العنب في اوربا حيث ادت الاصابة بهذه الحشرة الى الحد من زراعة العنب في فرنسا نتيجة تكوينها اورام عقدية على الاوراق والجذور مما يؤدي الى تدهور شجيرات العنب وموتها.

3- تعد معظم الانواع التابعة لتحت رتبة Sternorrhyncha ناقلات جيدة للعديد من مسببات الامراض النباتية من النباتات المصابة الى السليمة كالفطريات والبكتيريا والفايروسات، فمرض التقرح المعمر والذي يصيب التفاح ويسببه فطر *Glocosporium perennans* Beck ينقله من التفاح الصوفي *Eriosoma lanigerum* Hausm كذلك تلعب الذبابة البيضاء وانواع المن وقفازات الاوراق دورا مهما في نقل مجموعة كبيرة من الفايروسات المسببة لأمراض النبات، فمثلا وجد ان من الخوخ الاخضر *Myzus persicae* ينقل اكثر من 100 نوع من الفيروسات.

4- العديد من انواع هذه الرتبة تعمل على افراز الندوة العسلية Honeydew على النباتات والتي تعمل على تراكم الأتربة ونمو فطريات العفن الاسود

Sooty Mold مما يؤدي الى ضعف النبات نتيجة اعاقه عملية التركيب الضوئي.

5-) المضايقة وفقر الدم:- حيث يعمل بق الفراش *Cimex lectularis* على مضايقة الانسان نتيجة تغذيته على دم الانسان.

ثانياً: الفوائد:- وتشمل

1-) انتاج الشيلاك Shellac من الخلايا الغديه للبشرة الداخلية لبعض الحشرات القشرية الهندية والذي يستخدم كدهان لتلميع الاخشاب والمعادن والجلود ولعمل اسطوانات التسجيل، كما يستخرج صمغ اللاك من حشرة البق الدقيقي *Laccifer lacca* التي تعيش على اشجار الغابات في الهند وبورما.

2-) انتاج بعض الصبغات مثل صبغة الـ Cochineal القرمزية اللون والتي تستخرج من بطون الاجسام الجافة لحشرة الصبير القشرية (Costa) *Dactylopius coccus* حيث تستخدم في تزيين بعض المعجنات الغذائية، كما ان لها استخدامات طبية في معالجة بعض الامراض مثل السعال الديكي.

3-) العديد من انواعها مفترسات جيدة للعديد من الآفات الحشرية الضارة.

4-) العديد من الانواع المائية التابعة لهذه الرتبة تعتبر من اهم المصادر الغذائية للأسماك، كما يستخدم بعضها طوعاً لصيد الاسماك.

5-) تستخدم افرازات بعض انواعها كغذاء للإنسان مثل مادة المنا Manna التي تفرزها الحشرات القشرية والمن والسيكادا خلال اشهر الصيف الحارة، ومن السما ينتج من افرازات الحشرة القشرية *Trabutina mannipara* التي تتغذى على التاماركس *Tamarix spp*، وتستعمل

افرازات انواع المن في شمال العراق والتي تتغذى على البلوط في صناعة اشهر انواع حلويات من السما.

6-) العديد من انواعها تتغذى على الادغال وبذلك تقلل من اضرارها وقد تستخدم كعنصر مكافحة حيوية للأدغال.

نصفية الاجنحة حشرات ضارة ام حشرات اقتصادية؟

ان الحد الاقتصادي الحرج (E.T.) Economic Threshold والذي يمكن تعريفه بأنه عدد افراد الافة الحشرية التي تسبب خسارة في المحصول تساوي تكاليف عملية المكافحة، وعند وصول الافة الحشرية الى هذا المستوى لا بد من اتخاذ قرار المكافحة لمنعها من الوصول الى مستوى الضرر الاقتصادي (EIL) Economic Injury Level، وهو عدد افراد الافة الحشرية التي تسبب خسارة اقتصادية لا يمكن تجنبها حتى لو تمت عملية المكافحة. مثال ذلك لو ان متوسط اعداد حوريات الذباب الابيض بلغت 67 حورية / نبات طماطة وان هذا العدد سبب خسارة في محصول الطماطة مقداره 10 دولار / دونم وكانت كلفة عملية المكافحة للدونم الواحد تساوي 10 دولارات أيضا، فإن المزارع سيصبح في وضع حرج هل يكافح أم لا؟ (وان المتوسط 67 حورية / نبات سيمثل الحد الاقتصادي الحرج) ان اتخاذ قرار المكافحة في هذا الوضع الحرج يعتمد على مرحلة نمو المحصول والظروف البيئية السائدة في المنطقة فاذا كان المحصول في بداية نموه والظروف البيئية السائدة في صالح الذبابة البيضاء فان المزارع سيقوم بأجراء عملية المكافحة لمنع الافة من الوصول الى مستوى الضرر الاقتصادي والذي قد يصل مثلا الى 75 دولار / دونم والذي لا يمكن تجنبه بعد ذلك لان الخسارة تكون قد تحققت

وتنفيذ المكافحة عندئذ سيعني خسارة اضافية للمزارع. مما سبق يتبين ان قيمة الحد الاقتصادي الحرج وضعت حدا بين مفهومي الضرر Damage والضرر الاقتصادي Economic Damage او الخسارة الاقتصادية Economic Damage اذ ان كل خسارة اقتصادية هي ضرر ولكن ليس كل ضرر هو خسارة اقتصادية وعليه فان اي حشرة من نصفية الاجنحة او غيرها عندما تتغذى على محصول ما فهي حشرة ضارة وعندما يتجاوز ضررها قيمة الحد الاقتصادي الحرج، فأنها تصبح حشرة اقتصادية، علما ان الخسارة الاقتصادية التي تسببها الحشرة في هذا الموسم قد لا تسببه في الموسم القادم، وعليه فان مصطلح الحشرات الضارة هو الاكثر دقة من مصطلح الحشرات الاقتصادية لان المصطلح الاخير يمكن ان يفهم منه ان الحشرة ذات فائدة اقتصادية ايضا.

الاهمية النسبية لحشرات نصفية الاجنحة

لبيان الاهمية النسبية لأنواع نباتية التغذية من حشرات نصفية الاجنحة مقارنة بعدد الانواع الحشرية نباتية التغذية الموجودة في الرتب الحشرية الأخرى، تم عمل احصائية لعدد الانواع الضارة بالنباتات الاقتصادية استنادا الى ما ورد من حشرات ضارة بالنباتات الاقتصادية في الوطن العربي في معجم الملاح الموسوم (معجم الملاح في الاسماء العلمية والعربية الشائعة للحشرات الضارة في الوطن العربي)، حيث سيتم بيان الاهمية النسبية لحشرات نصفية الاجنحة من خلال المحورين الآتيين:-

أولا) الاهمية النسبية لنصفية الاجنحة مقارنة بالرتب الاخرى:

من الجدول (1-3) تتضح الاهمية النسبية لهذه الرتبة.

الجدول (1-3) الأهمية النسبية لرتبة نصفية الأجنحة مقارنة بالرتب

الحشرية التي تضم انواعا نباتيه التغذيةية.

اسم الرتبة	عدد العائلات التي تضم انواعا نباتية التغذيةية	عدد الانواع نباتية التغذيةية	الأهمية النسبية
نصفية الأجنحة	29	557	28,93
غمديه الأجنحة	31	519	26,96
حرفية الأجنحة	44	431	22,38
ذات الجناحين	22	139	7,22
غشائية الأجنحة	22	137	7,11
متساوية الأجنحة	4	24	1,24
مستقيمة الأجنحة	5	56	2,90
جلدية الأجنحة	3	3	0,155
هدبية الأجنحة	3	59	3,06
المجموع	163	1925	100

حيث شكلت الانواع الضارة للنباتات الاقتصادية التابعة لرتبة نصفية الأجنحة 28,93 مقارنة بـ 26,96 و 22,38 لرتبتي غمديه الأجنحة و حرفية الأجنحة على التوالي، فيما احتوت رتبة جلدية الأجنحة *Dermaptera* اقل نسبة من الانواع الضارة للنباتات الاقتصادية وبلغت 0,155% (الجدول 1-3).
 مما سبق يتضح ان رتبة نصفية الأجنحة تعد الرتبة الأكثر أهمية من بين جميع رتب الحشرات نباتية التغذيةية، وذلك بالرغم من انها ليست الرتبة الأكبر من حيث عدد الانواع الحشرية التي تضمها مقارنة مثلا برتبة غمديه الأجنحة التي يقدر عدد انواعها بـ 300 ألف نوع.

حشرات نصفية الأجنحة الضارة بالنباتات الاقتصادية

ان ما سبق يمكن ان يشكل دافعا للاهتمام بدراسة هذه المجموعة الحشرية بشكل مفصل من اجل الاحاطة بنقاط الضعف والقوة فيها.

ثانياً) الأهمية النسبية لمجاميع الحشرات نباتية التغذية في نصفية الأجنحة: من الجدول (1-4) يتبين ان الانواع الضارة تقع في سبعة مجاميع مختلفة وان كل مجموعة تضم عددا من العوائل الحشرية.

الجدول (1-4) الأهمية النسبية لمجاميع الحشرات الضارة للنباتات

الاقتصادية ضمن رتبة نصفية الأجنحة.

المجموعة الحشرية	عدد عائلاتها	عدد انواعها	الأهمية النسبية
المن	4	185	33,21
الحشرات القشرية والبق الدقيقي	11	151	27,10
الذباب الابيض	1	27	4,84
بق النبات	8	100	17,95
السيكادا	1	5	0,89
القفازات	5	58	10,41
البسليد	1	31	5,56
المجموع	29	557	100

كما يتضح من الجدول نفسه ان مجموعة حشرات المن تشكل ما نسبته 33,21% من مجموع الانواع الحشرية الضارة الموجودة في الرتبة والبالغة 557 نوعا، تليها مجموعة الحشرات القشرية والبق الدقيقي حيث احتلت هذه المجموعة 27,1% من مجموع الانواع الضارة في الرتبة وتليها بالمرتبة الثالثة مجموعة بق النبات التي بلغت نسبتها من الانواع الضارة 17,95%. ان

حشرات نصفية الأجنحة الضارة بالنباتات الاقتصادية

مجاميع الحشرات السابقة ستكون موضع اهتمام الفصول اللاحقة التي سنتناول العديد من الجوانب المتعلقة بتصنيف وحياتية هذه المجاميع فضلا عن الاهتمام بالجوانب الاقتصادية والمكافحة المرتبطة بتلك المجاميع.

الفصل الثاني

حشرات المن واقاربها

التصنيف والأهمية والحياتية والمكافحة

المقدمة

التصنيف

الأهمية النسبية لعائلات المن

عائلة حشرات المن **Aphididae**

الصفات المميزة للعائلة

تقسيم عائلة المن

الانتشار

المظهر الخارجي للمن

المصطلحات الخاصة بدورة حياة المن

دوره حياه المن

تعدد المظاهر **Polymorphism**

المن والنمل

الاضرار العامة للمن

انواع المن من عائلة **Aphididae** في الوطن العربي

انواع المن من عائلة **Aphididae** الأكثر شيوعا

حشرات المن من عائلة **Eriosomatidae**

حشرات المن من عائلة **Phylloxeridae**

حشرات المن من عائلة **Adelgidae**

مكافحة المن

المقدمة

حشرات المن Aphids او قمل النبات Plant lice تعد المجموعة الحشرية الاكبر ضمن مجاميع حشرات رتبة نصفية الاجنحة نباتيه التغذية Phytophagous، التي تضم انواعا ضارة بالنباتات الاقتصادية، اذ من النادر جدا ان محصولا او نباتا ذو اهمية اقتصادية لا يهاجم بنوع او أكثر من انواع المن. ان الانتشار العالمي لهذه المجموعة من الحشرات وتعدد مظاهرها وسلوكها جعل منها مجموعته حشرية ممتازة لإنجاز العديد من الدراسات الخاصة بالنشوء Evolution والسلوك Behavior وعلم وظائف الاعضاء Physiology وعلم الحياة الجزيئي Molecular biology والمكافحة الحيوية Biological control، الى جانب استخدامها في الدراسات البيئية والاقتصادية المتمثلة بطرائق اخذ العينات وتقدير الضرر والخسائر الناتجة عن الإصابة، هذا فضلا عن سهولة تربية العديد من انواعها في المختبر او البيوت الزجاجية لاستخدامها في دراسات السمية وغيرها من الدراسات الحيوية، لذلك فان هذا الفصل سيهتم بتسليط الضوء على العديد من الجوانب التصنيفية والحيوية لهذه المجموعة فضلا عن اساليب مكافحتها.

Taxonomy

التصنيف

لفترة طويلة من الزمن وضع المن مع حشرات البسليد والذباب الابيض والحشرات القشرية والبق الدقيقي في رتبة منفصلة هي رتبة متشابهة الاجنحة Homoptera. بعد ذلك تم دمج رتبة متشابهة الاجنحة مع رتبة نصفية الاجنحة Hemiptera وذلك لوجود شبه كبير في الصفات المظهرية

والاصول الجينية بين انواع المرتبتين. وتم تقسيم رتبة نصفية الاجنحة Hemiptera الى اربعة تحت رتبة هي:

- 1-) Sub Order :. Auchenorrhyncha
- 2-) Sub Order :. Heteroptera
- 3-) Sub Order :. Coleorrhyncha
- 4-) Sub Order :. Sternorrhyncha

ان تحت رتيه Sternorrhyncha تضم خمسة فوق عوائل هي:

- 1-) Super Family : Aleyrodoidea
- 2-) Super Family : Coccoidea
- 3-) Super Family : Psylloidea
- 4-) Super Family : Aphidoidea
- 5-) Super Family : Adelgoidea

ان فوق عائلتي الـ Aphidiodea و الـ Adelgoidea تضمان جميع عائلات المن الضارة بالنباتات الاقتصادية وكما يأتي:.

Super Family : Aphidoidea

وتضم

- 1-) Family : Aphididae
 - 2-) Family : Eriosomatidae
- Super Family : Adelgoidea

وتضم

- 1-) Family : Adelgidae
- 2-) Family : Phylloxeridae

الاهمية النسبية لعائلات المن

الجدول (1-2) يوضح الاهمية النسبية لعائلات المن من خلال معرفة عدد الانواع الضارة المسجلة في الوطن العربي:

الجدول (1-2) عائلات المن وأقاربه وعدد الانواع المسجلة لكل عائله في الوطن العربي ونسبتها المئوية بالنسبة لمجموع انواعها

النسبة المئوية	عدد الانواع	أسم العائلة
94.5	174	Aphididae
2.7	5	Eriosomatidae
2.7	5	Phylloxeridae
0.54	1	Adelgidae
100	185	المجموع

مما سبق يتبين ان عائلة المن Aphididae تضم معظم انواع المن التي تهاجم النباتات الاقتصادية في الوطن العربي لذلك سيتم التركيز في هذا الفصل على الجوانب البيئية والحيوية المتعلقة بهذه العائلة فضلا عن اساليب مكافحتها.

Aphididae

عائله حشرات المن

Aphididae Characteristics

الصفات المميزة للعائلة

ان معظم الصفات المميزة لحشرات رتبة نصفية الاجنحة يمكن ان تنطبق على الانواع التابعة لهذه العائلة الا ان هذا لا يعني عدم وجود صفات مميزة لأنواع هذه العائلة تميزها عن بقية العائلات الحشرية وان من اهم الصفات المميزة لهذه العائلة ما يأتي:

(-1) حشراتا صغيرة الحجم يتراوح طولها بين 1-6 ملم وأحيانا ناعمة اللمس.

(-2) قد تكون مجنحة او عديمة الاجنحة حسب النوع والمرحلة من تاريخ الحياة.

(-3) الزوج الامامي من الاجنحة اعرض من الزوج الخلفي ويحويان إذا وجدا عددا قليلا من العروق.

4-) قرون الاستشعار فيها تتكون من عدد قليل من العقل عادة من 3-6 عقل.

5-) وجود زوج من التراكيب الانبوبية تدعى القرينات Cornicles على جانبي السطح العلوي للحلقة البطنية الخامسة، وقد تكون هذه التراكيب مختزلة او معدومة في بعض الأنواع.

6-) حشراتنا تنتج الندوة العسلية او الرضاب (Honeydeus) على فتحة الشرج وتفرز مواد شمعية من القرينات او الـCornicles.

تقسيم عائلة المن Aphididae Classification

تتباين اراء المصنفين كثيرا في تقسيم انواع عائلة المن الى مراتبها الأدنى، اذ ان بعض المصنفين يقول ان عائلة المن تضم عشرين تحت عائله، فيما مصنفون اخرون يقولون بوجود عشرة تحت عائله لعائلة Aphididae، فيما يشير اخرون الى ان عائلة المن Aphididae تضم ثمانية تحت عائلات هي:

- 1-) Sub Family : Aphidinae
- 2-)Sub Family :Calaphidinae
- 3-) Sub Family : Lachninae
- 4-) Sub Family : Chaitophorinae
- 5-) Sub Family : Greenideinae
- 6-) Sub Family : Eriosomatinae
- 7-)Sub Family : Hormaphidinae
- 8-) Sub Family : Anoeciinae

في التصنيف الاخير المعتمد من قبل نظام المعلومات التصنيفي المتكامل Taxonomic Information System Integrated (ITIS) تم رفع تحت عائلة Eriosomatinae الى عائلة Eriosomatidae وبذلك اصبحت عائلة المن تضم سبعة تحت عائلات فقط. ان اكبر تحت عائلة ضمن العائلة

Aphididae هي الـ Aphidinae ويليها تحت عائلة Calaphidinae ثم الـ Lachninae اذ ان 70% من انواع المن تعود لتحت عائلتي Aphidinae و Calaphidinae.

الانتشار Distribution

حشرات المن من الحشرات عالمية الانتشار اذ ان لكل منطقة من مناطق العالم مجموعة من انواع المن التي تهاجم المحاصيل المختلفة التي تزرع في تلك المنطقة الا أن الدراسات البيئية تشير الى ان انواع المن تكون اكثر تواجدا في المنطقة المعتدلة من العالم وبشكل اقل في المناطق الاستوائية وذلك على الرغم من ان التنوع النباتي في المناطق الاستوائية يكون اكبر وهذا يشير الى العلاقة العكسية ما بين اعداد انواع المن مع اعداد انواع النباتات في المناطق الاستوائية، وهذا يفسر سبب وفرة انواع حشرات المن في المناطق المعتدلة من العالم مقارنة بالمناطق الاستوائية، دراسات عديدة اشارت الى قدرة انواع المن الى التكيف السريع والاستمرار بالحياة عند نقلها من المناطق المعتدلة الى المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية، لابل انها تصبح افه في البيئة الجديدة نتيجة غياب اعدائها الحيوية واستقرار درجات الحرارة وفترة الاضاءة في المناطق الاستوائية، دراسات اخرى اظهرت ان الانواع المنقولة من المن تمكنت من استيطان المناطق الاستوائية ولها دورة حياه كاملة Holocyclic (تكاثر جنسيا وعذريا) هذا النوع من التكاثر يكون اكثر شيوعا في المناطق المعتدلة فيما يكون التكاثر العذري Anholocyclic هو الشائع في المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية. ان نجاح عملية انتقال المن من المناطق المعتدلة الى المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية واستقراره فيها يعني قدرة انواع المن

على الانتشار واجتياح بيئات جديدة طالما وجدت فيها عوائله الغذائية وهذا يفسر بالتأكيد الانتشار العالمي والواسع لحشرات المن.


المظهر الخارجي للمن Aphids External Morphology

حشرات صغيرة ذات اجسام رخوة طول بعضها اقل من مليمتر واحد فيما يصل طول اكبر انواعها من 5-6 مليمتر (الشكل 2-1) وجسم الحشرة كمثري الشكل عموما وذات ارجل وقرن استشعار جيدة النمو ويتكون قرن الاستشعار فيها من 3-6 عقل والقطعة الطرفية تكون ذات نهاية مستدقة بينما القطعتان او الحلقتان القاعديتان صغيرتان دائما اما الحلقات الوسطية فتختلف كثيرا بحسب نوع المن ولهذا تستعمل لغرض التمييز بين الانواع وفيما عدا القطعتين القاعديتين فان بقية القطع تحمل اعضاء حس تدعى بالحسيات Rhinaria او Sensoria وهي تختلف في العدد والشكل في انواع المن المختلفة. اجزاء فم المن الثاقبة الماصة، تكون بشكل خرطوم ذي أربع قطع يختلف بالطول حسب نوع المن، ففي البعض يكون اطول من الجسم خاصة في الانواع التي تتغذى على سيقان الاشجار.


للأشكال المجنحة من المن زوجان من الاجنحة الغشائية الرقيقة الشفافة مع عروق قليلة وبسيطة او متفرعة وذات نظام تعريق متميز، اما العرق الشعاعي Radius فهو متفرع في الجناح الامامي ويحد العرق الشعاعي الاول (R1) البقعة الغامقة من الجهة الخلفية، والجناح الامامي أكبر من الخلفي ويرتبط الجناحان على كل جهة بخطاطيف لتزيد من كفاءتها في الطيران وفي وضع الراحة تكون الاجنحة بشكل الجمelon، ولكنها في بعض الانواع تمتد افقيا فوق الجسم. (الشكل 2-2). ان ترجة او ظهر الحلقة البطنية الخامسة او السادسة

في معظم أنواع المن تحمل زوجا من التراكيب الانبوبية تسمى القرينات Cornicles او Siphunculi التي تختلف في الطول تبعا لنوع المن وتفرز مواد شبيهه بالشمع، ولا توجد القرينات في جميع أنواع المن، كما انها قد تكون صغيره جدا في بعض انواعه (الشكل 2-2 و 3-2).

حشرات نصفية الأجنحة الضارة بالنباتات الاقتصادية



الشكل (1-2): منظر ظهري وبطني لحشرة المن، تظهر فيه الأجزاء والتراكيب المختلفة المستخدمة للتمييز بين أنواع المن (مأخوذة عن Blackman و Eastop، 2006)



الشكل (2-2) منظر ظهري لأنثى ولودة غير مجنحة تمثل جنسين كبيرين


من الـ **Macrosiphini** تظهر فيها بعض الصفات المظهرية

حيث يظهر فيها توزيع الدريئات الشوكية الحافية.

Marginal Tubercle = MTu = الدريئات الحافية

Spinal Tubercle = Stu = الدريئات الشوكية

(مأخوذ عن Blackman و Eastop، 2006)



الشكل (2-3) جناح نموذجي لأنثى حشرة المن الولودة المجنحة (مأخوذ

عن Blackman و Eastop، 2006)

المصطلحات الخاصة بدورة حياة المن

Terms Related to Aphids Life Cycle

لحشرات المن نوع مميز من التكاثر يعرف بالتكاثر المتباين Heterogamy او التكاثر الدوري Cyclic Reproduction وذلك لأنه يتصف بتبادل عدة اجيال عذرية مع جيل تزاوجي، وتستخدم لعملية شرح دورة حياة المن العديد من المصطلحات المميزة التي يجب التعرف عليها قبل التطرق الى دورة حياة المن العامة.

(-1) Alienicola او الدخيلة: وتطلق على حشرات المن المهاجرة او تلك او التي تمارس انشطتها الحيوية على عوائل ثانوية تختلف عن العائل الرئيسي من حيث الموقع التصنيفي والبيئة التي يوجد فيها العائل

- الثانوي، وان اشكال المن الموجودة على العائل الثانوي تختلف في الغالب عن شكل المن الموجود على العائل الرئيسي.
- (-2) Fundatrix او الامهات الاساسية: في حشرات المن تطلق على الاناث غير المجنحة الناتجة من بيض التشتية في الربيع حيث تتكاثر لا عذريا وتضع ولادات جديدة وتتميز مورفولوجيا بصغر حجم العيون وزوائد الجسم.
- (-3) Fundatrices: انظر Fundatrix.
- (-4) Fundatrigenia او الامهات الاولية: في حشرات المن هي الاناث غير المجنحة التي تضع الولادات عذريا والتي تعيش على العائل الاولي والناتجة من الامهات الاساسية او Fundatrix.
- (-5) Migrant او المهاجر: شكل من اشكال المن الذي يمتاز بتكاثره الجنسي واللجنسي وخلالها يقوم بالهجرة من عائله الاولي الى العائل الثانوي.
- (-6) Stem mother او الامهات الأساسية: انظر Fundatrix.
- (-7) Sexuale او الاجيال الجنسية: هي المرحلة من دورة حياة المن التي تظهر فيها الافراد الجنسية (الذكور والاناث) التي تتزوج لوضع البيض وتختلف الانثى في هذه المرحلة عن الاناث الولودة بالتكاثر العذري
- (-8) Sexuparae او الاجيال البكرية او العذرية: مرحلة من دورة حياة المن التي تقوم خلالها الاناث العذرية بوضع ولادات انثوية بالتكاثر العذري على العائل الثانوي والتي ينتج عنها افراد مجنحة تهاجر الى العائل الاولي والتي بدورها تنتج افراد جنسية.

- 9- Primary viviparae او الامهات الاولية: انظر Fundatrigeniae.
- 10- Genoparae او الاجيال العذرية: انظر Sexuparae.
- 11- Holocyclic او دورة الحياة الكاملة: وتطلق على انواع المن التي تتكاثر جنسيا وعذريا.
- 12- Anholocyclic او دورة الحياة الغير كاملة: وتطلق على انواع المن التي تتكاثر عذريا فقط.
- 13- Heterogamy او التكاثر المتباين: في المن يقصد به التكاثر الكامل Holocyclic لانه يشمل التكاثر العذري والجنسي.
- 14- Cyclic reproduction او التكاثر الدوري: يستخدم لوصف دورة حياه المن التي + يتبادل فيها التكاثر الجنسي مع التكاثر العذري.
- 15- Viviparae alate او المجنحات العذرية: انظر Migrant.

دورة حياه المن Aphids Life Cycle

ان التكاثر في المن يمتاز بتبادل عدة اجيال عذرية مع جيل تزاوجي، كما يظهر ضمن الاجيال العذرية تبادل الاشكال المجنحة مع عديمة الاجنحة، فيما يكون التكاثر التزاوجي في بعض الحالات معقد جدا وتظهر اجزاء منه على عوائل نباتية مختلفة. ان دورة حياة المن تختلف بحسب النوع والبيئة التي يوجد فيها، وعلى العموم فهناك نوعين من دورة الحياة:

أولاً) دورة الحياه الكاملة **Holocyclic**:- هذه الدورة تشمل اكثر من طريقة للتكاثر واكثر من عائل واحد من العوائل النباتية عادة وتتعدد فيها الاشكال Polymorphism، ان دورة الحياة الكاملة شائعة بين انواع المن التي تعيش في المناطق الشمالية من العالم حيث يكون الشتاء قاسيا لا تستطيع حشرة


المن الرهيفة ان تتحمله الا اذا عاشت في اماكن محمية جدا كجذور بعض النباتات او ان تقضي الشتاء بطور البيضة التي تقاوم قساوة الشتاء بشكل افضل. في هذه الدورة تقوم الانثى الحقيقية True Oviparous بوضع البيض في اواخر الخريف وبداية الشتاء ثم تموت جميع الافراد الأخرى، البيض يوضع على نوع معين من العوائل النباتية يطلق عليها العائل الاولي Primary Host وهو عادة نوع من اشجار الفاكهة المتساقطة الأوراق، يجتاز البيض فترة الشتاء ليفقس في الربيع الى حوريات تتغذى وتنمو على العائل الاولي، وعندما تصل الى طورها الكامل تسمى الامهات الاساسية Stem mothers او Fundatrices ومفردها Fundatrix، تتكاثر الامهات الاساسية عذريا وتعطي اجيالا من المن عذرية التكاثر على العائل الاولي أيضا. يطلق على نسل الامهات الاساسية على العائل الاولي اسم الامهات او العذريات الاولية Primary viviparae او Fundatrigeniae، هذه الامهات الاولية يزداد عددها بكثرة وبسرعة كبيره جدا وتظهر اضرارها على النبات العائل بشكل واضح في الربيع وليست كل افراد المن الناتجة على العائل الاولي غير مجنحة بل قد تظهر بينها افراد مجنحة تزداد نسبتها كلما ازدحم المن على النبات العائل فتطير المجنحات الى نباتات اخرى من نفس نوع العائل الاولي، كما تزداد المجنحات بتقدم الاجيال نحو اواخر الربيع، حيث تهاجر هذه المجنحات ويطلق عليها اسم المهاجرات Migrants او المجنحات العذرية Vivipara alate من العائل الاولي الى عائل اخر يعرف بالعائل الثانوي Secondary Host. ان العائل النباتي الاولي والثانوي يختلفان كلياً عن بعضهما من الناحية التصنيفية والبيئية. بعد ان تستقر

المهاجرات المجنحات على العائل الثانوي تتغذى وتبدأ بالتكاثر العذري أيضاً، حيث تعطي حوريات غير مجنحة تتكاثر بدورها طيلة الصيف وجزء من الخريف وتسمى افراد كل هذه الاحيال بالعذريات الثانوية Secondary viviparae. في نهاية الخريف تظهر اناث مجنحة تسمى Sexuparae او Genoparae تطير الى العائل الاولي وهناك تتغذى وتلد على العائل الاولي لنتج اناثا بيوضة Oviparous وهي حشرات غير مجنحة تتزاوج مع ذكور تنشأ اما على العائل الثانوي وتطير الى العائل الاولي فتلقح الاناث البيوضة او تنشأ على العائل الاولي نفسه. (الشكل 2-4)

بعد تزواج الاناث البيوضة وتلقيحها تضع البيض على اغصان العائل الاولي في اباط البراعم وبأعداد قليلة، ثم تموت الاناث والذكور بعد ذلك بقليل، وتبقى البيوض لتمضي الشتاء في اماكنها المحمية وتعيد دورة الحياة. مما سبق يتبين ان دورة الحياة الكاملة تمر بنوعين من التكاثر العذري في الربيع والصيف ومعظم الخريف ثم تكاثر تزواجي جنسي في اواخر الخريف واوائل الشتاء ولذلك يطلق على هذه الظاهرة بتعاقب الاجيال Alternation of generation ان من اهم انواع المن ذو دورة الحياة الكاملة في العراق هو من المشمش *Hyalopterus pruni* ومن تجعد اوراق الخوخ *Brachycaudus amygdalinus*.

ثانياً دورة الحياه غير الكاملة **Anholocyclic**:- هذا النوع من التكاثر شائع في انواع المن التي تعيش في المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية وحتى المناطق المعتدلة التي لا يكون فيها الشتاء قاسياً وذلك لان باستطاعة حشرات المن ان تمضي الشتاء بشكل حشرات كاملة وحوريات، وقد يستمر تكاثرها في

الشتاء ولكن ببطى في الاماكن والزراعات المحمية، تعيش كل من هذه الانواع على نوع واحد او عدة انواع من النباتات وتتكاثر عليها عذريا فقط وله شكل او مظهر واحد او مظهران غير مجنح ومجنح. ان دورة الحياة غير الكاملة هي في الحقيقة جزء من الدورة الكاملة التي يظهر فيها تعاقب الاجيال (الشكل 2-4) ولكنها اختصرت لتلائم البيئة التي تعيش فيها هذه الانواع ومن امثلتها من القطن *Aphis gossypii* ومن الدفلة *Aphis nerii* وانواع اخرى كثيرة. ان كثيرا من انواع المن ذي دورة الحياة غير الكاملة يمكن ان يعيش دورة كاملة إذا انتشر في المناطق الباردة او إذا ربي في ظروف بيئية تشابه ظروف المناطق الباردة.



الشكل (2-4) مخطط لدورة الحياة لحشرة المن بنوعها الكامل

Holocyclic وغير الكامل Anholo cyclic

تعدد المظاهر Polymorphism: وهي على نوعين

أولاً) تعدد الأشكال Polymorphs:- وتعني ان هناك شكلين او اكثر من الأشكال او المظاهر ضمن سكان نفس النوع من المن. اما مصطلح الـ Polyphenism فتعني ايضا وجود اثنين او أكثر من الأشكال في الذرية الناتجة من نفس الانثى المتكاثرة عذريا حيث تكون الذرية الناتجة متماثلة وراثيا. ويسمى بالـ Clone (الشكل، 2-5).


ان ظاهرة تعدد الأشكال Polymorphism هي من الظواهر الاكثر شيوعا في حشرات المن خاصة تلك التي تمتلك دورة حياه كاملة Holocyclic حيث يكون للإناث فيها ما يقرب من ثمانية اشكال Phenotype مختلفة، هذه الأشكال تتباين فيما بينها بالعديد من الصفات منها:

- 1- المظهر الخارجي
- 2- اللون
- 3- وقت التكاثر
- 4- الوقت اللازم للنمو
- 5- اعداد واحجام الذرية الناتجة
- 6- تفضيل العائل الغذائي

ان تباين اشكال المن في الصفات السابقة لا يعود فقط للاختلافات الوراثية او الجينية ولكن ايضا لنوع العائل النباتي والظروف البيئية السائدة في المنطقة والتكرار الدوري المنتظم لتلك الظروف، لما لها من دور في وفرة ونوعية العصارة النباتية والتي تعد الاساس في تغذية حشرات المن، وعليه يمكن في هذه الحالة التنبؤ وبدرجة يمكن الاعتماد عليها في نمو وتطور انواع المن في المناطق ذات درجات الحرارة المعتدلة. ان للعوامل البيئية ونوع العائل النباتي وشكل المن تأثير في خصوبة حشرات المن، حيث وجد مثلا ان حاجة الأشكال المجنحة alate للطاقة من اجل نمو وتطور الاجنحة فان الوقت

حشرات نصفية الأجنحة الضارة بالنباتات الاقتصادية

اللازم لتطور ونمو هذه الأشكال يكون ابطاً وينعكس على انخفاض خصوبتها، مقارنة بالأشكال غير المجنحة، التي لا تحتاج الى استهلاك طاقتها في نمو الأجنحة بل تستفيد منها في انتاج الذرية. اضافة الى الأشكال المشار اليها في دورة حياة المن فان هناك شكل مثير للانتباه هو الجنود Soldiers وهي عبارة عن حوريات انثى وعادة توجد بنسب قليلة تشكل 1% من بين انواع المن المعروفة والتي تزيد على 4000 نوع، هذا الشكل



الشكل (2-5) 1: الام الاساسية Fundatrix للمن نوع *Periphyllus californiensis* 2: انثى ولودة عذرية غير مجنحة 3: انثى ولودة عذرية مجنحة 4: انثى ولودة مجنحة صغيرة 5: ربيعية 5: انثى صغيرة غير مجنحة ربيعية

اي الجنود غالبا ما توجد في بعض انواع المن الصانعة للأورام Gall Making Aphids حيث يقوم الجنود بالدفاع عن المستعمرة ضد المفترسات، والجنود كما اسلفنا هي حوريات انثى لا تتسلخ الى اناث بالغة تكاثرية ولا تستطيع انتاج الذرية. وظيفتها الأساسية هو مهاجمة الاعداء والموت دفاعا عن المستعمرة وتمتاز الجنود بأرجلها الامامية والوسطية المتغلظة التي تستخدمها في مسك الفريسة وسحقها، كما تمتلك قرونا امامية Frontal Hornes فضلا عن اجزاء الفم لاستخدامها كأسلحة في قتال العدو. ان انتاج الجنود يتم عن طريق الامهات المنتجة للحوريات الاعتيادية.

ثانياً تعدد الالوان **Polycolors**: - ان الالوان المميزة لأنواع المن قد ترجع الى

1- صبغات الجليد: وهي الصبغات ذات اللون البني او الاسود لجدار الجسم الـ Integument وعند تصلبه يعطي للحشرة اللون المعدني البراق **Metalic Shine**.

2- الصبغات الداخلية : وهي صبغات محتويات الجسم التي يمكن رؤيتها من خلال الكيوتكل ومنها الصبغات الملونة للأعضاء الداخلية والانسجة والهيمولييف، وهذه الصبغات تنتمي لمجموعة الـ **Arylglucosides** ومنها:

أ - صبغة الـ **Aphins**: هذه الصبغة تكسب جسم المن لونه الأسود، فالسائل الدموي لمن الباقلاء الاسود يحوي مجموعة افين اولي **Protoaphine** بني مصفر يصبح لونه بنفسجيا في المحلول القاعدي ويعد الموت يتحول الى مركب لا سكري اصفر لا صف هو الزانثوفين.

ب-) صبغة الـ Aphinins: وهو كلوكوسيد اخضر مزرق يتحول ايضا بسهولة الى مركب لا سكري وقد يوجد في السائل الدموي لوحده او متحدا مع الافين.

3-) الافرازات الشمعية Wax secretion: هذه الافرازات تطلقها الغدد الموجودة على الجسم والتي تعطي اللون المسحوقي الابيض او الرمادي للحشرة.

اما الاختلاف في ألوان افراد الذرية الناتجة من نفس الام Clone فهي عادة تأتي من الاختلافات في العوامل البيئية وخاصة درجات الحرارة ونقص الغذاء وخلوه من العناصر الغذائية الرئيسية وتجمع المن او تحشده، هذا التباين في اللون قد ينتهي مع عودة الظروف الطبيعية. ان مستعمرات بعض انواع المن قد تستخدم اللون كوسيلة تحذيرية Aposematic ضد الطيور او المفترسات الاخرى كما هو في من الدفلة *Aphis nerii* او من دغل الحليب حيث يكون لونها اصفر براق في حين تكون زوائد الجسم مثل القرون Cornicles والذنب Cauda ذات لون اسود، فيما تكون قرون الاستشعار والارجل معتمة.

المن والنمل Aphids and Ants

ان العلاقة التعايشية بين المن والنمل تعد من العلاقات المميزة والمألوفة، فحيثما نرى النمل متسلقا على النباتات فأننا نتوقع اصابة تلك النباتات بالمن. وتتخلص هذه العلاقة بحصول النمل على الغذاء الغني بالسكريات (الندوة العسلية) من المن بينما يقوم النمل بحماية المن من المفترسات والطفيليات التي يمكن ان تهاجمه، ليس جميع انواع المن وكذلك ليس جميع النمل يميل الى تكوين هذه العلاقة، كذلك فان حشرات المن المحبة للنمل

Myrmecophilous تختلف في درجة اعتمادها او تبعيتها للنمل. يمتاز المن المحب للنمل بان جميع انواعه تعيش فوق سطح الارض وتعيش بشكل تجمعات، كما يمتاز بألوانه الجذابة، فضلا عن افتقاره للتراكيب والوسائل الدفاعية اضافة الى افتقارها لسلوك الهرب عند اقتراب النمل واعدائها الطبيعية وذلك بسبب شعورها بالأمان كونها في حماية النمل.

يحصل النمل على حاجته من الندوة العسلية للمن اما عن طريق:

1- حلب المن او امتصاص الندوة Milking: وفي هذه الطريقة يقوم النمل بامتصاص الندوة العسلية الخارجة من فتحة شرح حشرات المن، حيث يقوم بالضرب الخفيف على نهاية بطن حشرة المن لتحفيزها على إطلاق الندوة العسلية، ويقوم النمل بهذه الطريقة دون اية اعاقاة او ازعاج لحشرات المن اثناء تغذيتها وبشكل طبيعي على عائلها النباتي.

2- إطلاق الندوة العسلية: في حشرات المن التي لا تميل الى مثل هذه العلاقة مع النمل، فان حشرات المن ترفع بطنها ومن ثم تقذف بقطرات الندوة العسلية لمسافة معينة ويعيدا عنها، لا بل ان بعض انواع المن تقوم باستخدام أرجلها الخلفية لدفع قطرات الندوة العسلية بعيدا عنها، لان وجود الندوة العسلية يعيق حركة حشرات المن.

مما سبق يتبين ان النمل يستفيد من الندوة العسلية كمصدر جيد للكاربوهيدرات وان حاجته للبروتين قد تدعوه احيانا الى افتراس بعض افراد المن، اما المن فيستفيد من حماية النمل له من الاعداء الحيوية ومن ازالته للندوة العسلية التي تعيق حركته.

الإضرار العامة للمن Aphids General Disadvantages

ان لحشرات المن كغيرها من الحشرات ذات اجزاء الفم الثاقبة الماصة تأثيرات ضاره مختلفة يمكن ملاحظتها على عوائلها النباتية المختلفة والتي يمكن اجمالها في النقاط الاتية:

أولاً) استنزاف العصارة النباتية وافراز الندوة العسلية Nutrient Drain

and Honey Dew - بعد استقرار المن على سطح الورقة النباتية واتخاذها

لوضع التغذية تبدأ بإفراز قطرات من لعاب هلامي القوام ثم يخترق الرمح طبقة البشرة بأجراء طعنات استكشافية Exploratory probes وقد وجد ان حشرة من الخوخ الاخضر *Myzus persicae* تتمكن من سحب ما يقرب من 10 مايكروليتر / ساعه من عصير النبات خلال الساعة الاولى من التغذية لتزداد الى 40 مايكروليتر / ساعه عند استمرار التغذية وهذا يعني نظريا ان كل حشرة تسحب لترا واحد من عصير النبات اذا تغذت لمدة 25 الف ساعه او ان كل 25 الف حشرة تسحب خلال ساعه من التغذية لترا من العصير النباتي. ان هذا الكم الكبير من السوائل الذي تمتصه حشرات المن يتطلب وجود تقنية معينة او تحورات غير عادية في المعى الاوسط هذا التحور يدعى بغرفة الترشيح Filter chamber والتي تتكون من اقتراب الجزء الامامي من المعدة مع مقدمة المعى الخلفي ويرتبطان معا بغلاف من نسيج ضام (الشكل 2-4) حيث يسمح هذا التركيب بمرور العصارة النباتية وما تحتويه من مواد كاربوهيدراتيه ذائبة وفائضه عن حاجة الحشرة حيث تنفذ مباشرة من مقدمة المعدة الى المعى الخلفي مباشرة، بينما تحتفظ المعدة بالمواد البروتينية والدهنية واحتياجاتها من المواد الكاربوهيدراتيه لكي تقوم بهضمها وامتصاصها

لتخرج بعد ذلك من فتحة الشرج بشكل عصارة سكرية نتيجة لعملية الترشيح سالفة الذكر والتي تعرف بالندوة العسلية Honey Dew وعليه فان غزارة الندوة العسلية تعتمد على مقدار ما يمتصه المن من العصارة النباتية وعلى الحالة الفسلجية للنبات. ان الندوة العسلية كما اسلفنا تسبب ضررا للنبات يتمثل في خفض عملية التركيب الضوئي للنبات وخفض انتاجية النبات كما ان سقوط الندوة العسلية على ما يوجد تحت الاشجار من معدات وسيارات احيانا قد يؤثر في الوانها ومع ذلك فان بعض الباحثين يعتقدون ان تغذية المن وتكوين الندوة العسلية مفيدة للنبات بشكل غير مباشر اذ ان تغذية المن تعمل على سحب السكريات الفائضة من النبات وخاصة السكر الثلاثي Melezitose الذي تستخدمه البكتيريا المثبتة للنيتروجين في التربة مما يؤدي الى زيادة اعداد هذه البكتيريا في التربة اسفل النباتات المصابة بالمن وبالتالي تجهيز النبات بالمزيد من النايتروجين لزيادة نمو النبات وجعله عصاريا فضلا عن ان الندوة العسلية تعد غذاء للعديد من انواع النمل.

ثانياً حقن السموم او التوكسينات Toxins injection :- ان السموم التي يطلقها او يفرزها المن مع لعابه اثناء التغذية على عوائله النباتية يستجيب لها النبات بردود افعال متباينة قسم منها يظهر بشكل تغييرات مورفولوجية تظهر على النبات بشكل مميز حيث يمكن استخدامها لتشخيص اصابة النبات بالمن و احيانا يستخدم لتمييز انواع المن ومن اهم هذه الاعراض ما يأتي:

1- التفاف الاوراق Leaf rolling حيث تؤدي تغذية بعض انواع المن على اعناق الاوراق مما يؤدي الى التفافها مثال ذلك من التفاف اوراق

الكمثرى الاحمر *Dysaphis pyri* ومن التفاف اوراق الكمثرى الاخضر *D.reaumuri* او قد تتغذى على حواف الاوراق وتسبب التفافها كما هو الحال في من التفاف اوراق الفستق.

(-2) تجعد الاوراق Leaf curl ان تغذية بعض انواع المن على عوائله النباتية ونتيجة حقنه لبعض السموم التي تعمل على تجعد اوراق النبات وتشوهها مثال ذلك من تجعد اوراق الخوخ *Brachycaudus amygdalinus* ومن الشبوي *Lipaphis erysimi* ومن تجعد حافات اوراق الفستق *Baizongia pistacia* وغيرها.

(-3) الاورام Galls وتكونها بعض انواع المن التي تسمى بـ من الاورام Gall aphids حيث يصنع هذا المن العديد من الاورام على الاوراق واعناق الاوراق وذلك من خلال التثبيط والتثبيبه Stimulation التي تحدثها التوكسينات اللعابية في اماكن تغذية المن، ان العقد او الاورام التي يصنعها المن على النبات هي عبارة عن نموات خارجية مجوفة على النبات Hollow outgrowth حيث تبدو كنموات غير اعتيادية او تشوهات وبالرغم من ان انواع قليلة من المن تصنع الاورام ومنها من اوراق القوغ الا ان شكل هذه الاورام غالبا ما تعد صفة لتمييز كل نوع من انواع المن. توفر الاورام الملجأ والحماية المناسبة من المفترسات والطفيليات كما تشكل الانسجة الداخلية للورم مصدر غذائي جيد للمن. ان تكون هذه الاورام كما أشرنا سابقا هي رد فعل انسجة النبات على تغذية المن وحقنه لبعض التوكسينات التي تعمل كمنظمات نمو نباتية تكون سببا في نشوء الاورام المغلقة.

ثالثاً) نقل الفايروسات النباتية **Plant Virus Transmission** :- تعد حشرات المن Aphids من اهم ناقلات فايروسات النبات، اذ بلغ عدد انواع المن المسجلة منها ما يقارب من 3740 نوعا وهي تنتمي جميعها الى فوق عائلة المن Aphidoidea وتعد العائلة Aphididae من اهم العائلات لأنها تضم اغلب انواع المن الناقلة للفايروسات وتبرز اهمية حشرات المن في نقل الفايروسات بانه من بين 600 نوع فايروسي منقول بناقلات لا فقارية فان ما يقرب من 50% تنتقل بحشرات المن. تقسم الفايروسات النباتية عموما الى مجموعتين اساسيتين حسب علاقتها مع المن وهما:

1- الفايروسات الدوارة **Circulative Viruse** :- حيث يقوم المن بالتقاط هذه الفايروسات اثناء التغذية على النباتات المصابة بالفايروس الذي يغزو جسم الحشرة بعد ذلك حيث يتضاعف داخل جسم الحشرة وذلك بعد فتره حضانة او كمون **Latent period** ويدخل الى الغدد اللعابية للحشرة وبذلك تصبح الحشرة ناقلة للفايروس عند تغذيتها على النباتات السليمة، ان خطورة هذا النوع من النقل يكمن في احتفاظ المن بالفايروس وبقدرته على النقل طوال حياته.

2- الفايروسات المحمولة بالرمح **Stylet borne viruses** :- هذه الفايروسات تنتقل او تحمل على اجزاء الفم اثناء تغذية المن على النبات المصاب بالفايروس هذا الفايروس يعتبر من الفايروسات غير الثابتة او الباقية على اجزاء الفم حيث يبقى لساعه واحدة او اقل من ذلك ومن ثم يختفي من المن الناقل. ان الجدول (2-2) يضم قائمة بأهم الفايروسات النباتية المنقولة وانواع المن الناقلة لها.

الجدول (2-2) انواع المن المسجلة في الوطن العربي والفايروسات

المنقولة بواسطتها

الأسماء الإنكليزية الشائعة للفايروس	الأسماء العربية الشائعة للفايروس	نوع المن
<p>Bean common mosaic virus (BMMV)</p> <p>Maize dwarf mosaic virus</p> <p>Bean yellow mosaic virus (BYMV)</p> <p>Broad bean severe chlorosis virus</p> <p>Broad bean wilt virus (MDMV)</p> <p>Fababean necrotic yellow virus (FBNYV)</p> <p>Milk vetch dwarf virus</p>	<p>فايروس الموزائيك العادي للفاصوليا</p> <p>فايروس موزائيك وتقرم الذرة</p> <p>فايروس الموزائيك الاصفر للفاصوليا</p> <p>فايروس الاصفرار الشديد للباقلء</p> <p>فايروس ذبول الباقلاء</p> <p>فايروس التماوت الأصفر للباقلء</p> <p>فايروس تقرم بقل الحليب</p>	<i>Acyrtosiphon pisum</i>
<p>Bean common mosaic virus (BMMV)</p> <p>Broad bean wilt virus</p> <p>Cowpea aphid-borne mosaic virus</p> <p>Fababean necrotic yellow virus (FBNYV)</p> <p>Subterranean clover stunt virus (SCSV)</p> <p>Maize dwarf mosaic virus (MDMV)</p> <p>Milk vetch dwarf virus</p> <p>Johnson grass mosaic virus (JMV)</p>	<p>فايروس الموزائيك العادي للفاصوليا</p> <p>فايروس ذبول الباقلاء</p> <p>فايروس موزائيك اللوبيا المحمول بالمن</p> <p>فايروس التماوت الأصفر للباقلء</p> <p>فايروس تقرم البرسيم تحت الأرضي</p> <p>فايروس موزائيك وتقرم الذرة</p> <p>فايروس تقرم البقل الحليبي</p> <p>فايروس موزائيك الحليان</p>	<i>Aphis craccivora</i>
<p>Bean common mosaic virus (BCMV)</p> <p>Bean yellow mosaic virus (BYMV)</p> <p>Broad bean wilt virus</p> <p>Broad bean mottle virus (BBMV)</p> <p>Broad bean V potyvirus</p>	<p>فايروس الموزائيك العادي للفاصوليا</p> <p>فايروس الموزائيك الأصفر للفاصوليا</p> <p>فايروس ذبول الباقلاء</p> <p>فايروس تبرقش الباقلاء</p> <p>فايروس الباقلاء "في"</p>	<i>Aphis fabae</i>

<p>Beet mosaic virus (BtMV) Beet yellows virus (BYV) Celery mosaic virus (CeMV) Cucumber mosaic virus (CMV) Dahlia mosaic virus (DMV) Narcissus mosaic virus (NMV) Onion yellow dwarf virus (OYDV) Potato virus Y (PVY) Primula mosaic virus (PrMV) Radish mosaic virus (RaMV)</p>	<p>فايروس موزائيك البنجر فايروس اصفرار البنجر فايروس موزائيك الكرفس فايروس موزائيك الخيار فايروس موزائيك الداليا فايروس موزائيك النرجس فايروس تقزم واصفرار البصل فايروس البطاطا واي فايروس موزائيك البريمولا فايروس موزائيك الفجل</p>	
<p>Celery mosaic virus (CeMV) Citrus enation-woody gall virus Citrus tristeza virus (CTV) Cowpea aphid-borne mosaic virus Cucumber mosaic virus (CMV) Iris mild mosaic virus (IMMV) Johnson grass mosaic virus (JMV) Lily symptomless virus (LSIV) Maize dwarf mosaic virus (MDMV) Subterranean clover stunt virus (SCSV)</p>	<p>فايروس موزائيك الكرفس فايروس العقد الخشبية والنموات الزائدة للحمضيات فايروس ترستيزا الحمضيات فايروس موزائيك اللوبيا المحمول بالمن فايروس موزائيك الخيار فايروس الموزائيك المعتدل للسوسن فايروس موزائيك الحلين فايروس الزنبق عديم الأعراض فايروس موزائيك وتقزم الذرة فايروس تقزم البرسيم تحت الأرضي</p>	<i>Aphis gossypii</i>
<p>Broad bean wilt virus Cucumber mosaic virus (CMV) Soybean mosaic virus (SMV) Potato leaf roll virus (PLRV) Potato aucuba mosaic virus (PAMV) Tobacco etch virus (TEV) Turnip mosaic virus (TuMV)</p>	<p>فايروس ذبول الباقلاء فايروس موزائيك الخيار فايروس موزائيك فول الصويا فايروس التفاف أوراق البطاطا فايروس موزائيك أوكيوبا البطاطا فايروس نقش التبغ فايروس موزائيك الشلغم</p>	<i>Aphis nasturtii</i>
<p>Beet mosaic virus (BtMV) Onion yellow dwarf virus (OYDV) Turnip mosaic virus (TuMV)</p>	<p>فايروس موزائيك البنجر فايروس تقزم واصفرار البصل فايروس موزائيك الشلغم</p>	<i>Aphis pomi</i>
<p>Celery mosaic virus (CeMV) Narcissus mosaic virus (NMV)</p>	<p>فايروس موزائيك الكرفس فايروس موزائيك النرجس</p>	<i>Aphis rumicis</i>

حشرات نصفية الأجنحة الضارة بالنباتات الاقتصادية

Bean common mosaic virus (BCMV) Citrus tristeza virus (CTV)	فايروس الموزائيك العادي للفاصوليا فايروس ترستيزا الحمضيات	<i>Aphis spiraecola</i>
Cucumber mosaic virus (CMV) Dahlia mosaic virus (DMV) Plum pox virus (PPV) Beet mild yellowing virus Tomato aspermy virus (TAV)	فايروس موزائيك الخيار فايروس موزائيك الداليا فايروس جذري الأجاص فايروس الاصفرار المعتدل للبنجر فايروس أسبرمي الطماطة	<i>Brachycaudushelichrysi</i>
Bean common mosaic virus (BCMV) Celery mosaic virus (CeMV) Cucumber mosaic virus (CMV) Maize dwarf mosaic virus (MDMV) Onion yellow dwarf virus (OYDV) Primula mosaic virus (PrMV) Radish mosaic virus (RaMV) Turnip mosaic virus (TuMV)	فايروس الموزائيك العادي للفاصوليا فايروس موزائيك الكرفس فايروس موزائيك الخيار فايروس موزائيك وتقرم الذرة فايروس تقرم واصفرار البصل فايروس موزائيك البريمولا فايروس موزائيك الفجل فايروس موزائيك الشلغم	<i>Brevicoryne brassicae</i>
Cucumber mosaic virus (CMV)	فايروس موزائيك الخيار	<i>Cryptomyzus korschelti</i>
Beet mosaic virus (BtMV) Cucumber mosaic virus (CMV)	فايروس موزائيك البنجر فايروس موزائيك الخيار	<i>Dactynotus cichoricola</i>
Onion yellow dwarf virus (OYDV)	فايروس تقرم واصفرار البصل	<i>Hyalopterus pruni</i>
Cucumber mosaic virus (CMV) Turnip mosaic virus (TuMV)	فايروس موزائيك الخيار فايروس موزائيك الشلغم	<i>Lipaphis erysimi</i>
Barley yellow dwarf virus (BYDV) Beet mosaic virus (BtMV) Maize dwarf mosaic virus (MDMV)	فايروس تقرم واصفرار الشعير فايروس موزائيك البنجر فايروس موزائيك وتقرم الذرة	<i>Macrosiphum avenae</i>
Bean yellow mosaic virus (BYMV) Beet mild yellowing virus (BMYV) Beet yellow stunt virus Black raspberry necrosis virus (BRNV) Broad bean wilt virus Chrysanthemum virus B	فايروس الموزائيك الأصفر للفاصوليا فايروس الاصفرار المعتدل للبنجر فايروس اصفرار وتقرم البنجر فايروس موت الرازبري الأسود فايروس ذبول الباقلاء فايروس الداودي "بي"	<i>Macrosiphum euphorbiae</i>

حشرات نصفية الأجنحة الضارة بالنباتات الاقتصادية

<p>Bean yellow mosaic virus (BYMV) Celery mosaic virus (CeMV) Narcissus mosaic virus (NMV) Onion yellow dwarf virus (OYDV)</p>	<p>فايروس الموزائيك الأصفر للفاصوليا فايروس موزائيك الكرفس فايروس موزائيك النرجس فايروس تقزم واصفرار البصل</p>	<p><i>Macrosiphum rosae</i></p>
<p>Chrysanthemum virus B</p>	<p>فايروس الداودي "بي"</p>	<p><i>Macrosiphoniella sanborni</i></p>
<p>Bean common mosaic virus (BCMV) Cauliflower mosaic virus (CaMV) Cucumber mosaic virus (CMV)</p>	<p>فايروس الموزائيك العادي للفاصوليا فايروس موزائيك القرنابيط فايروس موزائيك الخيار</p>	<p><i>Megoura viciae</i></p>
<p>Barley yellow dwarf virus (BYDV)</p>	<p>فايروس تقزم واصفرار الشعير</p>	<p><i>Metopolophium dirhodum</i></p>
<p>Dandelion yellow mosaic virus (DYMV) Beet mild yellowing virus (BMYV) Onion yellow dwarf virus (OYDV)</p>	<p>فايروس الموزائيك الأصفر للدانليون فايروس الاصفرار المعتدل للبنجر فايروس تقزم واصفرار البصل</p>	<p><i>Myzus ascalonicus</i></p>
<p>Narcissus mosaic virus (NMV) Onion yellow dwarf virus (OYDV)</p>	<p>فايروس موزائيك النرجس فايروس تقزم واصفرار البصل</p>	<p><i>Myzus cerasi</i></p>
<p>Dandelion yellow mosaic virus (DYMV)</p>	<p>فايروس الموزائيك الأصفر للدانليون</p>	<p><i>Myzus ornatus</i></p>
<p>Alfalfa mosaic virus (AMV) Artichoke latent virus (ArLV) Bean common mosaic virus (BCMV) Bean yellow mosaic virus (BYMV) Beet mild yellowing virus (BMYV) Beet mosaic virus (BtMV) Beet yellowstunt virus Beet yellows virus (BYV) Beet western yellows virus (BWYV) Broadbean wilt virus(BBWV)</p>	<p>فايروس موزائيك الجت فايروس الخرشوف الكامن فايروس الموزائيك العادي للفاصوليا فايروس الموزائيك الأصفر للفاصوليا فايروس الاصفرار المعتدل للبنجر فايروس موزائيك البنجر فايروس تقزم واصفرار البنجر فايروس اصفرار البنجر فايروس اصفرار البنجر الغربي فايروس ذبول الباقلاء</p>	<p><i>Myzus persicae</i></p>

Carnation etched ring virus	فايروس التنقر الحلقي لقرنفل
Carnation vein mottle virus (CVMoV)	فايروس تبرقش عروق القرنفل
Carnation necrotic fleck virus	فايروس الترقط التماوتي للقرنفل
Carnation yellow stripe virus (CYSV)	فايروس الاصفرار التخطيطي للقرنفل
Cauliflower mosaic virus (CaMV)	فايروس موزائيك القرنابيظ
Celery mosaic virus (CeMV)	فايروس موزائيك الكرفس
Chrysanthemum stunt viroid	فايرويد تقزم الداودي
Chrysanthemum virus B	فايروس الداودي "بي"
Citrus enation-woody gall virus	فايروس العقد الخشبية والنموات الزائدة للحمضيات
Cowpea aphid-borne mosaic virus	فايروس موزائيك اللوبيا المحمول بالمن
Cowpea mosaic virus (CpMV)	فايروس موزائيك اللوبيا
Cucumber mosaic virus (CMV)	فايروس موزائيك الخيار
Dahlia mosaic virus (DMV)	فايروس موزائيك الداليا
Datura distortion mosaic virus (DDMV)	فايروس موزائيك وتشوه الداتورة
Henbane mosaic virus (HBMV)	فايروس موزائيك البنج
Iris fulva mosaic virus (IFMV)	فايروس موزائيك سوسن الفلغا
Iris mild mosaic virus (IMMV)	فايروس الموزائيك المعتدل للسوسن
Johnson grass mosaic virus (JMV)	فايروس موزائيك الحليان
Lettuce mosaic virus (LMV)	فايروس موزائيك الخس
Lily symptomless virus (LSLV)	فايروس الزنبق عديم الأعراض
Maize dwarf mosaic virus (MDMV)	فايروس موزائيك وتقزم الذرة
Maize mosaic virus (MMV)	فايروس موزائيك الذرة
Onion yellow dwarf virus (OYDV)	فايروس تقزم واصفرار البصل
Ornithogalum mosaic virus (OrMV)	فايروس موزائيك الأورنيثوجالم
Pea enation mosaic virus (PEMV)	فايروس موزائيك وزوائد البزاليا
Potato aucuba mosaic virus (PAMV)	فايروس موزائيك أكيوب البطاطا
Potato leaf roll virus (PLRV)	فايروس التفاف أوراق البطاطا
Potato virus A (PVA)	فايروس البطاطا أي
Potato virus Y (PVY)	فايروس البطاطا واي

<p>Potato spindle tuber viroid Radish mosaic virus (RaMV) Soybean mosaic virus (SMV) Sunflower mosaic virus (SuMV) Sweet potato feathery mottle virus (SPFMV) Sweet potato mild mottle virus (SPMMV) Tobacco etch virus (TEV) Tomato aspermy virus (TAV) Tropaeolum mosaic virus (TrMV) Tulip breaking virus (TBV) Turnip mosaic virus (TuMV) Turnip yellow mosaic virus (TYMV) Watermelon mosaic virus (WMV) Dandelion yellow mosaic virus (DYMV)</p>	<p>فايروس الدرنة المغزلية للبطاطا فايروس موزائيك الفجل فايروس موزائيك فول الصويا فايروس موزائيك زهرة الشمس فايروس التبرقش الريشي للبطاطا الحلوة فايروس التبرقش المعتدل للبطاطا الحلوة فايروس نقش التبغ فايروس أسبرمي الطماطة فايروس موزائيك الترابولم فايروس الانفصال اللوني للتيولب فايروس موزائيك الشلغم فايروس الموزائيك الأصفر للشلغم فايروس موزائيك الرقي فايروس الموزائيك الأصفر للدانليون</p>	
<p>Bean yellow mosaic virus (BYMV) Strawberry crinkle virus (SCV) Strawberry mild yellow edge virus (SMYEV) Strawberry vein banding virus (SVBV) Tobacco mosaic virus (TMV)</p>	<p>فايروس الموزائيك الأصفر للفاصوليا فايروس تجعد الشليك فايروس الاصفرار المعتدل لحواف الشليك فايروس تحزم عروق الشليك فايروس موزائيك التبغ</p>	<p><i>Pentatrichopus fragaefolii</i></p>
<p>Hop mosaic virus (HpMV) Plum pox virus (PPV)</p>	<p>فايروس موزائيك الخشخاش فايروس جذري الأجاص</p>	<p><i>Phorodon humuli</i></p>
<p>Barley yellow dwarf virus (BYDV) Bean yellow mosaic virus (BYMV) Johnson grass mosaic virus (JMV) Maize dwarf mosaic virus (MDMV) Maize mosaic virus (MMV) Onion yellow dwarf virus (OYDV)</p>	<p>فايروس تقزم واصفرار الشعير فايروس الموزائيك الأصفر للفاصوليا فايروس موزائيك الحليان فايروس موزائيك وتقزم الذرة فايروس موزائيك الذرة فايروس تقزم واصفرار البصل</p>	<p><i>Ropalosiphon maidis</i></p>

Sugarcane mosaic virus (SCMV)	فايروس موزائيك قصب السكر	
Turnip mosaic virus (TuMV)	فايروس موزائيك الشلغم	<i>Ropalosiphon nymphaeae</i>
Barley yellow dwarf virus (BYDV) Beet mosaic virus (BtMV) Maize dwarf mosaic virus (MDMV)	فايروس تقزم واصفرار الشعير فايروس موزائيك البنجر فايروس موزائيك وتقزم الذرة	<i>Ropalosiphon padi</i>
Beet yellows virus (BYV) Cucumber mosaic virus (CMV) Potato leaf roll virus (PLRV)	فايروس اصفرار البنجر فايروس موزائيك الخيار فايروس التفاف أوراق البطاطا	<i>Ropalosiphoninus latysiphon</i>
Cauliflower mosaic virus (CaMV)	فايروس موزائيك القرنابيط	<i>Sappaphis mali</i>
Barley yellow dwarf virus (BYDV) Maize dwarf mosaic virus (MDMV) Sugarcane mosaic virus (SCMV)	فايروس تقزم واصفرار الشعير فايروس موزائيك وتقزم الذرة فايروس موزائيك قصب السكر	<i>Schizaphis graminum</i>
Barley yellow dwarf virus (BYDV) Beet mosaic virus (BtMV) Maize dwarf mosaic virus (MDMV)	فايروس تقزم واصفرار الشعير فايروس موزائيك البنجر فايروس موزائيك وتقزم الذرة	<i>Sitobion avenae</i>
Barley yellow dwarf virus (BYDV)	فايروس تقزم واصفرار الشعير	<i>Shhizaphis graminum</i>
Maize dwarf mosaic virus (MDMV)	فايروس موزائيك وتقزم الذرة	<i>Therioaphis maculate</i>
Citrus tristeza virus (CTV)	فايروس ترستيزا الحمضيات	<i>Toxoptera aurantii</i>

انواع حشرات المن من عائلة Aphididae في الوطن العربي

ان الجدول (2-3) يضم الاسماء العلمية لأنواع المن التابعة لعائلة Aphididae المنتشرة في الوطن العربي مع اسماءها الشائعة.

الجدول (2-3) انواع المن المسجلة في الوطن العربي واسماؤها العربية الشائعة.

الاسماء العلمية للمن	الاسماء العربية الشائعة للمن
<i>Acyrtosiphon pisum</i> (Harris), 1776	ارقه البسله، من البازلآء، من البازلآء الأخضر، من البزاليا، من البسله، من البقوليات، من الجت، من الجت الاخضر، من الماش، منه البازلآء
<i>Acyryhosiphon scariolae</i> Mevsky·1929	من ام الحليب، من الخس، من الشبوي الليلي، من المرير
<i>Acyrtosiphon sesbaniae</i> David·1956	من الحلبة
<i>Anoecia corni</i> (Fabricius)·(1775)	من الجذور
<i>Anuraphis cardui</i> (Linnaeus)·(1758)	ارقة الشوك، من الشوك
<i>Anuraphis maidiradicis</i> (Forbes·1891)	من جذور الذرة الصفراء
<i>Aphis affinis</i> Del Guercio 1911	من النعناع.
<i>Aphis citricola</i> Vam der Goot·1912	من الحمضيات الاخضر
<i>Aphis compositellae</i> (Theobald)·(1924)	من الحرشوف، من الكزانيا، من الكلغان او الكسوب، من عنيب الذنب
<i>Aphis craccivora</i> Koch·1854	ارقه ملتهمة، من ام الحليب، من الباقلاء، من البربين، من البقول، من البقوليات، من البقوليات الاسود، من البقوليات الافريقي، من البقوليات الاوروبي، من الجت، من الجهنمية، من الحميض، من الذرة الصفراء، من الرغل، من السوس، من السيسم، من الطماطة، من العدس، من الفاصوليا، من القرع او الشجر، من القطن، من الكهيه، من اللوبيا، من المرير، من النارج، من ورد المكانس، منه الفول السوداني.
<i>Aphis durantae</i> Theobald·1924	من الدورنتا، من الرمان، من الرمان الشائع
<i>Aphis Fabae</i> scopoli· 1763	ارقه الباقلاء، ارقه الفول، من البابونك، من الباقلاء، من الباقلاء الاسود، من البقوليات، من البنجر السكري، من الجعفري، من الحكيك، من الحميض، من حي علم، من الخباز، من الخردل، من الخرشوف، من الخشخاش، من الخيار، من الخيزران، من الدردير، من الرغل، من الرمث، من السلجم او الكلم، من السلق البري، من السيسم، من الشوندر الاسود، من

حشرات نصفية الأجنحة الضارة بالنباتات الاقتصادية

	الطماطه، من عرف الديك، من الفول، من الفول الاسود، من الكرفس، من الكلغان او الكسوب، من كيس الراعي، من اللوبيا، من المعدنوس، منة اللوبيا السوداء.
<i>Aphis ficus</i> Theobald, 1922	من التين
<i>Aphis forbesi</i> Weed, 1889	من جذور الفراولة، من جذور الفريز
<i>Aphis gossypii</i> Glover, 1877	ارقه القطن من اوراق البقوليات، من الباقلاء، من الباميا، من البربين، من البرسيم، من البصل، من البطيخ، من البنجر السكري، من التفاح، من الجت، من الختمه، من الخيار، من الدردير، من الدفلة، من الرقي، من الرمان، من الفاصوليا، من الفلفل، من القوون، من القرع او الشجر، من القرنفل، من القطن، من الكمثرى، من اللفت او الشلغم، من النعناع، منه البطيخ والقطن، الندوة العسلية.
<i>Aphis grossulariae</i> Kaltenbach, 1843	من الكشمش الشانك، منة الكشمش الشانك.
<i>Aphis idaei</i> van der Goot, 1912	من توت العليق
<i>Aphis illinoisensis</i> Shimer, 1866	من العنب، من الكروم
<i>Aphis intypi</i> Koch, 1854	من الشيح
<i>Aphis laburni</i> Kaltenbach, 1843	ارقة البقوليات، من البقوليات، من البقوليات الاوروبي.
<i>Aphis leguminosae</i> Theobald, 1915	من التفاح، من التفاح الأخضر
<i>Aphis malvae</i> Mosley, 1814	ارقة الخبازي، من الخبازي.
<i>Aphis mathiolae</i> Theobald, 1924	من الفجل
<i>Aphis nasturtii</i> Kaltenbach, 1843	من الحميض، من السدر، من النبق، من النبق والبطاطا
<i>Aphis nerii</i> Boyer de fonscolombe, 1841	من الحلباب، من الدفله، من الديباج، من المرجاني
<i>Aphis papaveris</i> Fabricius, 1781	ارقة الخشخاش، من الخشخاش.
<i>Aphis pomi</i> De Geer, 1773	المن الاخضر، من التفاح، من التفاح الاخضر، منة التفاح الاخضر
<i>Aphis punicae</i>	ارقة الرمان، من الرمان

حشرات نصفية الأجنحة الضارة بالنباتات الاقتصادية

Passerini, 1863	
<i>Aphis ruborum</i> Borner, 1932	من العلقة.
<i>Aphis rumicis</i> Linnaeus, 1758	ارقة الحماض، من الحماض، من الكلغان او الكسوب.
<i>Aphis salsolae</i> Borner, 1940	من ورد المكائس
<i>Aphis Schneideri</i> Borner, 1940	المن الدائم على الكشمش
<i>Aphis solanella</i> Theobald, 1914	من الباقلاء، من البنجر السكري، من الخشخاش، من الذرة الصفراء، من السبانخ، من عينب الذئب، من القرع او الشجر، من المعدنوس.
<i>Aphis Spiraecola</i> patch, 1914	من التفاح والحمضيات، من الحمضيات الاخضر
<i>Aphis verbasci</i> Schrank, 1801	من الحسج، من الحكيك.
<i>Aploneura lentisci</i> Passerini, 1856	من اوراق الفستق الحلبي، من الجذور، من جذور القمح.
<i>Asiphonella dactylonii</i> Theobald, 1923	من الجذور.
<i>Baizongia pistaciae</i> Linnaeus, 1767	من اوراق الفستق الحلبي، من تدرن اوراق البطم، من تدرن اوراق الفستق، من تدرن اوراق الفستق الحلبي، من حبة الخضراء.
<i>Brachycaudus amygdalinus</i> Schouteden, 1905	من تجعد اوراق الخوخ، من تجعد اوراق اللوز، من الخوخ، المن الذهبي، من اللوز، من اللوز الذهبي، من اللوز ذو الذئب القصير
<i>Brachycaudus helichrysi</i> Kaltenbach, 1843	من التفاف اوراق الخوخ، من تجعد اوراق الخوخ، من الخرشوف، من الخرشوف الهليكييزي، من الدردير، من عباد الشمس، من لفاف ورق البرقوق، من لفاف ورق الخوخ، من نبات زهره الشمس، المنة المجعدة لاوراق الخوخ.
<i>Brachycaudus masseei</i> Theobald, 1924	من الخوخ الاسود.
<i>Brachycaudus persicae</i> Passerini, 1860	من الخوخ الاسود، من الدراق الأسود
<i>Brachycaudus heraclei</i> Takahashi, 1961	من الكرفس.
<i>Brachycorynella asparagi</i> Mordvelko, 1929	من الاسبراجس، من الهليون
<i>Brachyunguis harmalae</i>	من الحرمل، من الطماطة

Das, 1918	
<i>Barachyunguis tamaricis</i> Lichtenstini, 1885	من الاثل.
<i>Brevicoryne brassicae</i> Linnaeus, 1758	ارقة الكرنب، من ابو رقية، من الخردل، من الخردل البري، من الصليبيات، من الطماطة، من الفجل، من القرنايط، من الكرنب، من اللفت او الشلغم، من اللهانة، من الملفوف، منة الكرنب او الملفوف.
<i>Callaphis juglandis</i> Goeze, 1778	من الجوز غامق الاجنحة، من الجوز الكبير، من الجوز المغبر العروق، من عروق اوراق الجوز.
<i>Cavariella aegopodii</i> Scopoli, 1763	من الجزر والصفصاف.
<i>Cavariella konoi</i> Takahashi, 1939	من الكرفس.
<i>Cavariella pastinacea</i> Linnaeus, 1758	من الجزر البري.
<i>Chaitophorus elaeagni</i> Del Guericco, 1894	من الخرشوف.
<i>Chaitophorus euphraticus</i> Borner, 1940	من الغرب.
<i>Chaitophorus populiabae</i> Boyer de Fonscolombe, 1841	من اوراق الحور
<i>Chaitophorus sp.</i>	من الحلباب، من الصفصاف
<i>Chaitophorus versicolor</i> Koch, 1854	من اوراق القوغ، من الغرب
<i>Chaitosiphon fragaefolii</i> Cockerell, 1901	
<i>Chromaphis cynarae</i> Theobald, 1915	من الخرشوف السيناري، من السنانير.
<i>Chromapis juglandicola</i> Kaltenbach, 1843	من اشجار الجوز، من اوراق الجوز، من اوراق الجوز الاصفر، من الجوز، من الجوز الاوروبي، من الزعرور.
<i>Cinara brauni</i> Borner, 1940	من الصنوبر.
<i>Cinara cedri</i> Mimeur, 1936	من الارز.
<i>Cinara cupressi</i> Buckton, 1881	من السرو، من العفص.
<i>Cinara maritimae</i> Dafour, 1833	من الصنوبر.

حشرات نصفية الأجنحة الضارة بالنباتات الاقتصادية

<i>Cinara palaestinensis</i> Hille Ris Lambers, 1948	من الصنوبر الفلسطيني.
<i>Cinara pinea</i> Mordvilko, 1890	من الشوح
<i>Cinara pinicola</i> Kaltenbach, 1843	من الصنوبر.
<i>Cinara tujafilina</i> Del Guercio, 1909	من اغصان العفص، من الثويا، من العفص.
<i>Clypeoaphis suaedae</i> Mimeur, 1934	من الطرطبع، من ورد المكائس.
<i>Coloradoa campestris</i> Borne, 1939	من الشيح.
<i>Cryptomyzus galeopsidis</i> Kaltenbach, 1843	من الكشمش الاسود، من الكشمش الاسود.
<i>Cryptomyzus ribis</i> Linnaeus, 1758	من الزبيب، منة بثور الكشمش الاحمر.
<i>Dactynotus carthami</i> Hille Ris Lambers, 1948	من العصفر.
<i>Dactynotus cichorii</i> Hille Ris Lambers, 1939	من الخس.
<i>Dactynotus sonchi</i> Linnaeus, 1758	من ام الحليب، من الخس، من الزرباخ، من العصفر، من الكلغان، من الكلغان او الكسوب، من المريخ.
<i>Diuraphis noxia</i> Mordvilko, 1890	من الحنطة، من الحنطة الروسي، من الحنطة السام.
<i>Dirurapis tritici</i> Gillette, 1911	من القمح العربي.
<i>Dysaphis apiifolia</i> Theobald, 1923	من البقدونس، من المعدنوس.
<i>Dysaphis cratagei</i> Kaltenbach, 1843	من الجذور، من جذور الباقلاء
<i>Dysaphis devector</i> Walker, 1849	المن الوردي المجعد الزرق
<i>Dysaphis foeniculus</i> Theobald, 1923	من الكرفس.
<i>Dysaphis palntaginea</i> Passerini, 1860	من التفاح. من التفاح الوردي، المن الرمادي، من الورد.
<i>Dysaphis pyri</i> Boyer de Fonscolombe, 1841	ارقه الكمثرى، من الاجاص، من الاجاص الوردي، من التفاف اوراق التفاح الاحمر، من التفاف اوراق الكمثرى الاحمر، من الجرب الاحمر، من الكمثرى.

حشرات نصفية الأجنحة الضارة بالنباتات الاقتصادية

<i>Dysaphis reaumuri</i> Mordvilko, 1928	من التفاف اوراق التفاح الاخضر، من التفاف اوراق الكمثرى الاخضر.
<i>Dysaphis tulipae</i> Boyer de Fonscolombe, 1841	من ابصال اوليب، من ابصال الخزامي، من الجذور.
<i>Eriosoma americanum</i> Riley, 1879	من شجر الردار الزغبي، من شجر الدردار الصوفي.
<i>Eriosoma lanigerum</i> Hausmann, 1802	ارقه التفاح القطنيه، ارقه قطنيه، من التفاح، من التفاح الزغبي، من التفاح الصوفي، من التفاح الصوفية، من التفاح القطني، من الجذور، من القطني.
<i>Erisoma lanuginosum</i> Hartig, 1839	من شجر الألم
<i>Erisoma pyricola</i> Baker & Davidson, 1916	من الاجاص الزغبي، من الاجاص الصوفي، من الكمثرى الصوفي.
<i>Erisoma ulmi</i> Linnaeus, 1758	من شجر الالم
<i>Eucarazzia elegans</i> Ferrari, 1872	من النعناع.
<i>Eucarazzie picta</i> Del Guercio, 1921	من النعناع.
<i>Eulachnus rileyi</i> Williams, 1911	من الصنوبر.
<i>Ealachnus tuberculostemmatus</i> Theobald, 1915	من الصنوبر.
<i>Forda follicularia</i> passerine, 1856	من اوراق الفستق الحلبي.
<i>Forda formicaria</i> Van Heyden, 1837	من اوراق الفستق الحلبي، من حبه الخضراء.
<i>Forda hisuta</i> Mordivilko, 1928	من حبه الخضراء.
<i>Geoica lucifuga</i> Zehntner, 1897	من الجذور.
<i>Geoica phaseoli</i> passerine, 1856	من الجذور.
<i>Geoica utricularia</i> passerine, 1856	من اوراق الفستق الحلبي، من حبه الخضراء
<i>Hyalopterus amygdali</i> Blanchard, 1840	من الخوخ المسكي، من المشمش، من المشمش الدقيقي.

<i>Hyalopterus amygdali</i> Btanchard, 1840	من الخوخ المسكي، من المشمش، من المشمش الدقيقي.
<i>Hyalopterus pruni</i> Geoffroy, 1762	من اوراق الاجاص، من اوراق المشمش، من البرقوق الدقيقي، من البرقوق الدقيقي الشاحب، من الخوخ، من الخوخ الدقيقي، من الخوخ المغير، من الخوخ المغبره، من العنجاص، من العنجاص الدقيقي، من القصب، من الكرز، من الكوجه، من اللوز، من المشمش، منة الخوخ المغبره، منة الدراق الطويله الذيل الصينييه.
<i>Hydaphis coriandari</i> Das, 1918	من البتسبوم.
<i>Hysteroneura setariae</i> Thomas, 1878	من الخوخ الصدىء.
<i>Kaltenbachiella pallida</i> Haliday, 1838	من الجذور، من شجرة الالم.
<i>Lipaphis erysimi</i> Kaltenbach, 1843	من البنجر السكري، من الجعفري، من الخردل، من الخردل البري، من الشبوي، من الشلغم، من الطماطة، من الفجل، من اللفت او الشلغم، منة اللفت.
<i>Lipaphis lepidii</i> Nevsky, 1929	من الجنبره.
<i>Longiunguis donacis</i> Passerini, 1856	من القصب.
<i>Longiunguis sacchari</i> Zehntner, 1897	من الذره البيضاء، من قصب السكر.
<i>Macrosiphoniella sanborni</i> Gillette, 1908	من الاراولا، من الاقحوان، من الداودي، من الكرايزنثيمم
<i>Macrosiphum albifrons</i> Essig, 1911.	من الترمس.
<i>Macrosiphum avenae</i> Fabricius, 1775	المن الاخضر، من الجزر، من الحبوب، من الحبوب الانكليزي، من الرز، من الغلال الانكليزي
<i>Macrosiphum euphorbiae</i> Thomas, 1878	من البطاطا، من البطاطس، من البندورة الاخضر، من فول الصويا
<i>Macrosiphum lillii</i> Monell, 1897	من الزنبق بنفسجي البقع، من السوسن
<i>Macrosiphum liriodendra</i> Monell, 1897	من شجر التبولب
<i>Macrosiphum onobrychis</i> Boyer de Fonscolombe, 1841	من الجت الاخضر، من اللوبيا الاخضر

<i>Macrosiphum rosae</i> Linnaeus, 1758	ارقه عساليج الورد، ارقه ورق الورد، من الورد.
<i>Macrosiphum rosaefolium</i> Theobald, 1915	من الورد.
<i>Macrosiphum solidaginis</i> Fabricius, 1781	من القرطم
<i>Megoura viciae</i> Buckton, 1876	من البقوليات، من البيقيه
<i>Melancallis caryaefoliae</i> Davis, 1910	من البقان الاسود
<i>Metapotophium dirhodum</i> Walker, 1850	من الحبوب والورد، من الحبوب الوردية، من العشب
<i>Micromyzus violae</i> Pergande, 1900	ارقه البنفسج
<i>Myzocallis coryli</i> Goeze, 1778	من البندق
<i>Myzus ascalonicus</i> Doncaster, 1946	من الكراث
<i>Myzus cerasi</i> Fabricius, 1775	من الكرز

أنواع المن من عائلة Aphididae الاكثر شيوعا

The most common Aphididae Species

بالرغم من وجود أكثر من 170 نوع من المن التابع لعائلة الـ Aphididae الا ان هناك عدة انواع تعد الاكثر شيوعا في العراق والوطن العربي وهي:

اولا) من القطن *Aphis gossypii* Glover

الانتشار:- ينتشر في معظم الاقطار شبه الاستوائية والمعتدلة، ففي نصف الكرة الغربي يوجد هذا المن في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وجزر الهند الغربية والبرازيل وجزر هاواي واستراليا، اما في الجهة الاخرى من الكرة الارضية فيوجد في الصين واليابان وفرموزة والهند وجاوه والاتحاد السوفييتي

اما في منطقة البحر المتوسط فينتشر في فرنسا وايطاليا وتركيا وقبرص كما يوجد في مصر وفلسطين والاردن والمغرب ولبنان والعراق.

العوائل:- متعدد العوائل جدا ولذلك يصعب درج اسماء نباتات العوائل كلها هنا ولكن يمكن ذكر بعضها مثل البطيخ والرقي والخيار والطماطة والقطن والياميا والبادنجان والبطاطا والسّمسم والبنجر السكري والهلين والثوم والذرة الصفراء وغيرها ومن اشجار الفاكهة يصيب الكثير منها كالرمان والحمضيات واللوز وغيرها.

الضرر والاهمية الاقتصادية:- يعيش المن معيشه تجمعية تضم الالاف منها في مختلف اطوار حياتها من حوريات حديثه الولادة الى كاملات، ويتغذى المن بامتصاص عصارة النبات من الاوراق وبذلك يضعف العائل كما تتجدد اوراقه ويتوقف مقدار الضرر على اعداد المن على النبات الواحد. ويمكن ملاحظة اضرار هذه الحشرات بالنقص الواضح في الاثمار او الحاصل بصورة عامة. وعندما تكون اعداده كبيره فان النبات ينكمش ويموت كما يحصل في الرقي مثلا وهو يصيب القطن في اول نموه عند الاسبوع الاول من نيسان حيث يتغذى على الاوراق الفلقيه قبل ظهورها فوق سطح التربة ومن ثم على الاوراق الحقيقية وذلك بامتصاص العصارة النباتية منها فتتجدد ويتأخر نمو النبات. يختفي هذا المن بارتفاع درجة الحرارة خلال الاسبوع الاول من ايار ثم يظهر ثانيه في الخريف وأحيانا تستمر اصابته للقطن طول الموسم.

تاريخ الحياه والوصف:- يتكاثر هذا النوع من المن عذريا (لم تعرف لحد الان الافراد التزاوجيه) بصورة مستمرة طالما تساعد الظروف البيئية على ذلك وتستغرق فترة نمو الانثى منذ ولادتها حتى انتاجها الصغار فترة قصيرة جدا،

ففي درجة الحرارة (28-30) م تستغرق هذه الفترة اربعة ايام فقط، وفي اوائل الخريف عندما تكون درجة الحرارة (25-28) م فان المدة اللازمة لنمو لإكمال الانثى هي (10-12) يوما.

تستمر الانثى في انتاج الصغار الى فتره ايام قليله قبل ان تموت وتتراوح فترة التكاثر بين (30-40) يوما وان حوالي ثلثي المن ينتج مجموع (50-100) حورية للأنثى الواحدة و15% منه يضع (100-150) حورية للأنثى الواحدة، ولذلك فان عدد الاجيال كبير جدا ومتواصلة فقد تصل الى (60) جيلا في السنة. طول الانثى غير المجنحة (1.8) ملم وعرض البطن (0.9) ملم واللون اصفر مخضر او رصاصي مخضر او اخضر غامق الى اسود مخضر، الرأس مستدير طوله بقدر عرضه والعيون بنيه غامقة. قرون الاستشعار تخرج من هامة الرأس مباشرة دون وجود نتوءات ترتكز عليها، فهي أقصر من الجسم فلا تصل الى قواعد القرون البطنية. المصدر الاول قصير جدا. البطن لينه وناعمه ولهما نتوءات جانبية وقد تحمل البطن بقع بنيه على ظهرها. طول القرنين البطنيين 0.14 - 0.23 من طول الجسم وكل منهما اطول من الحلقة الثالثة في قرن الاستشعار. الذنب 0.4-0.8 من طول القرينة ولونه غامق.

الانثى المجنحة طولها أقصر من عديمة الجناح فهو 1.35 ملميترا وعرض البطن (0.65) ملميترا والمسافة بين طرفي الجناحين الاماميين وهما منبسطان (5.1) ملميترا. الرأس اعرض من طوله.

ثانيا) من الخوخ الاخضر *Myzus persicae* Sulzer

الانتشار:- هذه الافه واسعه الانتشار في اوربا واسيا والبلاد العربية ومنها العراق .

العوائل:- حشره من الخوخ متعددة العوائل جدا Polyphagous وهو ينتقل من عائل لأخر خلال موسم النمو. فقد ذكر وجود 400 نوع من النباتات ضمن 200 جنس كعوائل نباتيه لهذا النوع من المن.

الضرر والاهمية الاقتصادية:- ان هذه الحشرة وان كانت قادرة على انتاج اعداد سكانيه هائلة الا انه بسبب الظروف البيئية السائدة نادرا ما ينمو سكانها الى درجة كبيرة ومع هذا فان ضررها الرئيسي يتأتى من نقلها للعديد من امراض الفايروسات النباتية لبعض المحاصيل المهمة ومنها التبغ والبطاطا والبادنجان والطماطه والفلفل وبعض محاصيل الخضر الاخرى والادغال ولولا نقلها لهذه الامراض لما تطلب من الخوخ الاخضر ايه اجراءات مكافحة.

تاريخ الحياه والوصف:- يختلف تاريخ الحياه بحسب المنطقة، ففي اوربا والمناطق ذات الشتاء القاسي يتكاثر المن على عوائله الصيفية عذريا لعدة اجيال وفي الخريف وقرب بداية الشتاء تظهر الافراد التزاوجية او الاناث المسماة Ginoparae ثم الذكور وكلاهما مجنحة فتطير الى العائل الشتوي عادة في اشجار الخوخ واهيانا اشجار اللوز والكرز والعنجااص حيث تتكاثر هذه الاناث عذريا منتجة الاناث البيوضة Oviparae التي تتزاوج عندما يكمل نموها مع الذكور التي سبق ذكرها والتي تكونت على العوائل الصيفية وهاجرت ايضا الى الخوخ ثم تضع بيضا في اباط براعم الخوخ خاصه على الاغصان الرفيعة. تضع الانثى الواحدة عددا قليلا من البيض (4-6) عادة وهذا البيض هو الذي يمضي الشتاء اما الحشرات الكاملة فتموت عندما يشتد البرد.

تتميز هذه الحشرة بان قرون استشعارها يحملان على تنوعين في الرأس بارزين يميلان لبعضهما ويتكون بينهما انخفاض عميق في مقدمة الرأس. ان الانثى عديمة الاجنحة العذرية خضراء اللون او مصفرة ذات طول (2.3-2.4) ملميترا. طول قرن الاستشعار أقصر قليلا من طول الجسم، وتكون فيها القطعة الأخيرة وقرينا البطن Cornicles خضراء اللون فيهما تضخم ضئيل جدا في الوسط والذنب البطني Cauda ذات لون أغمق قليلا من لون بقية الجسم وأقصر قليلا من زائدتي البطن. قرينا البطن Cornicles طويلان نسبيا. يحمل الذنب ثلاثة ازواج من الشعيرات في نهايته الخلفية قد يظهر على ظهر الحشرة طوليا خط وسطي واحد وخطان جانبيين بنية اللون. اما الانثى المجنحة العذرية فهي حوالي 2.3 ملم ذات رأس و صدر اسود لامع اما بطنها فأخضر زيتوني لامع عدا بقعه غامقة على الحلقات البطنية (3-6) مع نقاط وخطوط عرضيه غامقة مبعثرة على الجسم. تكون زائدتا البطن في الانثى العذرية المجنحة أقصر مما في غير المجنحة ولونهما اسود الى بني ومنتفخان قليلا في الوسط ايضا. قرنا الاستشعار غامقا اللون اما سوداوان او بنيا اللون وطول قرن الاستشعار بقدر طول الجسم. الذنب غامق وحوالي ثلثي طول القرينين البطنين. اما البيض فهو اخضر عند وضعه ثم يتحول الى الاسود وهو متطاوول ومغطى بزغب خفيف. وفي الربيع عندما تأخذ اوراق الاشجار في الظهور يفسق البيض الى حوريات صغيرة تنتقل الى الاوراق الصغيرة وهي لم تتفتح بعد للتغذي عليها. هذه الحوريات تنمو وتصبح اناثا غير مجنحة تدعي الامهات الأساسية Stem mother or Fundatrices التي تتكاثر عذريا لعدة اجيال غير مجنحة ثم الى عدة اجيال عذرية اخرى

ولكن يغلب عليها الافراد المجنحة التي تطير الى العوائل الصيفية تدريجيا ابتداء من منتصف الربيع. وتضم هذه العوائل الصيفية محاصيل وادغالا تقع معظمها ضمن العائلة الباذنجانية بالدرجة الاولى ثم في العائلة الخبازية. يتكاثر المن على عوائله الصيفية لأجيال عديدة وباقتراب منتصف الخريف الى اوائل الشتاء تنتج الافراد التزاوجية من ذكور الى اناث *Ginoparae* مولدة للإناث البيوضة *Oviparae* التي تطير الى العوائل الشتوية وتعيد تاريخ حياتها من جديد. اما في المناطق التي لا تنخفض فيها درجة الحرارة أي ما تحت الصفر عادة فان المن يستمر في التكاثر عذريا طيلة السنة دونما طور سكون ولا انتاج افراد تزاوجية ولا بيض.

ان طول مدة الجيل الواحد ثم عدد الاجيال في السنة تتوقف على درجة الحرارة السائدة. ان هذا النوع من المن يميل للجو البارد فدرجة الحرارة الدنيا لبدء نموه ونشاطه هي (3.0 - 4.5) م ودرجة الحرارة (28) م ضارة له ويحصل فيها هلاك عالي اما درجة الحرارة (30) فلا تنمو فيها هذه الحشرة. وكلما كانت المنطقة باردة ظهرت الافراد التزاوجية في وقت مبكر ففي فرنسا مثلا تظهر هذه الافراد في اب وايلول بينما تظهر في الهند في كانون اول وكانون ثاني. تضع الانثى العذرية الواحدة في المعدل تحت ظروف الغذاء الملائمة (60) حورية صغيرة وتستغرق دورة الحياة 25 يوما في درجة حرارة (25) م، لوحظ في ابي غريب ان حشرة من الخوخ الاخضر تتكاثر عذريا على الفجل والبطاطا خلال الخريف والربيع من عام 1984/1983. وقد بلغ طول الدور الحوري في الخريف حوالي 11 يوما وطول عمر الانثى 19-21 يوما وضعت خلال حياتها 70 حورية. لوحظت افراد تزاوجية على اشجار الخوخ

خلال كانون الاول وضعت بيضا في اباط البراعم. وجد ان للحشرة 9 أجيال على الفجل خلال الفصلين الخريفي والربيعي. درست الكثافة العددية لمن الخوخ الاخضر في ابي غريب عام 1984/83 على اربعة عوائل نباتية هي الفجل والبطاطا بعروتيهما الخريفية والربيعية والسلق ودرست في الخريف على اشجار الخوخ. ظهر ان اعلى كثافة له كانت على نباتات الفجل حيث بلغت ذروته في الاسبوع الثاني من نيسان حيث وصل معدله 11 حشرة للورقة. بدأت الحشرة بالظهور على الفجل في الاسبوع الاخير من شهر تشرين الاول واختفت في الاسبوع الاول من ايار. اما على البطاطا فقد ظهرت في الاسبوع الاول من تشرين الثاني واختفت في الاسبوع الاول من ايار. وعلى اشجار الخوخ، ظهرت في الاسبوع الاول من كانون الاول واختفت في الاسبوع الاخير من كانون الثاني.

ثالثاً) من الباقلاء الاسود *Aphis fabae Scopoli*

الانتشار:- ان من الباقلاء الاسود واسع الانتشار في العالم. فهو يوجد من القطب وحتى خط الاستواء. وقد سجل في منطقة حوض البحر الابيض المتوسط من اقطار عديدة منها قبرص وتركيا ولبنان وفلسطين ومصر والاردن والعراق.


العوائل:- انه متعدد العوائل جدا وقد وجد انه يصيب ما يزيد عن 200 نوعا نباتيا معظمها في العائلة البقولية. ومن عوائله في منطقة البحر المتوسط اللوبيا والفاصوليا والباقلاء والحمص والهرطمان وفول الصويا والسلق والشوندر والبنجر السكري. كما يتغذى على السوس والداؤودي وبعض نباتات العائلة الصليبية من جنس *Brassica*.

الضرر والاهمية الاقتصادية:- يعيش هذا المن - كبقية انواع المن الاخرى - في مجاميع تتكون من مئات الى الاف الافراد تعيش سوية بكافة ادوار نموها. تمتص هذه الحشرة عصارة النبات فتضعفه بشكل واضح خاصة عندما تتزايد اعداده. يفرز المن ايضا مادة الرضاب السكرية التي تغطي النبات فتتجمع عليها الاتربة وتنمو عليها الفطريات. ومن المعروف عن هذا المن انه يفرز مادة سامة داخل انسجة النبات العائل تؤدي الى اصفرار الاوراق وتجعلها وتساقط الازهار. تؤثر كل هذه الاضرار على انتاج النبات ففي الباقلاء المصابة يقل عدد القرينات ويقل عدد البذور في القرنة الواحدة وكذلك الوزن الكلي للبذور. اما في البنجر السكري فيقل الانتاج بسبب الإصابة بهذه الافة وتخفض نسبه السكر في الرؤوس.

تاريخ الحياه والوصف:- يتكاثر هذا النوع في العراق - وفي الاقطار الدافئة عموما - عذريا طيلة السنة وبشكل مستمر ويقدر ما تسمح به الظروف البيئية. بينما نجد ان هذا النوع نفسه يتكاثر بطريقه تزاوجية - اضافة الى تكاثره العذري- في المناطق التي يكون فيها الشتاء قاسيا ففي شمال ووسط اوربا تظهر في الخريف الافراد التزاوجية المجنحة التي تطير الى العائل الاولي او الشتوي وبعد التزاوج تضع الاناث بيضها على العوائل النباتية الاولية مثل *Euonymus europaeus* ، *Viburnum sp.* فتمضي الحشرة الشتاء في دور البيضة. يفسس البيض في الربيع الى الامهات الأساسية التي تتكاثر عذريا وتنتج اجيالا عديدة في الربيع. وفي نهاية الربيع تطير الاناث المجنحة من عائلها الاولي الى عوائلها الثانوية او الصيفية حيث تبقي عليها وتتكاثر عذريا وبتقدم الخريف تظهر الافراد التزاوجية والاناث والذكور وهكذا.

وقد يعزى سبب غياب التكاثر التزاوجي الى عدة عوامل منها عدم وجود العائل الاولي في العراق واعتدال الجو شتاء وتوفر العوائل النباتية المختلفة التي تصيبها الحشرة خلال موسم الشتاء. ولقد وجد ان البنجر السكري هو العائل الشتوي الرئيسي لحشرة من الباقلاء الاسود في العراق ولكنها تتكاثر عليه عذريا فقط. لقد وجد ان درجة الحرارة الدنيا التي يطير عندها هذا المن هي 14 م والحرارة المثلى هي 21 م وقد وجد ان لهذا المن ذروتين على الباقلاء من المنطقة الوسطى من العراق. تبدأ الاولى بعد انبات البادرات في تشرين الاول وتستمر حتى الاسبوع الاخير من تشرين الثاني ثم تختفي الاصابة حتى النصف الثاني من شباط حين تظهر الحشرات من جديد وتستمر حتى نهاية الموسم في نهاية اذار. اما على البنجر السكري فتختلف الصورة اذ تصاب هذه النباتات منذ نهاية تشرين الثاني وتزداد عليها كثافة المن بشدة حتى نهاية الاسبوع الثاني من نيسان مع اعلى ذروة قرب نهاية شباط اي ان الإصابة على البنجر السكري تبدأ عندما تختفي من الباقلاء. تتذبذب الكثافة على البنجر السكري ولكنها على العموم اعلى بكثير مما على الباقلاء.

الاناث العذرية غير المجنحة منتفخة شبه كروية طولها 2.0-2.5 مليمترا. لون الحشرة الكاملة اسود ضارب للخضرة قليلا ولون قرن الاستشعار اسود كذلك عد الحلقة الرابعة وجزء من الخامسة لونها فاتح. طول قرن الاستشعار أقصر من ثلثي طول الجسم. القرينان البطينان سودادوان قصيران طولهما 0.25-0.35 ملم. والذنب مخروطي الشكل.



الشكل (2-6) مخطط لدورة الحياة الكاملة Holocyclic لحشرة من الباقلاء الاسود ثنائية العائل

رابعاً) من اوراق المشمش *Hyalopterus pruni* (Geoffroy)

الانتشار:- ينتشر من اوراق المشمش في اسيا وشمال افريقيا، ومن الدول المجاورة يوجد في افغانستان وباكستان وايران وتركيا وقبرص. وينتشر في الوطن العربي في كل من الاردن وفلسطين ولبنان وسوريا ومصر وليبيا وتونس والعراق.

العوائل:- يصيب هذا المن اشجار المشمش والخوخ والعنجااص. ومن غير اشجار الفاكهة القصب جنس *Phragmites*، *Arundo*.

الضرر والاهمية الاقتصادية :- تمتص الحوريات والكاملات عصارة النبات من السطوح السفلية للأوراق فتصبح صفراء او بيضاء وتتجدد ويتوقف نموها كما ويفرز ندوة عسلية غزيرة تتساقط على الاوراق السفلي وعلى الثمار وعلى النباتات التي تنمو تحت الاشجار، ينشا عنها تجمع الغبار ونمو الفطريات.

دورة الحياه والوصف:- الانثى الولودة غير المجنحة apterous ovoviviparous female، طول جسمها 1.8-2.6 ملم، خضراء مغطاة بمسحوق شمعي ابيض. قرون الاستشعار أقصر من طول الجسم. القرينان البطنيان قصيران ورفيعان ومنتفخان قليلا عند القاعدة ولونهما رمادي غامق. اما الذنب فمخروطي، يبلغ طوله ضعف طول القرون الطنيه ولونه اخضر. الانثى الولودة المجنحة Ovoviviparous femalealate طولها 1.6 - 2.4 ملم الرأس والصدر بنيان غامقان الى سوداوين، والبطن خضراء القرينان البطنيان والذنب مشابه لتلك التي تعود الى الانثى الولودة غير المجنحة. يقضي من اوراق المشمش فترة الشتاء بدور البيضة المخصبة التي وضعتها الاناث البيوضة في الخريف السابق (تشرين الثاني وحتى كانون الاول) بمعدل 1-3 بيضه للأنثى. يوضع البيض المغزلي الشكل الاخضر اللون عند وضعه في اباط البراعم الورقية والزهرية وقواعد الاغصان وشقوق القلف للأغصان ثم يسود لونه. يفسس البيض عند توريق اشجار العائل في شباط واذار ثم تنتقل الحوريات الى الاوراق للتغذي على سطوحها السفلية. تنمو الحوريات الى اناث ولودة تتكاثر عذريا لعدة اجيال بلغت في وسط العراق 11 جيلا. والانثى الولودة تضع 102-120 حورية خلال حياتها. وخيرا تظهر افراد مجنحة تهاجر الى العائل الثانوي وهو القصب. تستمر الهجرة حتى شهر مايس وعنده

انخفضت اعداد المن الحية على اوراق المشمش فقد وجد من دراسة اجريت في ابي غريب (محافظة بغداد) ان اعداد المن انخفضت من 134 حشرة للورقة في اذار الى 9 حشرات للورقة المصابة في نهاية مايس. وتلعب الطفيليات والمفترسات دورا هاما في التقليل من اعداده. ففي الوقت الذي انخفضت فيه اعداد المن الحي زادت اعداد مومياءاته. وفي الخريف تظهر افراد ولودة مجنحة تتبعها بعد حوالي اسبوع ذكور مجنحة تغادر العائل الثانوي القصب الى العوائل الرئيسية، ولوحظ ذلك في منتصف تشرين الثاني وحتى اواخر كانون الاول. وهنا تنتج الاناث عذريا اناثا بيوضه تتزوج مع الذكور التي جاءت من القصب ثم تضع بيوضها على الاغصان والبراعم في اواخر تشرين الثاني ولمدة ستة اسابيع وتموت. ومع ذلك يستمر التكاثر العذري على العائل الثانوي طول السنة.

لمن اوراق المشمش اعداء طبيعية عديدة فقد سجل الطفيل *Aphidius transcaspicus* Tel من رتبة غشائية الاجنحة وهذا الطفيلي يلعب دورا هاما في القضاء على نسبة عالية من المن. فقد ذكر ان مومياء المن بدأت تظهر في بداية نيسان وزادت اعدادها حتى نهاية مايس وبعده لمن يبقى على اوراق المشمش غير مومياء المن ودرس تأثير المفترس أسد المن *Chrysopa carnea* على سكان حشرة من اوراق المشمش ووجد ان المبيدات DDVP والايكاتين مفيدة لمكافحة هذا المن إذا استخدمت في الوقت المناسب قبل حصول التطفل والافتراس. كما وسجلت مفترسات اخرى من ذباب السرفد والدعاسيق تلاحظ على المشمش والقصب.

خامساً) من العدس *Aphis craccivora* Koch

الانتشار:- ينتشر هذا المن في كل انحاء العالم فهو يوجد في اوربا والولايات المتحدة الأمريكية ووسط وشرق اسيا وفورموزا وسيلان وجاوا وسومطرا. اما في الشرق الاوسط فهو من ضمن أفات تركيا ومصر وفلسطين والاردن ولبنان وسوريا والعراق.

العوائل:- يصيب هذا المن عوائل عديدة من ضمنها القطن والحمضيات ولكنه يفضل نباتات العائلة البقولية سواء البريه منها والاقتصادية المزروعة.

الضرر والاهمية الاقتصادية:- ان ضرر هذه الحشرة كضرر من الباقلاء الاسود *Aphis fabae* فانه يمتص عصارة النبات خاصة من المناطق النامية ومن الازهار والقرنات وبما انه - كبقية انواع المن الاخرى - يعيش معيشة تجمعيه بأعداد كبيرة فأن تأثيره على النبات شديد حيث تتضرر المحاصيل البقولية اقتصاديا خاصة الباقلاء. واما اشجار الفاكهة فان اضرارها محدودة في حين ان الإصابة تكون شديدة على نباتات الزينة بالإضافة لأضرار هذا المن نتيجة تغذيته بأعداد كبيرة وافرازه بعض الرضاب الا انه معروف ايضا انه ينقل رواشح عديدة.

تاريخ الحياه والوصف:- لم يعثر على الافراد الجنسية (التزاوجيه) في اقطار الشرق الاوسط ولهذا فان التكاثر يعتمد على الاناث غير التزاوجيه Agamic Female (غير المجنحة والمجنحة) التي تتكاثر عذريا طول الموسم وكلما تسمح الظروف البيئية خاصة درجة الحرارة. الانثى غير المجنحة ذات لون اسود على الجسم والقرنين البطنيين والذنب. اما الارجل فهي سوداء ايضا عدا الساق الذي يكون لونه فاتحا ونهايتاه سوداوان. قرون الاستشعار سود

وأقصر من الجسم. قرينا البطن Cornicles سميكة واسطوانية الشكل واطول عادة من العقلة الثالثة لقرن الاستشعار. الذنب أصبعي المظهر وطوله يساوي 0.4-0.9 من طول القرن البطني وفي النادر اسمك منه. يتراوح طول الجسم بين 1.5 - 2.3 مليمترا. اما الانثى المجنحة فهي سوداء اللون في الجسم ولواحقه. اللامسة ذات طول يقارب نصف طول الجسم. القرينات البطنية طويله وأسطوانية اما الذنب فهو رفيع بسمك او ربما اسمك بقليل من القرنين البطنيين وحوالي نصفها في الطول. الاجنحة لامعه ومشوبة بصبغه خفيفة جدا. طول جسم هذه الاناث يتراوح بين 1.6 - 2.2 مليمترا.

ثانياً) حشرات المن من عائلة Eriosmatidae

وهي العائلة الثانية من عوائل المن الأربعة الواردة في التصنيف الاخير للحشرات، تضم هذه العائلة خمسة انواع في الوطن العربي لاحظ الجدول (2-4) الذي يضم الاسماء العلمية والعربية الشائعة لها في الوطن العربي. ان اهم ما يميز انواع هذه العائلة هو افرازها للنسيج الصوفي او القطني الذي يحيط بالحشرات. ان من أكثر انواع المن الخمسة شيوعا وانتشارا في بساتين التفاح هو من التفاح الصوفي او القطني.

الجدول (2-4) الاسماء العلمية والعربية الشائعة لأنواع المن من عائلته

Eriosomatidae

الاسماء العلمية	الاسماء العربية الشائعة
<i>Eriosoma americanum</i> (Ril.)	من شجر الدردار الزغبى، من شجر الدردار الصوفي
<i>Eriosoma lanigerum</i> (Haus.)	ارقة التفاح القطنية، ارقه قطنيه، من التفاح، من التفاح الزغبى، من التفاح الصوفي، من التفاح القطني، من الجذور القطني
<i>Eriosoma lanuginesum</i> (Hart.)	من شجر الألم
<i>Eriosoma pyricola</i> Bak&Dav.	من الاجاص الزغبى، من الاجاص الصوفي، من الكمثرى الصوفي
<i>Eriosoma ulmi</i> (L.)	من شجر الألم

Wooly Apple Aphid

حشرة من التفاح القطني

الانتشار:- تنتشر هذه الافه في اغلب مناطق زراعة التفاح في العالم فهي توجد في امريكا وكندا واستراليا ونيوزلندا والبرازيل وبلغاريا وانكلترا وايطاليا والدانيمارك والاتحاد السوفييتي وجنوب افريقيا والهند وتركيا وقبرص وايران ومصر وفلسطين والاردن ولبنان، وسوريا والعراق.

العوائل:- التفاح، الدردار، الزعرور، السفرجل، والعرموط، اما في العراق فان هذه الحشرة تصيب التفاح فقط.

الضرر والاهمية الاقتصادية:- تتغذى الحوريات والكاملات على جميع اجزاء نباتات التفاح وخصوصا على السيقان والفروع عن طريق امتصاص العصارة النباتية من هذه الاجزاء ويؤدي ذلك الى تكون اورام على الاجزاء المصابة وقد تؤدي الاصابات الشديدة الى موت الاشجار خصوصا عندما تكون صغيرة

العمر، يمكن التعرف على الإصابة بهذه الآفة بوجود الأورام على الأجزاء المصابة من الأشجار وعن طريق وجود الخيوط البيضاء التي تغطي حشرات المن. تختلف ضروب التفاح في مدى حساسيتها للإصابة بهذه الحشرة حيث وجد بان ضرب التفاح العجمي أكثرها ملائمة يليه التفاح الشرايبي ثم التفاح الأحمر الصيفي. تتركز الإصابة بحشرة المن القطني في المحافظات الوسطى من العراق (بغداد، الأنبار، واسط).

الوصف وتاريخ الحياه:- توجد حشرة من التفاح القطني على هيئة اناث عديمة الأجنحة طيلة ايام السنة على اشجار التفاح لا تدخل الحشرة سباتا صيفيا ولا تشتيه ولا سكون فسلجي. تظهر الافراد المجنحة خلال شهري تشرين الاول وتشرين الثاني. لهذه الحشرة عشرون جيلا في السنة في العراق. ويصل سكان الحشرة ذروته في نيسان وتشرين الاول تتباين انتاجية الانثى الواحدة من الحوريات باختلاف ضروب التفاح ودرجات الحرارة حيث وجد ان معدل الانتاجية على ضرب التفاح الاعجمي هي 71.5، 98.0، 48.9، 29.3 حورية تحت درجات الحرارة 15، 20، 25، 30 م ورطوبة نسبية 50-60% على التوالي. للحوريات اربعة انسلاخات واربعه اطوار حورية. طول الحورية في الطور الاول يتراوح ما بين 0.82-0.9 ملم لونها اصفر باهت والطور الثاني طوله بين 1.0، 1.2 ملم، لونه اصفر مائل الى البني قليلا والطور الثالث طوله ما بين 1.3 و1.4 ملم لونه بني يميل الى الاصفر اما الطور الرابع فيتراوح طوله ما بين 1.5 و1.6 ملم، لون الجسم يميل الى البني قليلا. الانثى العذرية البالغة غير المجنحة يتراوح طولها ما بين 2.1 و2.4 مل ولونها بني وتفرز خيوطا بيضاء شمعية ومنها جاء اسمها العامي وكانت

معدلات فترات الاطوار الحورية الاربعة على الصنف عجمي وتحت درجة حرارة 25 م ورطوبة نسبية 50-60 % هي 3.5، 2.7، 0.9، 1.16 يوما على التوالي.

ثالثاً) حشرات المن من عائلة Phylloxeridae

هذه العائلة تضم خمسة انواع اربعة منها تهاجم اشجار الجوزيات والنوع الخامس منها يهاجم شجيرات العنب، والجدول (2-5) يشير الى اسمائها العلمية والعربية الشائعة.

الجدول(2-5) الاسماء العلمية والعربية الشائعة لحشرات المن من عائله

Phylloxeridae

الاسماء العلمية	الاسماء العربية الشائعة
<i>Dactylosphaera vitifoliae</i> (Fit.)	حشرة الفلوكسيرا، فلوكسيرا العنب، فيلوكسيرا الكرمة، قملة الكرمة
<i>Phylloxera coccinea</i> (Von-Heyd)	فلكسرة البلوط
<i>Phylloxera devastatrix</i> Perg.	فيلوكسيرا البقان
<i>Phylloxera notabilis</i> Perg.	فيلوكسيرا اوراق البقان
<i>Phylloxera rileyi</i> Ril.	فلكسرة البلوط

واهم ما يميز انواع هذه العائلة انها تشبه حشرات المن شكلا وتختلف عنها بغياب زوائدها البطنية القرينات Cornicles اضافة الى ان جميع اناثها بيوضه، وتعد فيلوكسيرا العنب Grape phylloxera النوع الاكثر شيوعا وانتشارا حيث يعد الالفه الرئيسية على العنب حول العالم:

Grape phylloxera

فيلوكسيرا العنب

Dactylosphaera vitifoliae (Fit.)


الانتشار:- موطنها الاصلي شرقي الولايات المتحدة الأمريكية حيث تعيش فصائل من الاعناب الأمريكية المنتمية الى الجنس vitis حيث تتغذى هذه الحشرة على اوراقها وجذورها من دون ان تلحق بها اضرارا تذكر انتشرت من موطنها الاصلي نحو عام 1860 الى اوربا وغربي الولايات المتحدة وفيها الى معظم دول العالم القديم في اوروبا واسيا ما عدا اليابان وقضت على ملايين الهكتارات من كروم العنب المحلية ودخلت بلدان الشرق الاوسط عن طريق فلسطين بعد الحرب العالمية الاولى وقضت فيها على الالاف من هكتارات الكروم ولا تزال تشكل خطرا على الاصناف المحلية.

العوائل:- الاعناب بجميع انواعها ومنها البريه.

الضرر والاهمية الاقتصادية:- تتغذى الفيلوكسيرا الجذرية على الجذور بامتصاص العصارة ويتكون في مكان التغذية درنات تهاجم من قبل الفطريات مما يؤدي الى تعفنها وموت جزء كبير من الجذور الصغيرة والكبيرة وقد تظهر اعراض مماثلة لأعراض نقص البوتاسيوم والعطش، وقد يحتاج ظهور الاعراض على المجموع الخضري من 2-5 سنوات من حدوث الإصابة الأولية حسب قوة الشجرة وكيفية حدوث العدوى وكثافتها، وعند الحفر حول جذوع الاشجار تشاهد الجذور المصابة بلون مختلف مصفر ضارب الى البياض مع وجود جذيرات متقزمة وتقرحات مختلفة وعند الفحص بمكبرات نلاحظ حوريات الحشرة بلون اصفر في تجمعات على الجذور، ويمكن ان تؤدي الإصابة الى اصفرار الاوراق وسقوط مبكر لها قبل سقوط اوراق الاشجار السليمة ويمكن ان تختلط اعراض الإصابة الظاهرة على المجموع الخضري مع اعراض اخرى ناتجة عن خلل غذائي مع ملاحظة ان الإصابة

تشتد في الاراضي الثقيلة التي تتشقق عند الجفاف. تحدث الاصابة على الجذور الكبيرة تدرنات Tuberosity وعلى الجذور الصغيرة عقد ملتوية الشكل تشبه الهراوة Nodosity، وتموت الجذور المصابة بسبب تعرضها للاعقان. تصيب الفيلوكسيرا الورقية السطح العلوي للأوراق وتتغذى عليها ونتيجة لذلك يتكون في مكان الاصابة بثرات تظهر على السطح السفلي للأوراق يتغير شكل هذه البثرات من اللون الاخضر الفاتح الى اللون الاحمر، تصفر الاوراق المصابة وتتساقط على الارض، تموت اشجار الكرمة المصابة بعد 3-5-8 سنوات، تسبب هذه الحشرة في سوريا اضرار فادحة لأشجار الكرمة، ويمكن تحديد اشكال الاصابة التالية لحشرة الفيلوكسيرا على الكرمة (الشكل 2-6).

- الشكل البثري على الاوراق (على الكرمة الأمريكية)
- الشكل الجذري (على الكرمة الأوروبية)
- الشكل الجنسي الذي لا يتغذى (لفقد اجزاء الفم) الذي يعطي اناثا صفراء الى ذهبية اللون مجنحة اجنحتها شفافة طولها 2-3 ملم، ويعطي ذكورا غير مجنحة بطول 0.3 - 0.5 ملم



الشكل (2-7) اعراض الإصابة بحشرة فيلوكسييرا العنب

Life Cycle

دورة الحياة

لفيلوكسييرا العنب دورة حياة معقدة، تعطي في اثناءها اشكالا عدة من الحشرات

الكاملة الى جانب اطوارها غير الكاملة من الحوريات ومن اهم اشكالها:

1- الاناث الورقية (الفيلوكسييرا البثرية) Gallicolae، تتميز بلون جسمها

الاصفر المخضر، جسمها مسطح الى محدب، الطول يراوح بين 1-1.5

ملم، تهاجم اوراق الاصناف الأمريكية فقط.

2- الاناث الجذرية (الفيلوكسييرا الجذرية) Radicicola تهاجم الجذور فقط،

صغيرة الحجم يصعب رؤيتها بالعين المجردة، لونها اخضر مصفر او

اصفر، قرن الاستشعار مكون من ثلاث عقل ولها خرطوم طويل، طول

الحورية في العمر الاول 0.3-0.4 ملم وطول الحشرة الكاملة 1-1.2

ملم بيوض الفيلوكسييرا الجذرية صفراء اللون ثم يتحول لونها الى بني


وطولها 0.3 ملم وبيوض الاناث المجنحة صفراء فاتحة اللون وحورياتها صفراء ليموني.

3-) الفيلوكسرا المجنحة الجنسية *Sexuaparae alate form* وهي اناث مجنحة تنتج بيوضها افرادا جنسيا في المستقبل، جسمها اصفر برتقالي اللون، حلقتها الصدرية الوسطى سوداء، طوله 1.2 ملم.

تمر الحشرة في موطنها الاصلي وعلى انواع العنب الأمريكية بدورة حياه كاملة *Holocyclic* حيث تقضي فصل الشتاء على شكل بيوض ملقحة موضوعه افراديا تحت قلف الساق والاغصان، تفقس هذه البيوض في فصل الربيع عن حوريات تهاجر الى الاوراق الحديثة وتتغذى على سطحها السفلي وتعطي اناثا تسمى بالأمهات *Fundatrices* التي تسبب تغذيتها تشكيل اورام جيبية (بثرات) مفتوحة على السطح السفلي، تعيش ضمنها انثى واحدة تتكاثر بكريا ولأجيال عدة فتعم الاصابة بالبثرات معظم سطح الاوراق وتهاجر بعض هذه الاناث مع نهاية الصيف الى سطح التربة لتخترقها ولتصل الى الجذور فتصيبها. تتابع الفيلوكسرا الجذرية تكاثرها بكريا على الجذور ولأجيال عدة ويعطي بعضها في فصل الخريف اشكالا من الحشرات المجنحة *alate forms* تغادر الى سطح التربة مهاجمة نباتات جديدة. تضع هذه الاناث بيوضا تفقس عن ذكور واناث تتزاوج فيما بينها، وتضع كل انثى بيوضه واحدة تسمى بيوضه الشتاء، وتعاود دورة حياتها في فصل الربيع القادم، وبذلك تنهي دورة حياه الحشرة الكاملة (الشكل 2-7). اما على الاصناف غير الامريكية (الأوربية والاسيوية وغيرها) فتوصف دورة حياه الحشرة بانها غير كاملة *anhologyclic biology* حيث تتكاثر الحشرة بكريا على الجذور ولأجيال

عدة، تقضي فصل الشتاء على شكل حوريات غير مكتملة النمو على الجذور القديمة ومع اقتراب فصل الخريف، تعطي بعض الاناث الجذرية اناث مجنحة تغادر التربة من دون ان تتكاثر وتنتهي دورة حياتها الى الموت.

يتم انتشار الحشرة من نبات الى اخر، بعد مغادرة بعض اناثها التربة وانتقالها الى نباتات جديدة مجاورة. وتسهل عملية الانتقال طبيعة التربة، فالتربة الطينية تكون أكثر ميلا للتشقق عند جفافها فتفسح المجال امام الحشرة للهجرة، في حين يصعب ذلك في الترب الرملية الناعمة لعدم تشققها. تسبب اصابه الفيلوكسيرا الجذرية للجذور الحديثة تشكيل اورام شبه كروية (مغزليه)، ويتبع ذلك تفكك الخلايا الخارجية لتلك الاورام، يلي ذلك تحللها وتعفنها بمساعدة فطور التربة فتموت الجذور المصابة، وينعكس ذلك على النبات خارج التربة، فيبدأ بالضعف والاصفرار ببطء شديد قد يمتدان لسنوات عدة. تقاوم جذور الانواع الأمريكية الإصابة بسبب رد فعل خلايا الجذور الخارجية التي تشكل طبقة فلينية صلبة تقاوم تدهورها وموتها. ويستفاد اليوم من هذه الظاهرة في استخدام بعض الانواع الأمريكية وهجنها اصولا مقاومة لهذه الحشرة، فتطعم عليها الاصناف المحلية والاقتصادية في مختلف انحاء العالم. يضاف الى فيلوكسيرا العنب بعض انواع من الفيلوكسيرا النادرة الوجود، يذكر منها فيلوكسيرا الكمثرى *Aphanostigma (phylloxera) piri (chol)* التي تهاجم الثمار مكونة عليها تقعرات واضحة فاتحة اللون، تتحول الى اللون البني بسبب اصابته بفطر بني يؤدي الى تدهور الثمار.



الشكل (2-8) دورة حياة فيلوكسيرا العنب

Adelgidae

حشرات المن من عائلته

على الرغم من الانتشار الجغرافي الواسع للعوائل النباتية لهذه الحشرات حول العالم فإن الانواع المعروفة منها قليلة حيث لا تزيد عن 70 نوعا موصوفا. وكما في الحشرات من Phylloxeridae فإن هذه الحشرات ايضا تمتاز بغياب زوائدها البطنية القرنيات Siphunculi كما تمتاز هذه الحشرات قريبة الصلة من الفيلوكسيرا والمن Aphidid ما يسمى بالتكاثر العذري الدوري Cyclical parthenogenesis ضمن دورة حياه معقدة ذات مظاهر واجيال متعددة، فمن بين 50 نوعا مدروسا من ال adelgids اظهرت الدراسات ان 19 نوعا منها امتاز بدورة حياه من النوع الكامل Holocyclic في حين كان ل 8 انواع منها دورة حياه من النوع غير الكامل anholocyclic

على عائلها الرئيسي من الجنس *Picea* و 23 نوعا اخر ايضا كانت له دورة حياه من النوع غير الكامل ولكن على عوائل ثانوية. وفي الوقت الذي نجد فيه ان هذه الحشرات من ال adelgids تتغذى فقط على اجناس معينة من عائله Pinaceae وبالتالي احتفاظها بعلاقتها الأزلية او القديمة ancestral بالعوائل النباتية من عارية البذور gymnosperm فان حشرات فيلوكسرا والعديد من حشرات المن تتغذى على العوائل النباتية من مغطاة البذور angiosperm اما في العراق والوطن العربي فتعد حشرة من شجر التنوب الفضي *Adelges abietis* (linnaeus) النوع الوحيد المسجل والمعروف بمهاجمته لهذه الاشجار.

من شجر التنوب الفضي Silver spruce Adelgid

Adelges abietis (Linnaeus)

الانتشار: - تعد اوربا الموطن الاصلي لهذه الحشرة ومنها انتقل الى الولايات المتحدة قبل العام 1900 وهي الان متواجدة ومستقرة في شمال شرق الولايات المتحدة وفي شرق كندا وهي معروفة في ولاية بنسلفانيا حيث تتشابه احيانا اعراض الاصابة بهذه الحشرة مع افه اخرى وتهاجم اشجار التنوب وهي Cooley Spruce gall adelgid.

العوائل: - على الرغم من مهاجمة هذه الحشرة احيانا لـ Colorado and white spruce فليس لهذه الحشرة عائل بديل حيث تقضي عادة دورة حياتها بالكامل على شجرة التنوب spruce.

الضرر والاهمية الاقتصادية: - اهم ما يميز الإصابة بهذه الحشرة هو الاورام التي تسببها تغذية الاطوار المختلفة لهذه الحشرة، هذه الاورام عبارة عن نموات

صغيره وقصيره تشبه في شكلها ثمار الاناناس والتي عادة م تكون موجودة عند قواعد الاغصان twigs، هذه الاورام عادة اقل من 1 انج طولاً خضراء عندما تكون حيه وتصبح بنيه بعد تفتحها وخروج الحشرة هذه الحشرة تقضي فتره الشتاء على هيئه حوريات انثى صغيره رمادية عند قاعدة اوراق الشجرة الابرية وعند بلوغها ووضعها للبيض تقوم بإفراز خصلات صغيره من الصوف الابيض الذي يمكن مشاهدته بوضوح على سيقان هذه الاشجار. ان وجود هذه الاورام او العقد galls يعد المشكلة الاكبر والناجمة عن تغذية الاطوار المختلفة للحشرة والتي تؤدي الى اضعاف الاغصان وجعلها أكثر حساسية او قابليه للكسر وبشكل أسرع بوجود الرياح او الثلوج، كما ان ازالة هذه الاورام يعد صعباً من دون الاضرار او تشوه هذه الاشجار هنا فضلاً عن ان وجود هذه الاورام يقلل من القيمة الجمالية لهذه الاشجار فضلاً عن حيويتها.

الوصف وتاريخ الحياه: ال Adelgids حشرات صغيرة ذات شكل او مظهر بسيط، العمر الاول عادة من 0.4 الى 0.5 ملم طولاً، البالغات غير المجنحة 0.6 الى 1.3 ملم بينما البالغات المجنحة 1-2 ملم كما ان الاعتماد على المظهر الخارجي في تصنيف هذه الحشرات يعد صعباً وذلك بسبب دورة الحياه المعقدة لهذه الحشرات والتي تحتوي على العديد من الاشكال او المظاهر للنوع الواحد. دورة الحياه لهذه الحشره *Adelges abietis* من النوع الغير الكامل anholocyclic. تقضي هذه الحشرة فترة الشتاء على هيئه اناث غير بالغه، وفي بداية الربيع تصل هذه الاناث مرحلة البلوغ وتبدأ بوضع البيض والذي يترافق مع وقت تفتح البراعم حيث تضع كل انثى اكثر من 100 بيضه وتعمل على حمايتها وذلك بتغطيتها بالإفرازات من الخيوط الشمعية،

القطنية البيضاء، تفقس البيوض بعد اسبوع واحد من وضعه عن حوريات صغيره تبدأ بالتغذية على اوراق الشجرة الابرية والذي يؤدي الى انتفاخ قواعد هذه الاوراق ثم التنامها حيث تقوم بالإحاطة بهذه الحوريات وبشكل كامل مكون ما يسمى بالورم او العقد gall حيث تعيش الحوريات وتتمو داخل هذه الاورام المغلقة حتى نهاية الصيف حيث تنفتح هذه الاورام عن حوريات على وشك البلوغ حيث تستقر على الاوراق الابرية لحين وصولها لطور البلوغ ووضع البيض ثم فقسه لتستقر الحوريات الناتجة قرب براعم الاوراق حيث تقضي فتره الشتاء وهكذا تعيد الحشرة دورة حياتها.

Aphids Control

مكافحة المن

ان منع حدوث الاضرار المباشرة وغير المباشرة التي تسببها حشرات المن بأنواعها المختلفة على المحاصيل الزراعية يتطلب من العاملين في مجال الزراعة اتخاذ الاجراءات المناسبة للحد من اضرارها اذ تتوفر اليوم العديد من الطرائق التي يمكن استخدامها لمكافحة المن وخفض اعداده الى ما دون الحد الاقتصادي الحرج Economic Threshold وفيما يأتي استعراض موجز لهذه الطرائق:

اولا) مكافحة الكيمائية Chemical Control: - يمكن القول ابتداء من جميع مبيدات الحشرات والاكاروسات بمجاميعها المختلفة هي مبيدات فعالة جدا في مكافحة حشرات المن وذلك لان الأخيرة، اي حشرات المن تعد من الحشرات الرهيفة والسريعة التأثر بالمبيدات المستخدمة في مكافحتها، هذه الحالة قد تجعل القائم بعملية مكافحة الكيمائية في حيرة من امره وفي تساؤل

مستمر اي المبيدات هي الافضل؟ ان اختيار المبيد الافضل والانسب يتطلب من القائم بعملية مكافحة مراعاة ما يأتي:

1- مكان استخدام المبيد: حقائق منزليه، نباتات زينه داخل الأبنية، بيوت زجاجيه وبلاستيكية، حقول.

2- نوع المحصول المصاب بالمن، محاصيل خضر، محاصيل حقل، اشجار فاكهه وغابات ام نباتات زينه ودرجة حساسيتها للمبيدات.

3- سلامة الاعداء الحيوية.

4- تأخير او منع ظهور السلالات المقاومة للمبيدات.

5- التخلي عن فكره او مبدأ ابادة الافه بالكامل.

ان مراعاة ما سبق يتطلب الالمام التام والمعرفة الجيدة بالموصفات التطبيقية لمجاميع مبيدات الحشرات، فضيلا عن معرفة الحدود الاقتصادية الحرجة لكل نوع من انواع المن وعلى كل محصول من المحاصيل الاقتصادية.

على ضوء ما سبق فانه سيتم اختيار المبيدات او المبيد الذي سيتم استخدامه في مكافحة المن وكما يأتي:

1- في حاله مكافحة المن في الحدائق المنزلية والعامه وعلى نباتات الزينة

داخل الأبنية والمنازل، فان المبيد المستخدم يجب ان يكون عديم الرائحة

ولا يسبب الحساسية وان يكون قليل السمية للبائن وسريع التدهور مثال

ذلك اختيار أحد مبيدات الحشرات من مجموعه البايروثرويد المحضرة

صناعيا مثل lambda Cyhalothrin.

2- في حاله المحاصيل الحساسة للمبيدات من الضروري الابتعاد عن

استخدام الزيوت البترولية والمبيدات الحاوية على الكبريت والزرنيخ.

3-) ان تحقيق سلامة الاعداء الحيوية يتطلب اختيار المبيدات الجهازية مثل البريمور Primor، فضلا عن استخدام التراكيز المنخفضة ورش المبيدات بطريقه المعاملة البقعية Spot treatment اي معاملة اجزاء من الحقل تمثل المناطق الساخنة التي تتركز فيها الإصابة بالمن وذلك لترك نسبة من الاعداء الحيوية والفريسة الحساسة لإدامة التنوع في الحقل.

4-) ان تأخير ظهور السلالات المقاومة من المن للمبيدات يمكن تحقيقه ايضا من خلال اتباع الاجراءات المشار اليها في رقم (3) اضافة الى ضرورة استخدام دورات المبيدات ومخاليط المبيدات.

ثانياً) **المكافحة الزراعية Cultural Control**: - تهدف المكافحة الزراعية الى محاولة تحويل البيئة الزراعية او بيئة المزرعة بحيث تصبح غير ملائمة بدرجة ما للافه، وبذلك يمكن ان تحد من شدة ضرر المن او ان توفر بدلا من ذلك بيئة ملائمة للأعداء الطبيعية للمن، وفيما يأتي اهم الطرائق الزراعية التي يمكن استخدامها في مكافحة المن:

1-) **النظافة Sanitation**: - وتعمل من خلال منع المن من الدخول الى الحقول والبيوت البلاستيكية الخالية من الإصابة من خلال نظافة الاوراق الزراعية وزراعه الشتلات السليمة والخالية من الإصابة او من خلال ازاله الادغال ومتبقيات المحصول المصابة بالمن

2-) **الدورات الزراعية Crop Rotation**: - حيث تهدف الى اقضاء العائل مؤقتا عن الحقل مما يؤدي الى خفض اعداد المن

3- إزالة العوائل البديلة Controlling Alternative Host: - مثال ذلك من جذور الخس له عائل ثانوي هو اشجار القوغ Poplar وعليه فان اعداده تزداد في المناطق التي يزرع فيها الخس والقوغ بينما لا يعتبر مشكله على الخس في المناطق التي لا توجد فيها اشجار القوغ.

4- تغيير مواعيد الزراعة والحصاد Planting & Harvesting Dates: هذه العملية قد تجنب المحصول من الإصابة بحشرات المن.

5- الخدمة الجيدة للمحصول Crop Good husbandry ان الخدمة الجيدة للمحصول من خلال الري المنتظم والتسميد المتوازن تؤدي الى انتاج نباتات قوية تتحمل الإصابة بالمن.

6- زراعه الاصناف المقاومة Planting Resistant varieties مثال ذلك أ- زراعه اللهانه الحمراء المقاومة لمن اللهانه ب- تطعيم العنب الفرنسي على الاصول الجذرية لأصناف العنب الامريكي المقاومة لحشرة.

ثالثاً) **المكافحة الفيزيائية Physical control** - يمكن استخدام العديد من الوسائل الفيزيائية في مكافحة حشرات المن ومنها:

1- استخدام تيار الماء القوي لأزاله المن والندوة العسلية من على النباتات المصابة في الحدائق المنزلية والبيوت الزجاجية والبلاستيكية.

2- اغطيه المروز الطافيه Floating Row Cover وهي اغطيه مصنوعه من البولستر الخفيف توضع فوق المروز لأبعاد حشرات المن المجنحة او المحمولة بواسطة تيارات الهواء عن النباتات.

3-) تيارات الهواء: وتعتمد هذه الطريقة على وضع مراوح او توربينات لتوليد تيارات هوائية قوية امام مداخل البيوت البلاستيكية والزجاجية لتعمل كحواجز تمنع دخول حشرات المن وغيرها من الحشرات الطائرة.

رابعاً) **المكافحة الحيوية Biological Control**: تلعب الاعداء الحيوية من مفترسات وطفيليات وممرضات حشريه دورا مهما وفعالاً في مكافحة حشرات المن والسيطرة على اعداءه في الحقل وفيما يأتي استعراض لاهم اعداء المن:

أ-) **المفترس *Aphidoletes aphidimyza***: ويعود لعائله Cecidomyiidae من رتبه ثنائيه الاجنحة Diptera، وله العديد من الاسماء الشائعة: Aphid ، Gall Midge، Aphid Midge،Predatory Gall Midge Gall Midge ان الموطن الاصلي لهذا المفترس هو شمال امريكا وشمال اوربا وقد تم تطويره في فنلندا وروسيا منذ عام 1970 لمكافحة المن وتم انتاجه تجاريا في فنلندا لأول مره عام 1978 وحاليا ينتج تجاريا في شمال اوربا وكندا ودول اخرى.

الانتاج Production: يتم انتاج هذا المفترس تجاريا بتربيته على من القطن *Aphis gossypii* وانواع اخرى مناسبة من المن ويسوق تجاريا بشكل عذارى توجد داخل قطن رطب او مادة ال vermiculite الحاملة كما تم تربيته على من الخوخ الاخضر ومن الباقلاء الاسود على الفلفل والباذنجان والفاصوليا.

الفاعلية الحيوية Biological Activity: تنشط بالغات المفترس ليلا حيث تبدأ بالتزاوج ووضع البيض ليلا او عند الغسق، وفي النهار تختبأ البالغات أسفل الاوراق والبيض بيضوي الشكل وابعاده (0.1-0.3) ملم ويوضع أسفل

المن او قريبا منه، اليرقات حديثه الفقس طولها 0.3 ملم وقد يصل طولها الى 2.5 ملم عندما يكتمل نموها. وتقوم اليرقات بمهاجمة المن عن طريق حقنه بمادة سامه تسبب له الشلل قريبا من مدور الرجل وبعد مرور ما يقرب من عشره دقائق يتحلل محتوى جسم المن بالكامل حيث تقوم اليرقة بامتصاصه وان اليرقة تقتل من المن أكثر من حاجتها. في الخريف وعند انخفاض درجات الحرارة تبدأ اليرقات كاملة النمو بعمل أنفاق في التربة بعمق 2 سم حيث تعذر فيها لقضاء فتره الشتوية. في الزراعة المحمية لأتدخل اليرقات بيات شتوي وتستمر بنشاطها.

الافتراس Predation: ان يرقة المفترس الواحدة تستهلك من 10-100 حشره من خلال فتره العمر اليرقي وان درجة الحرارة المناسبة للافتراس تتراوح بين 19-28 م. اما بالغات المفترس فتتغذى على الندوة العسلية للمن. يتوفر هذا المفترس تحت العديد من الاسماء التجارية منها:

Aphidoletes -V و Aphido - line 250 و Aphid و Aphidend و Aphid و Aphidoletes Parasite وغيرها كثير. يتم إطلاق هذا المفترس بمعدل 1-6 افراد / نبات / اسبوع ولمده 3-4 اسابيع او مفترس واحد كل عشره حشرات من المن.

(ب-) المفترس *Chrysoperla carnea*: ويسمى اسد المن ويعود لعائله Chrysopidae من رتبه شبكيه الاجنحة Neuroptera ويسمى ايضا العيون الذهبية Gloden eye. ويوجد في الطبيعة كمفترس حشري عام. ويتم انتاجه تجاريا بتربيته على المن او على بيئات صناعيه ويسوق تجاريا على شكل بيض. ويستخدم لمكافحة جميع انواع المن فضلا عن الذباب الابيض

والحشرات القشرية والثريس والحلم وهو مفترس فعال في الزراعات المحمية والمكشوفة.

الفاعلية الحيوية Biological Activity: تضع اناث اسد المن بيضها على ساق أسطوانى على السطح السفلي للأوراق بعد فقس البيض تبدأ اليرقات بالتغذية على المن الى ان يكتمل نموها، وتعمل اليرقات على اخفاء نفسها ببقايا حشرات المن، بعد ذلك تتحول اليرقات الى عذارى التي تتحول بدورها الى بالغات تتغذى على الرحيق.

الافتراس Predation: تستهلك يرقات المفترس خلال فتره نموها اكثر من 400 حشره من وان اليرقة الكبيرة تستهلك يوميا ما بين 30-50 حشره من. يتوفر هذا المفترس تجاريا بشكل بيض مخلوط مع النخالة او قشور الرز او مواد اخرى كما قد يضاف مع المواد الحاملة بيض لحشرات من حرشفيه الأجنحة لتغذية اليرقات عند الفقس، كما يمكن تسويق هذا المفترس بشكل يرقات ايضا. يتوفر هذا المفترس تجاريا تحت العديد من الاسماء التجارية Chryosur، MC-500، Green lacewing، chrysopa وغيرها.

لتحقيق مكافحة ناجحة يمكن إطلاق هذا المفترس بنسبه حشره بالغه من اسد المن لكل 10 حشرات من او 10 بيضات / نبات او 5 يرقات / م2 اسبوعيا. ويمكن اجراء عمليات الاطلاق باستخدام الطائرات.

ت-) المفترس *Harmonia axyridis*: ويعود لعائله الدعاسيق Coccinellidae ولرتبه غمديه الاجنحة ومن اسمائه الشائعه Predatory Chinese Ladybird، Ladybird. ويعتقد ان الموطن الاصلي لهذا المفترس هو الصين وقد دخل حديثا الى امريكا واوروبا ويتم انتاجه مختبريا ضمن

ظروف مسيطر عليها على بيض انواع من العث مثل *Epehstia* او على حشرات المن.

الفاعلية الحيوية Biological Activity: بمجرد فقس البيض تبدأ اليرقات بالتغذية على المن ولحين التعذير، اليرقات تنشط عند درجات الحرارة فوق 11 م وعند غياب الفريسة قد تفترس اليرقات بعضها البعض، الا ان الخنافس البالغة تستطيع العيش عدة ايام بدون غذاء.

الافتراس Predation: بالغات ويرقات المفترس يتغذيان على المن وحشرات اخرى. الاناث البالغة تضع 20 بيضه / يوم خلال فتره حياتها التي تستغرق 2-3 شهر. ان دوره حياه هذا المفترس تستغرق 15-20 يوم عند درجة حرارة 25 م. ويتوفر هذا المفترس تجاريا بشكل يرقات في صناديق تحوي مصدر غذائي للسماح لليرقات بالنمو خلال عمليه النقل. ان نسبه إطلاق اليرقات تعتمد على حجم النبات وشده الإصابة بالمن.

2- الطفيليات Parasites: - من طفيليات المن المتوفرة على المستوى التجاري ما يأتي:

أ-) الطفيل *Aphelinus abdominalis*: ويعود لعائله الـ Aphelinidae من رتبه غشائية الاجنحة Hymenoptera ويسمى ايضا بـ AphidParasiticWasp. هذا الطفيل واسع الانتشار في اوربا يتم انتاجه تجاريا بتربيته في مختبرات مسيطر عليها على حشره المن *Macrosiphum euphorbiae*.

الفاعلية الحيوية Biological Activitiy: تضع انثى الطفيل البيض داخل جسم المن حيث يفقس البيض عن يرقة تقضي اعمارها الأربعة متغذية داخل

جسم المن، بعدها تتحول الى عذراء ثم تخرج الحشرة الكاملة من مومياء حشره المن.

الافتراس Predation: انثى الطفيل تكون نشطة في السيطرة على المن الكبير الحجم وتستطيع الانثى الواحدة التطفل على 10-15 حشره من في اليوم. تتزاوج بالغات الطفيل خلال اليوم الاول من خروجها من العذارى وقد وجد ان البيض الموضوع في حشرات المن الكبيرة يكون مخصب وينتج اناث، اما البيض الذي يوضع في حشرات المن الصغيرة فيكون غير مخصب وينتج ذكور فقط. ان فترة الجيل لهذا الطفيل تستغرق 13-15 يوم اعتمادا على درجة الحرارة. يتوفر هذا الطفيل تجاريا على شكل مؤمياوات تقفص خلال عملية الشحن تحت العديد من الاسماء التجارية منها: Aphel-line ab، Aphelin و Aphelsure وغيرها

ب-) الطفيل *Aphidius colemani* : ويعود لعائلته ال Aphidiidae من رتبة غشائية الاجنحة Hymenoptera وكان يعرف بالأسماء *Aphididius platensis* و *A.transcaspicus*. ان الموطن الاصلي لهذا الطفيل هو الهند ثم ادخل الى استراليا وافريقيا ووسط امريكا وكاليفورنيا وانكلترا والنرويج وهولندا. تم انتاج هذا الطفيل تجاريا بتربيته على من القطن *Aphis gossypii* او من الخوخ الاخضر *Myzus persicae* تحت ظروف البيت الزجاجي ويتم جمع مومياءات المن الحاوية على الطفيل ووضعها في عبوات وارسالها الى الزبائن لمكافحة حشرات المن.

الفاعلية الحيوية Biological Activity: الاناث البالغة للطفيل تضع البيض بشكل مفرد داخل اجسام حشره المن ويستمر المن المتطفل عليه

بالتغذية ونقل الفايروس وبعد فقس بيضه الطفيل تبدأ اليرقة بالتغذية على الأنسجة الداخلية لحشرة المن لحين اكمال الاعمار اليرقية الأربعة ثم تتحول الى عذراء داخل جسم حشره المن حيث تضع لها شرنقة قرب جدار جسم المن وبعد اكتمال طور العذراء تخرج بالغات الطفيل من جسم المن عن طريق ثقب تصنعه بنفسها.

الافتراس Predation: ان انثى الطفيل تستطيع ن تتطفل على 100-200 حشره من / 7 أيام، تستغرق دوره حياه هذا الطفيل بين 13-15 يوم اعتمادا على درجة الحرارة، يجهز هذا الطفيل تجاريا بشكل مومياءات المن محفوظه داخل قناني وتباع تحت العديد من الاسماء التجارية مثل Aphibank و Aphiline c و Aphisure (c) وغيرها ويتم اطلاقه في الحقول المصابة بمعدل 2-3 طفيل / متر مربع.

ت-) الطفيل *Aphidius ervi*: ويعود لعائله الـ Aphidiidae من رتبه غشائية الاجنحة وموطنه الاصلي اوربا واسيا وادخل الى تشيلي وكندا وامريكا واستراليا. يتم انتاجه بشكل زنابير حيه.

الفاعلية الحيوية Biological Activity: كما سبق ويستخدم بمعدل 2-3 طفيل / م مربع ويتوفر تحت العديد من الاسماء التجارية منها: - Ervi-system و Aphipar و Aphisure(e) وغيرها.

خامساً) أنظمة اداره المن Aphids management system:-

ان ارتفاع قيمه الحد الاقتصادي الحرج لمعظم انواع حشرات المن شجع العاملين في مجال مكافحة الآفات الزراعية على محاوله تصميم أنظمة لأداره

المن وذلك من خلال التكامل بين جميع طرائق مكافحة المتاحة. ويمكن تحقيق مثل هذه الانظمة من خلال اعتماد التكامل بين الطرائق الأتية:

1- النظافة: وذلك بزراعة الشتلات والنباتات الخالية من الإصابة بالمن وازاله الادغال والعوائل البديلة للمن مع ضرورة استخدام المعدات والادوات الزراعية النظيفة.

2- زراعة الاصناف المقاومة والمتحملة للمن

3- الدورة الزراعية المناسبة

4- استخدام الاعداء الحيوية

5- المكافحة الكيميائية للمن مع مراعاة ما يأتي:

أ- استخدام المبيدات بتركيز منخفضه

ب- استخدام المبيدات المتخصصة

ت- استخدام المبيدات الجهازية

ث- استخدام المبيدات بطريقه المعاملة البقعية او الجزئية

ج- اعتماد قيمه الحد الاقتصادي الحرج لتوقيت عمليه رش المبيدات

الفصل الثالث

الحشرات القشرية والبق الدقيقي

الآفات الجالسة

المقدمة

- تقسيم فوق عائله كوكسويديا **Coccoidea**
واقع الحشرات القشرية والبق الدقيقي في الوطن العربي
مميزات فوق عائله الحشرات القشرية
الأهمية الاقتصادية لفوق عائلة كوكسويديا
اهم الملامح الحياتية لحشرات فوق عائله كوكسويديا
النمل وحشرات فوق عائلة **Coccoidea**
دورة الحياة العامة للحشرات القشرية والبق الدقيقي
عوائل الحشرات القشرية ذات الأهمية الاقتصادية
عائلة الحشرات القشرية المدرعة **Diaspididae**
عائلة الحشرات القشرية الرخوة **Coccidae**
عائلة البق الدقيقي **Pseudococcidae**
عائلة القشريات العملاقة **Margarodidae**
مكافحة الحشرات القشرية والبق الدقيقي

المقدمة

ان مجموعه الحشرات القشرية والبق الدقيقي تشكل المجموعة الثانية ضمن مجاميع الحشرات الضارة بالنباتات الاقتصادية التابعة لرتبه نصفية الاجنحة حيث تضم (146) نوعا ضارا وتشكل ما نسبته 27.1 % من مجموع الانواع الحشرية الضارة بالنباتات في الوطن العربي. هذه المجموعة الحشرية تعود لفوق عائله Coccoidea التي تضم أكثر من 7500 نوع منتشرة في مناطق العالم المختلفة. سميت هذه الحشرات في البداية بـ Coccids والمشتق من Coccus والتي تعني التوت Berry، تتغذى هذه الحشرات الصغيرة على العديد من الانواع النباتية وبطريقه مخفيه Cryptic غير ظاهره للعيان لذلك فهي تعد افات مهمه على العديد من النباتات الاقتصادية لما تسببه لتلك النباتات من اضرار وخسائر اقتصاديه. ان مهمه الفصل الحالي تتمثل في بيان الأهمية الاقتصادية لهذه المجموعة من الحشرات، فضلا عن تسليط الضوء على اهم الجوانب البيئية والحياتية والاساليب المعتمدة في مكافحتها.

تقسيم فوق عائله كوكسويدا Coccoidea classification

تعود فوق عائله Coccoidea الى تحت رتبه Sternorrhyncha من رتبه نصفية الاجنحة Hemiptera، وقد وضع علماء التصنيف الانواع التي تعود الى فوق عائله ال Coccoidea في (22) عائله هي كما يأتي:

عائله قشريات الحشائش Aclerididae (Grass Scale)

عائلة القشريات ذات النقر (Pit Scale) Asterolecanidae

Beelsoniidae

Carayonemidae

عائلة قشريات النقر المزركشة Cerococcidae (Ornate Pit Scale)

Coccidae (Soft Scale)	عائله القشريات الرخوة
Conchaspididae (False Armored Scale)	القشريات المدرعة الكاذبة
Cryptococcidae (Bark Crevice Scale)	قشريات شقوق القلف
Dactylopiidae (Cochineal Scale)	قشرية الكوشينيل
Diaspididae (Armored Scale)	القشريات المدرعة
Eriococcidae (Felted Scale)	القشرة اللبادية
Halimococcidae	
Kermesidae (Gall-Like Scale)	القشريات الورمية
Kerridae (Lac Scale)	قشريات اللك
Lecanodiaspididae (False Pit Scale)	القشريات ذات النقر الكاذبه
Margarodidae (Giant Scale)	القشريات العملاقه
Micrococcidae	
Ortheziidae (Ensign Scale)	القشريات ذات الشعار
Phenacoleachiidae	
Phoenicoccidae (Date Scale)	قشريات النخيل
Pseudococcidae (Mealybugs)	البق الدقيقي
Stictococcidae	
Integrated Taxonomic Information System في التقسيم الحديث حسب الـ	
System نظام المعلومات التصنيفية المتكامل تم دمج العوائل السابقة في	
(13) عائله فقط هي:	
1-) Aclerdidae	8-) Kermesidae
2-) Asterolecaniidae	9-) Kerridae
3-) coccoidae	10-) Lacciferidae
4-) Conchaspididae	11-) Margarodidae
5-) Dactylopiidae	12-) Ortheziidae
6-) Diaspididae	13-) Pseudococcidae
7-) Eriococcidae	

واقع الحشرات القشرية والبق الدقيقي في الوطن العربي

ان انواع الحشرات القشرية والبق الدقيقي المسجل وجودها في الوطن العربي على انها افات على العديد من النباتات الاقتصادية تعود للعائلات الآتية:

- 1-) Asterolecaniidae
- 2-) Coccidae
- 3-) Diaspididae
- 4-) Eriococcidae
- 5-) Kermesidae
- 6-) Kerridae
- 7-) Margarodidae
- 8-) Ortheziidae
- 9-) Pseudococcidae

ان الجدول (1-3) يوضح عدد الاجناس والانواع المسجلة في كل من للعائلات السابقة في الوطن العربي.

الجدول (1-3) اجناس وانواع الحشرات القشرية والبق الدقيقي الموجودة في البلاد العربية بحسب العائلات التي تنتمي اليها

النسبة المئوية بحسب		عدد الانواع	عدد الاجناس	اسم العائلة
الأنواع	الاجناس			
2.73	3.27	4	2	Asterolecaniidae
28.08	22.95	41	14	Coccidae
45.20	45.90	66	28	Diaspididae
0.68	1.63	1	1	Eriococcidae
0.68	1.63	1	1	Kermesidae
0.68	1.63	1	1	Kerridae
4.79	6.55	7	4	Margarodidae

0.68	1.63	1	1	Ortheziidae
16.43	14.75	24	9	Pseudococcidae
100	100	146	61	المجموع

المصدر: الملاح، نزار مصطفى (2010) معجم الملاح في الاسماء العلمية والعربية الشائعة للحشرات الضارة في الوطن العربي. دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمان، الاردن.

من الجدول (3-1) يتضح انه يمكن القول ان العوائل الرئيسية في الوطن العربي التي تضم معظم انواع الحشرات القشرية والبق الدقيقي تعود للعوائل Margarodidae و Pseudococcidae و Coccidae و Diaspididae والمرتبة تنازليا بحسب عدد الانواع والاجناس التي تضمها.

مميزات فوق عائله الحشرات القشرية

Coccoidea Characteristics

ان لفوق عائله Coccoidea العديد من الصفات المظهرية والحياتية التي تميزها عن بقية الانواع التابعة لرتبة متشابهة الاجنحة ومن اهم الصفات المميزة لها ما يأتي: بالنسبة للإناث

1- اناثها عديمة الاجنحة وقليله او عديمة الحركة
2- اجسامها مغطاة بمسحوق شمعي او قشرة قوية او يكون جدار جسمها صلبا

3- عديمة الارجل

4- قرنا الاستشعار مفقودان او موجودان بدرجات مختلفة من النمو

5- اجزاء فمها تقع في مقدم السطح البطني للجسم

اما الذكور فتتميز بما يأتي:

1-) صغيره الحجم ودقيقة لها زوج واحد من الاجنحة وهو الزوج الامامي من الاجنحة ذات العروق القليلة والمختزلة وفي احيان نادرة جدا يكون الذكر

غير مجنح

2-) للذكر قرون استشعار تحوي 10-25 عقلة


3-) لنهاية البطن خيط طويل وأحيانا خيطين

4-) اجزاء الفم ضامرة وهو لا يتغذى

5-) الارجل موجودة (الشكل 3-1)

ان الصفات السابقة يجب ان لا تتسببنا ان هذه المجموعة من الحشرات تشترك مع بقية انواع رتبة متشابهة الاجنحة في انها تملك اجزاء فم ثاقبه ماصه وان التحول فيها هو من النوع التدريجي.

وتتميز حشرات البق الدقيقي عن الحشرات القشرية بوجود الغطاء الشمعي الابيض الدقيقي الذي يغطي اجسامها وقد يشبه القطن احيانا، اما الانثى فتكون بيضاوية الجسم واضحة الحلقات وأرجلها ناميه.



الشكل (3-1) ذكر الحشرات القشرية

مفتاح تقسيمي للتمييز بين عائلات فوق العائلة كوكسوئديا

Key to the Families of Coccoidea

يمكن تمييز فوق عائلة Coccoidea عن بقية فوق عوائل رتبة نصفية الأجنحة بالصفات الآتية:

1-) الرسغ ذو عقلة واحدة ومخالب واحد عند وجود الأرجل

2-) الانثى عديمة الأجنحة وغالبا عديمة الأرجل

3-) شكلها قشري او دودي مغطاة بغطاء شمعي

4-) الذكر مجنح بزوج واحد من الأجنحة وعديم الخرطوم

ويمكن تمييز عوائلها باستخدام المفتاح الآتي:

1-) الفتحات التنفسية البطنية موجودة، للذكر عين مركبه وعيون بسيطة

.....2، الفتحات التنفسية البطنية مفقودة، للذكر عيون بسيطة فقط

3.....

2-) الحلقة الشرجية مميزة ومسطحة وتحمل عدة مسامات Pores وست

شعيرات طويله Ortheziidae، الحلقة الشرجية مختزلة

ويدون مسامات ولاشعيرات Margarodidae

3-) الحلقات النهائية في مؤخره الانثى ملتحمة سوية مكونة العجز، الانثى

ذات قشره شمعيه منفصلة عن الجسم، قرن الاستشعار اثري، الأرجل

مفقودة، الخرطوم ذو قطعة واحدةDiaspididae، ليس

للأنثى عجز، الأرجل وقرون الاستشعار موجودة او مفقودة، الخرطوم ذو

أكثر من قطعه واحدة4

4-) مؤخره الجسم مشطورة ذات شطرين، فتحات غدد الشمع نادرا ما تكون

بشكل رقم 85، نهاية الجسم غير مشطوره، وان كانت كذلك

فدرجة خفيفة وتكون عندئذ فتحات غدد الشمع بشكل الرقم 8

.....

6.....

(-5) المخرج مغطى بصفيحة ظهريه واحدة Aclerdidae.....

المخرج مغطى بصفيحتين ظهريتين (ونادرا بدون صفائح)

Coccidae.....

(-6) البطن اضيق في جزئها الخلفي او ممتدة بشكل انبوب شرجي، الجسم

مطمور ضمن خليه صمغيه Kermesidae.....، البطن لا تضيق

في مؤخرتها ولا ممتدة بشكل انبوب شرجي، وان كانت كذلك فتكون عندئذ

ذات مسامات Pores بشكل رقم 8، الجسم ليس بضمن خليه صمغيه

7.....

(-7) فتحات غدد الشمع موزعه بشكل ازواج غالبا عند حواف الظهر وعادة

بشكل صفوف على شكل رقم 8، الخرطوم قطعه واحدة، الارجل اثريه او

مفقودة في الانثى الكاملة، الحلقة الشرجية مزودة بشعيرات، عادة تصيب

البلوط Asterolecaniidae.....، فتحات غدد الشمع على الظهر

ليست بشكل الرقم 8 8.....

(-8) الحلقة الشرجية موجودة 9.....،

الحلقة الشرجية مفقودة 11.....

(-9) الحلقة الشرجية بشعيرتين وهي ليست خلوية Diaspididae.....،

الحلقة الشرجية بأربع شعيرات او أكثر وغالبا خلوية

10.....

10-) توجد فتحتان ظهريتان صغيرتان و 1-4 فتحات وسطية بطنية، الحشرات الحية مغطاة بإفرازات شمعية دقيقة Pseudococcidae.....، الفتحات الظهرية والبطنية اعلاه مفقودة، الحشرات الحية غير مغطاه عادة بإفرازات شمعية دقيقة Eriococcidae....

11-) قنوات غدد الشمع دقيقة وتنشأ من مركز كتله مسامات جالسه، الشعيرات قوية ومقطوعه النهائية، تصيب نباتات الصبير Dactylopiidae.....، قنوات غدد الشمع ليست كما هي اعلاه، الحشرات تعيش على البلوط Kerridae.....

الاهمية الاقتصادية لفق عائله كوكسويديا

ان معظم انواع هذه المجموعة الحشرية تعد افات مهمة على اشجار الفاكهة والغابات ونباتات الزينة في المشاتل والبيوت الزجاجية والمنازل فضلا عن مهاجمتها للمحاصيل الزراعية المختلفة. لقد قدرت الخسائر الناجمة عن اصابة النباتات المختلفة بهذه الحشرات في دول العالم المختلفة بما يزيد على خمسة بلايين دولار، فيما قدرت الخسائر التي تحدثها هذه الحشرات في الولايات المتحدة الأمريكية بـ 500 مليون دولار سنويا، وإذا اضعفنا لذلك تكاليف عملية مكافحة الحشرات القشرية والبق الدقيقي فأننا سنجد أنفسنا امام ارقام كبيرة جدا تدل على الاهمية الاقتصادية الكبيرة لفق عائله كوكسويديا.

ان الأهمية الاقتصادية لأي مجموعة حشرية يمكن ان تنشأ من مجمل الاضرار التي يمكن ان تسببها تلك المجموعة الحشرية للمحاصيل الزراعية المختلفة، وعليه فان الاهمية الاقتصادية للحشرات القشرية والبق الدقيقي يمكن

ان تنشأ من الاضرار التي تسببها للنباتات المزروعة والتي يمكن اجمالها بالآتي:

1- امتصاص العصارة النباتية:- ان وجود اعداد كبيرة من الحشرات القشرية والبق الدقيقي يعمل على امتصاص العصارة النباتية واستنزاف المواد الغذائية للنبات وتعطل سريانها خلال انسجة النبات مما يجعلها اقل صلاحية لتوفير الغذاء لذلك العضو وهذا يؤدي في النهاية الى انخفاض حيوية النبات وموت نهايات الافرع Dieback واصفرار الاوراق وتساقطها، فضلا عن تشوه الثمار وصغر حجمها وتساقطها وقد تنتهي الإصابة بموت النبات.

2- افراز الندوة العسلية:- ان غزازه الندوة العسلية التي تفرزها الحشرات القشرية والبق الدقيقي هي اقل مما عهدناه في حشرات المن (راجع الفصل الثاني). ان غزازه الندوة العسلية تعتمد على مقدار ما تمتصه الحشرات القشرية والبق الدقيقي من العصارة النباتية وعلى الحالة الفسلجية للنبات العائل. ان اضرار الندوة العسلية يمكن تلخيصها في:

أ- خفض عملية التركيب الضوئي للنبات من حجبها لأشعة الشمس جراء تراكم الغبار ونمو فطريات العفن الاسود على الاوراق بما يؤدي في النهاية الى خفض انتاجيه النبات


ب- تساقط الندوة العسلية على ما يوجد تحت الاشجار المصابة من سيارات ومعدات زراعية او اسلحة منزليه قد يؤثر في جماليتها

3- جرح النسيج النباتي:- ان تغذيه بعض انواع حشرات الكوكوسيديا Coccoidea على النباتات قد يتسبب في جرح بشره النبات بفعل اجزاء

فمها الإبرية مسببه جروحا مفتوحة تكون مدخلا للعديد من مسببات امراض النبات، مثال ذلك وجد ان اصابه اشجار الزان بحشرة الزان القشرية Beech Scale كان السبب في ظهور مرض قلف الزان بشكل وبائي.

4- الاورام:- ان العديد من الانواع التابعة للعوائل Eriococcidae و Asterolecanidae و Beesoniidae يمكن ان تؤدي تغذيتها الى ظهور انواع متباينة من الاورام Galls على عوائلها، ان حدوث هذه الاورام والتشوهات في المناطق المحيطة بموقع التغذية ناجم عن حقن لعاب الحشرة في نسيج العائل والذي قد يحوي بعض التوكسينات التي تعمل كمنظمات نمو (الشكل 3-2). ان الاورام التي تصنعها الحشرات القشرية تكون على نوعين هما:

أ- اورام مغلقة: سجل وجود هذه الاورام في بعض الانواع الأسترالية التي تنمو وتتطور داخل هذه الاورام الموجودة على الاوراق والسيقان والاعصان، ان الانواع التي تعيش داخل الاورام المغلقة تمتاز بصفات مظهرية معينة تتمثل برأسها الكبير ووجود. المزيد من الثغور التنفسية في منطقة الصدر الخلفي للحشرة، اما في حشرات عائله Beesonidae فان هناك فتحات تنفسية اخرى قرب فتحة الشرج. اما الانواع المكونة للأورام من الجنس *Apiomorpha* فتمتاز ببطنها المتطاولة ذات الخصر.



الشكل (2-3) يمثل نوعان من الاورام التي تصنعها حشرات **Coccids**

(a) ورم صننعه انثى الحشرة **Apiomorpha**

minuta على ساق اليوكالبتوس (b) عنقود من الاورام

تحتوي ذكور **A. minuta** على اليوكالبتوس.

ب- الاورام المفتوحة:- هذه الاورام تكون بشكل منخفضات سطحية او

حفر تصنعها الانواع التابعة لعائتي **Asterolecaniidae**

و **Lecanodiaspididae**، اما حشرات البلوط القشرية الذهبية فتصنع

اورام مفتوحة مميزة على البلوط، فيما تبدو الاورام المفتوحة التي

تصنعها حشرات نبات الصمغ الحلو القشرية **Sweetgum Scale**

فتبدو كبقع حمراء الى بيضاء اللون على السطح السفلي لأوراق نبات

الصمغ الحلو Sweetgum

5-) اثار التغذية وافرازات الحشرة:- وجميعها تلعب دورا في خفض القيمة التجارية والتسويقية لثمار الفاكهة المصابة بالحشرات القشرية والبق الدقيقي وخاصة بالنسبة لنباتات الزينة. ان اعراض تغذية هذه الحشرات تظهر في الاماكن المحيطة بمواقع التغذية على شكل بقع باهته فاقدة لونها الاخضر Chlorotic Spots. اما في الحشرة سان جوز Sanjose القشرية فان اماكن تغذيتها تظهر بشكل حلقات حمراء على التفاح فيما تنتج الحشرة القشرية الحمراء في فلوريدا مناطق مستديره باهته او شاحبه على ثمار الحمضيات. ان افرازات هذه الحشرات المتمثلة بالمسحوق الدقيقي وقشور او اغطيه هذه الحشرات قد تتراكم مع مرور الاجيال المتعاقبة سوف تشكل قشرة او غلاف يحيط بسيقان وأفرع هذه النباتات مما ينتج عنه العديد من الاضرار وخفض القيمة التسويقية لتلك النباتات.

6-) نقل الفايروسات:- ان لحشرات البق الدقيقي التابعة لعائتي الـ Pseudococcidae و Coccidae القدرة على نقل بعض الفايروسات الممرضة للنبات، الا انها اقل كفاءه في نقل الفايروسات مقارنة ببقية الحشرات الناقلة وذلك لبطء حركتها على النباتات لأنها عديمة الاجنحة وتعتمد في حركتها وتنقلها بين النباتات على ارجلها وعلى الرياح، كما يلعب النمل دورا مهما في حملها ونقلها، وقد سجلت العديد من انواعها ناقلات لعدد من الفايروسات المهمة اقتصاديا خاصة في المناطق

الاستوائية ومنها تلك الفايروسات التابعة لجنس Badnavirus التابعة لعائلة Caulimoviridae وعدد من الفيروسات التابعة لجنس Closterovirus من عائله Closteroviridae ولجنس Vitivirus.

ان الفايروسات المنقولة بالبق الدقيقي هي:

أ- الفايروس الثالث المرافق لفايروس النفاق اوراق العنب (GLRaV-3)

وينقله البق الدقيقي *Planococcus citri*

ب- الفايروس الاول المرافق لذبول الاناناس (PMWaV-1) فينقله

النوعان بق الاناناس الوردي *Dysmicoccus brevipes* وبق

الاناناس الرمادي *D. neobrevipes*

ت- فايروس تضخم انواع الكاكاو (CSSV) هذا الفايروس سجلت له ستة

انواع ناقله منها البق الدقيقي *Pseudococcus nijilansis* الذي

يكتسب الفايروس خلال 20 دقيقة علما بان الحشرة تحتاج الى 16

دقيقة لاخترق انسجة الورقة وتبقى الحشرة حاملة للفايروس لمدة ثلاث

ساعات تقريبا.

ث- فايروس العنب اي (GAV)

ج- فايروس العنب بي (GVB)

ان الاضرار السابقة يجب ان لا تنسينا ايضا ان للحشرات القشرية العديد من

الفوائد التي يمكن ايجازها في النقاط الآتية:

1- انتاج الشيلاك Shellac من الخلايا الغدية للبشرة الداخلية لبعض

الحشرات القشرية الهندية والذي يستخدم كدهان لتلميع الاخشاب والمعادن

والجلود ولعمل اسطوانات التسجيل.

2-) استخراج صمغ اللاك من حشرة البق الدقيقي الهندية *Laccifer lacca* Kerr. التي تعيش على اشجار الغابات في الهند وبورما.

3-) انتاج بعض الصبغات مثل صبغه ال *Cochineal* القرمزية اللون والتي تستخرج من بطون الاجسام الجافة لحشرة الصبير القشرية *Dactylopus* *COCCUS* (casta) حيث تستخدم في تزيين بعض المعجنات الغذائية، كما ان لها استخدامات طبية في معالجة بعض الامراض مثل مرض السعال الديكي *Whooping cough*.

4-) ان القشور الشمعية البيضاء للحشرة القشرية الشمعية الصينية استخدمت في صناعة الشموع والتماثيل في الصين لاستخدامها في المناسبات الدينية كرمز للطهارة والنقاء.

5-) في المكسيك وامريكا الوسطى استخدمت الحشرة القشرية *Cerococcus* *quercus* كمصدر لإنتاج الصمغ وانتاج علكه المضغ *Chewing Gum*.

6-) ان العديد من الحشرات القشرية والبق الدقيقي كانت فعالة في مكافحة الحيوية للعديد من الادغال.

اهم الملامح الحياتية لحشرات فوق عائله الكوكسويديا

Important Biological Features of Coccoidea

للحشرات القشرية والبق الدقيقي العديد

من الملامح الحياتية المميزة لها، والتي من اهمها ما يأتي:

أولا) الاغطية القشرية **Scale Covers**:- يعد وجود الاغطية القشرية

الواقية واحدة من اهم مميزات الحشرات القشرية الاكثر وضوحا ومن ضمنها

البق الدقيقي يختلف مظهر هذه الأغشية من افرازات على شكل مسحوق Powdery الى اغطيه شمعية صلبة او رخوة تغطي الجسم بشكل كامل، ويفرز الشمع المكون لهذه الاغشية من فتحات تفتح على جدار الجسم وترتبط هذه الفتحات بقنوات تتصل بالغدد المفرزة للشمع والتي تنشأ من طبقة البشرة. ان شكل وتركيب هذه الأغشية يتباين في الحشرات القشرية والبق الدقيقي وكما يأتي:

1- في انواع عائله Pseudococcidae تتباين هذه الأغشية من اغشية

بمسحوق شمعي ابيض الى اغشية بخيوط شمعية طويلة.

2- في عائله Ortheziidae تكون اجسام انواعها مغطاة بمجموعة من الصفائح الشمعية المتعاقبة.

3- انواع عائله Kerridae تتجمع وتقوم بإفراز مركب اللاك المرن Flexible lac الذي يعمل على حمايتها.

4- في عائلتي Asterolecaniidae و Lecanodiaspididae تقوم انواعهما بإفراز قشور ورقية الى شمعيه تغطي افرادها المتواجدة في حفر او اماكن مجوفة على عوائلها النباتية.

5- انواع عائله Eriococcidae تقوم بإفراز كيس يشبه الكيس المصنوع من اللباد Felt-Like Sac يغلف الانثى بشكل كامل.

6- اما انواع عائله Coccidae فأنها تكون اشكالا مختلفة من القشور او الأغشية تتراوح من الشبيهة بكيس اللباد كما في انواع جنس *Eriopeltis* والورقية كما في الجنس *Lecanium* والشمعية في الجنس *Ceroplastes* الى القطنية في الجنس *Pulvinaria*.

7-) في عائله Beesoniidae يلاحظ ان الاناث تنمو وتتطور داخل الاورام وبالتالي فأنها لا تحتاج الى انتاج مثل هذه القشور لتغطية اجسامها.

8-) في حشرات عائله Margarodidae تكون الافرازات الشمعية غزيرة حيث تتساقط او تتدفق فوق جسم الحشرة مكونة اغشية تشبه الكيس -Cyst Like covering.

ان القشور والأغشية السابقة بأشكالها المختلفة لها العديد من الفوائد والتي يمكن اجمالها في الاتي:-

1-) ان القشور الواقية والاعطية الشمعية توفر البيئة الدقيقة Micro environment المناسبة للحشرات القشرية حيث تحافظ على المستويات المفضلة من الرطوبة وتمنع التغيرات السريعة في درجات الحرارة.

2-) تعمل كحاجز ضد المفترسات والطفيليات.

3-) ان اشكال والوان القشور والاعطية الشمعية تأخذ في الغالب اشكال والوان الخلفيات او السطوح التي تستقر عليها تلك الحشرات، ومن الأمثلة على ذلك:

أ- قشرية كاليكو Calic Scale يكون لون قشرتها احمر زاهي الى احمر داكن مع وجود خطوط بيضاء حيث تشبه في مظهرها هذا الحمار الوحشي.

ب- حشرات اخرى تكون ذات خلفية مظلمة مع وجود مجموعة من البقع البيضاء غير المنتظمة موزعة على محيط الجسم مما يجعلها اقل جذبا للطفيليات والمفترسات.

ت- بعض حشرات البق الدقيقي تتجمع في مجاميع صغيرة لتعطي مظهرا يشبه حبة التوت.

ث- ان الانواع التابعة لعائلة Kermesidae تشبه في مظهرها الاورام او براعم النبات.

ثانياً) انتخاب العائل النباتي **Host – Plant Selection**:- ان تاريخ وجود حشرات فوق عائلة Coccoidea يعود الى العصر الطباشيري Cretaceous وهو عصر ظهور النباتات كاسيه البذور Angiosperm والتي تمثل المظهر النباتي السائد في ذلك الوقت مما اضطر الحشرات القشرية والبق الدقيقي على التكيف والتأقلم للتغذية على العوائل النباتية من كاسيات البذور، ويبدو ان هذا التأقلم كان ناجحاً بدليل ان الغالبية العظمى من انواع فوق عائلة Coccoidea توجد اليوم على النباتات من كاسيات البذور، فيما توجد انواع قليلة منها على نباتات عاريات البذور Gymnosperm، ويمكن تقسيم حشرات فوق عائلة Coccoidea بحسب عدد العوائل النباتية التي تتغذى عليها الى:

1- حشرات وحيدة العائل Monophagous: مثال ذلك قشرية نبات

الصمغ الحلو Sweetgum Scale.

2- حشرات محدودة العوائل الغذائية Oligophagous وهي الحشرات

التي تتغذى على عدد محدود من العوائل وعادة تعود لنفس الجنس،

مثال ذلك حشرة البلوط القشرية Kermes Oak Scale، او على

نباتات من عائلة واحدة مثل حشرة الحشائش المستوية Flatgrass

Scale التي تهاجم نباتات العائلة النجيلية Graminacae

3- حشرات متعددة العوائل الغذائية Polyphagous: ومثالها قشرية

العرعر Juniper Scale من العائلة الصنوبرية فضلا عن مهاجمتها

لنباتات العائلة Taxodiaceae، كذلك فإن العديد من انواع عائلة Pseudococcidae تتغذى على العديد من الاشجار متساقطة الاوراق فضلا عن مهاجمتها للصنوبريات.

ان العديد من عوائل الـ Coccoidea تمكنت انواعها من عمل علاقات متخصصة مع بعض العوائل النباتية، مثال ذلك:

1- ان العديد من انواع عائله Dactylopiidae تخصصت في التغذية على نباتات الصبير Cacti.

2- في عائله Halimococcoidae هناك العديد من الانواع التي تخصصت في مهاجمة النخيل وتشترك معها انواع Phoenicococcoidae.

3- معظم انواع عائله Kermesidae تتغذى على اشجار البلوط المختلفة.

4- ان الحشرات من عائله Eriococcidae وخاصة تلك التابعة للجنس *Apiomorpha* فأنها تتغذى بشكل خاص على اشجار اليوكالبتوس.

اضافة لما سبق فان بعض انواع الحشرات القشرية تفضل النباتات التي تعيش في بيئات محددة، مثال ذلك وجد ان حشرات عائله Ortheziidae تفضل مهاجمة النباتات الموجودة في المروج الخضراء التي تمتاز بالرطوبة المرتفعة ووجود الطحالب وفي الاراضي المنحدرة ومناطق الغابات. يعد الطور الزاحف المتحرك هو الطور المسؤول عادة عن ايجاد العائل الغذائي المناسب وكذلك موقع التغذية المناسب على العائل، وان الانتشار يتم بواسطة حركه الاطوار

الزاحفة من شجرة لأخرى بواسطة الرياح او على اجسام الحشرات الاخرى او العناكب والحلم والطيور والثدييات. حيث تقوم بعد يوم او يومين من فقس البيض بالهجرة او الانتقال اما بواسطة المشي او بمساعدة الرياح الى اماكن تغذية جيدة موجودة على النبات العائل او على النباتات المجاورة وعند عثورها على الموقع المناسب تقوم بتثبيت نفسها بإدخال اجزاء فمها والبدء بالتغذية لحين البلوغ. اما بالنسبة لتوزيع الحشرات القشرية والبق الدقيقي على عوائلها النباتية او اختيارها لموقع التغذية فيعتمد على الوقت من السنة وتوفر المكان او الحيز وطور الحشرة ونوع العائل النباتي وفيما يأتي بعض الامثلة الخاصة بتوزيع حشرات الكوكسوئديا:

- 1- تتغذى حشرة بق ال *Solenopsis* الدقيقي في الصيف على منطقة التاج لعائلها النباتي ولكنها تنتقل الى الجذور قبل حلول الشتاء.
- 2- في العديد من الحشرات القشرية لوحظ ان زاحفات الذكور تفضل الاستقرار على الاوراق فيما تميل زاحفات الاناث للاستقرار على الجذوع والافرع كما هو الحال في قشرية الطرفة السوداء *Black Willow Scale*
- 3- تعد عروق ورقة النبات العائل من المواقع المفضلة لتواجد ونمو الزاحفات ذلك في الانواع التي تفضل زاحفاتها الأوراق.
- 4- العديد من الانواع تفضل التغذية على الجهة السفلية للأفرع والاعصان التي تهاجمها هربا من الظروف الجوية غير الملائمة او التعرض لأشعة الشمس المباشرة.
- 5- انواع اخرى من الحشرات القشرية لم تظهر اختلافات في اماكن تواجدها ما بين الاوراق او السيقان كمواقع مفضلة لها.

ثالثاً) التباين المظهري **Morphological Variation**:- يتباين المظهر الخارجي للحشرات القشرية والبق الدقيقي تبعاً للعديد من العوامل والتي من أهمها:

1- الجنس:- ويقصد بها الأشكال ثنائية الجنس Sexual dimorphism حيث تختلف أشكال الإناث البالغة عن الذكور حيث تكون الإناث البالغة كثرية الشكل Pyriform او شبه مستديره Subcircular او اهليلجية Ellptical وغير مجنحة فضلا عن عدم وجود تخصر او حد فاصل بين الرأس والصدر. العيون البسيطة قد تكون موجودة كما في انواع عائلات Margarodidae و Ortheziidae و Phenocoleachiidae فيما تختزل العينات لتصبح على هيئة برورات دقيقة او بقع ملونة في عائلات اخرى او تغيب تماما. تتراوح عقل قرن الاستشعار بين 0-13 عقلة اما الذكور فتكون مخططة طوليا وتتميز فيها مقاطع الجسم (الرأس والصدر والبطن) وللذكور زوج من الأجنحة وزوج من قرون الاستشعار التي تتكون من 9-10 عقل واجزاء فمها اثرية مع وجود زوج من العيون المركبة الملاحظ وجودها في ذكور عائلتي Margarodidae و Ortheziidae و عيون بسيطة ظهرية وبطنية في معظم الانواع التابعة للعوائل الاخرى.

2- الازدحام:- ان شكل وحجم الحشرات القشرية غالبا ما يتأثر بالكثافة السكانية، حيث وجد في حالات الزحام ان قشور الحشرة تنمو بشكل غير اعتيادي حول اناث اخرى او حول النتوءات الموجودة على العائل كما في قشرية المحار Oystershel Scale.

3-) الموقع على العائل:- غالبا ما يؤثر موقع هذه الحشرات على العائل في شكل الافراد، حيث وجد ان الانواع التي تتغذى بين اغصان الاوراق وسيقان الحشائش تعطي المظهر المسطح او المستوي للحشرة، كما في الانواع التابعة للأجناس *Chaetococcus* و *Antonina* و *Aclerda*. اما الحشرات القشرية من عائلة *Kermesidae* التي تتغذى على اغصان النبات العائل فأنها تأخذ الشكل الكروي او شكل الاورام او العقد.

4-) نوع العائل النباتي.

رابعاً) دورة الحياة :- تتباين دورة الحياه في الانواع التابعة لفوق عائله *Coccoidea* تبعا للعائلة التي ينتمي اليها النوع والى النوع الحشري نفسه فضلا عن اختلاف مراحل النمو ما بين الاناث والذكور، هذا التباين يمكن ان نجده من خلال ما يأتي:

1-) معظم انواعها لها جيل او جيلين في السنة ولبعض انواعها عدة اجيال.

2-) ان الانواع متعددة العوائل الغذائية *polyphagous* يكون لها جيلين او أكثر في السنة.

3-) ان جميع مراحل النمو تكون موجودة عادة خلال السنة في الانواع ذات الاجيال المتعددة.

4-) تتأثر فترة الجيل وفترات نمو الاطوار المختلفة للحشرات القشرية بدرجات الحرارة والرطوبة ونوع العائل الغذائي، اذ ان فترة الجيل لعدد من الانواع قد يستغرق عدة سنوات، مثال ذلك بق البيسيه الدقيقي *Spruce Mealybug* الذي يحتاج أربع سنوات لإكمال دورة حياته، وكذلك الحال مع الحشرة القشرية التشيلية *Margarodes vitium* تبقى متكيسه *cyst* في التربة لمدة 7-8 سنوات وبعد سقوط الامطار بغزارة تخرج الاناث البالغة.

خامساً) التكاثر وسلوك التزاوج:- تتكاثر حشرات فوق عائله Coccoidea اما من خلال التلقيح المباشر بين الذكور والاناث Bisexually او عن طريق التكاثر العذري Parthenogenesis فيما قسم من انواعها تكون خنثيه Hermaphrodit ان التكاثر العذري سجل وجوده في قشرية البلوط الذهبية Golden Oak Scale والقشرية الرخوة البنيه Brown Soft Scale ويعتقد ان هذا النوع من التكاثر يزيد من القدرة التكاثرية لأنواع الموجودة في البيئات المناسبة. ان الانواع من الـ Coccoidea يمكن ان تجمع بين التكاثر الجنسي والعذري كما في قشرية الدفله. فيما يعد التكاثر الخنثي من أكثر اشكال التكاثر النادرة التي سجلت في انواع من قشريات الـ Cottony cushion Scale ان سلوكية التزاوج عادة تكون مرتبطة بتلك الانواع التي تتكاثر او تتلقح جنسيا ولعل من اهم هذه السلوكيات ما يأتي:

1- ان عملية التودد والغزل تكون محدودة في اناث الانواع التي تمتلك قشور واقية تغطي اجسامها حيث عادة ما تكون مستقرة بطبيعتها.

2- سجل وجود الفيرومونات الجنسية في بعض الانواع مثل حشرة سان خوزيه القشرية San Jose Scale التي تنتج اناثها الفيرومونات الجنسية لجذب الذكور. ولإطلاق الفيرومون تقوم الاناث العذراء بتحريك قطعه العجز Pygidial من تحت القشرة لتقوم بإطلاق الفيرومون الجنسي وجذب الذكور.

3- في الانواع التابعة لعائتي Pseudococcidae و Dactylopiidae يلاحظ ان الاناث تبحث وبنشاط عن ذكور للتزاوج، ففي الانواع التابعة لجنس *Pseudococcus* حيث يعيش كلا الجنسين بعيدا عن الاخر

خلال الشتاء حيث توجد الاناث على الافرع الصغيرة لعائلها النباتي فيما توجد الذكور الساكنة او تلك الموجودة في الطور العذري على سيقان اشجار عوائلها، وفي بداية الربيع تبزغ الاناث وتنشط قبل الذكور حيث تتحرك متجهه الى ساق الشجرة بحثا عن الذكور. بعد التزاوج تعود الاناث ثانية الى الافرع لبناء وتكوين كيس البيض ووضع البيض، وفي الخريف تتمايز الحوريات الناتجة عن البيض حيث تنزل الذكور الى ساق الشجرة لغرض التعذير فيما تبقى الحوريات الانثى على الافرع.

4-) في حشرات عائلة *Kermesidae* وكما في حشرة البلوط القشرية الحمراء الشمالية حيث تنزل حوريات الذكور الى الجزء السفلي من الشجرة وقد تغادر الشجرة لتعذر في التربة فيما تبقى الاناث على الافرع وعند بزوغ الذكور تطير الى الافرع بحثا عن الاناث للتزاوج معها.

سادساً) **وضع البيض وحمايته:** - بعد الانتهاء من عملية التزاوج تبدأ الاناث بوضع البيض تحت الغطاء او الدرع القشري او في كيس البيض ويتراوح عدد البيض الذي تضعه الاناث بين 100-5000 بيضه / انثى وخلال فتره وضع البيض يحدث انكماش في اجسام اناث العديد من الانواع التابعة لعائلي *Asterolecaniidae* و *Diaspididae* لتتغلغل في النهاية التلث الامامي من الغلاف الشمعي او الدرع فيما يحتل البيض الحيز الاكبر.

بعد وضع البيض تقوم الاناث بحمايه البيض خلال مراحل النمو الجنيني فضلا عن حماية الاطوار الزاحفة حديثة الفقس، ولعل من اهم وسائل حشرات الـ *Coccoidea* في حماية بيضها من التغيرات المناخية ومن الاعداء الطبيعية ما يأتي:

1- (الاعطية القشرية او الدروع: حيث تضع الاناث بيضها تحت قشرة او درع الانثى حيث توفر هذه القشرية الحماية الكافية للبيض من الظروف البيئية الغير الملائمة ومن الاعداء الطبيعية.

2- (اكياس البيض: ان الانواع الحشرية التابعة للعائلات Margarodidae و Orthezidae و Coccidae تضع بيضها داخل اكياس وان نوع الكيس وشكله وعدد البيض في الكيس يختلف باختلاف النوع الحشري فقد يغطي كيس البيض جسم الحشرة او قد يتقلص ليغطي فقط جزء من البطن. في عائله Orthezidae تنتج الاناث كيس بيض أسطواني متطاوول لكي تضع فيه البيض، في حين ان انواع عائله Eriococcidae وبعض انواع الـ Coccidae تصنع كيسا يشبه اللباد Felted Sac لكي تضع فيه بيضها.

3- (الجيوب الكيوتكالية: وهي من الوسائل الغربية المستخدمة في حماية البيض التي تلاحظ في بعض انواع عائله Margarodidae حيث يلاحظ نشوء تجويف عميق في الكيوتكل تضع فيه الاناث البيض.

4- (الاحتفاظ بالبيض داخل جسم الانثى: العديد من انواع الـ Coccoidea مثل بق الاناناس الدقيقي والبق الدقيقي الشعري وحشرة التوليب القشرية تضع اناثها بيضا يفس داخل جسم الانثى وبعد الفقس تقوم الاناث بحجب الاطوار الزاحفة لفترة قصيرة بتغطيتها بقشورها.

النمل وحشرات فوق عائله Coccoidea

للنمل العديد من علاقات تبادل المنفعة مع بعض انواع الحشرات القشرية والبق الدقيقي واساس هذه العلاقه يقوم على وجود الندوة العسلية التي تفرزها

الحشرات القشرية والبق الدقيقي ويحتاجها النمل كغذاء وبالمقابل يقوم النمل بتوفير الحماية لها من الاعداء الطبيعية. وكمثال على ذلك العلاقة التي يصنعها النمل مع حشرات التبوليب القشرية حيث يقوم النمل بعمل خيمه تشبه الورقة فوق مجموعة من الاناث البالغة لحمايتها من الطفيليات والمفترسات وعندما تغادر اناث النمل *Acropyga paramaraibensis* مسكنها الى طيران الزفاف هذه الاناث تحمل معها دائما اناث البق الدقيقي المخصبة، وهي وسيله لانتشار الحشرات القشرية والبق الدقيقي.

بعض انواع النمل تحمل اناث بق القهوة الدقيقي المخصبة بفكوكها وتدخلها الى اعشاشها حيث تحتفظ بها في غرف او حجرة خاصة ضمن مستعمرة النمل حيث يتم الاعتناء بها وفي المقابل تقوم حشرة البق الدقيقي بتجهيز الندوة العسلية لحشرات النمل، حيث يقوم النمل بالطرق الخفيف على جسم الانثى لأطلاق الندوة العسلية. علاقة اخرى مشابهه سجلت بين النمل وبعض انواع الجنس *Hippococcus* حيث تمتلك أرجل مخرية تساعدها بالتعلق بحشرات النمل التي تحملها الى اعشاشها حيث توفر لها الحماية مقابل الحصول على الندوة العسلية.

ان وجود مثل هذه العلاقات الفعالة من تبادل المنفعة بين حشرات ال- *Coccoidea* والنمل يسهم بشكل كبير في زيادة اعداد النمل والحشرات القشرية وان انخفاض اعداد الحشرات القشرية يعقبه حدوث انخفاض في اعداد النمل ايضا. ان حدوث انخفاض في اعداد الحشرات القشرية يرجع الى وجود بعض المفترسات التي تتشبه بالنمل حيث تدخل الى مستعمرات النمل وتهاجم الحشرات القشرية.

دورة الحياة العامة للحشرات القشرية والبق الدقيقي

Coccoidea General Life Cycle

تضع الانثى بيضها بشكل مجاميع ويفقس البيض الى حوريات صغيرة نشطة الحركة جدا ذات أرجل وقرون استشعار تسمى الزاحفات Crawlers تزحف في كل اتجاه وتنتشر على النبات وعلى النباتات المجاورة وبواسطتها تنتشر الاصابة وتتوسع. بعد ان تستقر الزاحفة في مكان ملائم، تتغذى ثم تتسلخ بعد فترة وجيزة فتفقد عندئذ عادة أرجلها وقرون الاستشعار وتصبح منذ هذا الوقت حورية جالسه تستقر في مكان واحد فان كانت حشرة انثى استقرت في نفس المكان طيلة حياتها - وحتى بعد ان تصبح حشرة كاملة بدون اجنحة - وتفرز - منذ ان تجلس مادة شمعية كغطاء للجسم ولكل نوع غطاء شمعي خاص به. اما إذا كانت الحشرة ذكرا فتجلس حتى تصبح حوريته حشرة كاملة مجنحة بزوج واحد من الاجنحة. الانثى الكاملة تتغذى وتعيش لفترة اطول من الذكر الذي لا يتغذى ويموت بعد فترة وجيزة.

عائلات الحشرات القشرية ذات الاهمية الاقتصادية

The Economic Important Families of Coccoidea


من الجدول (1-3) يتبين ان انواع الحشرات القشرية والبق الدقيقي تقع في تسع عائلات تعود لفوق عائله Coccoidea وان هذه العائلات تتباين في عدد الانواع الضارة التي تضمها وعليه فقد تم اعتماد عدد الانواع الضارة التي تضمها العائلة كأساس لسرد العوائل تنازليا بحسب عدد الانواع وكما يأتي:

(-1) عائله الحشرات المدرعة Diaspididae

(-2) عائله الحشرات القشرية الرخوة Coccidae

-3 عائلة البق الدقيقي Pseudococcidae

-4 عائلة القشريات العملاقة Margarodidae



الشكل (3-3) دورة الحياة العامة للحشرات القشرية

عائلة الحشرات القشرية المدرعة Diaspididae

سميت هذه الحشرات القشرية المدرعة Armored Scale Insect لان جسم الانثى يغطى بدرع من غطاء شمعي صلب يحمي الحشرة تحته من الظروف البيئية وهذا الغطاء غالبا ما يكون منفصلا عن جسم الحشرة. وهذه الاغطية

حشرات نصفية الأجنحة الضارة بالنباتات الاقتصادية

الشمعية ذات اشكال وحجوم واللوان مختلفة تتميز بها الانواع. الانثى فيها مستقرة Sedentary في مكان واحد وهي صغيرة قشرية الشكل او ممتلئة. زوائد الجسم (الارجل وقرون الاستشعار) مختزلة لدرجة كبيرة ويصبح جسم الحشرة الانثى عند اكتمال نموها ككيس مملوء بالبيض اذ تضع بيضها تحت الغطاء الشمعي. وبعد وضع البيض يضم جسم الانثى الى ان تموت. ينمو الذكر كما في الانثى الا ان الطور الحوري الاخير يكون ساكنا ولذلك كثيرا ما يطلق عليه عندئذ اسم (العذراء) مجازا للذكر زوج واحد من الاجنحة تنمو خارجيا على جسم العذراء. يتبع هذه العائلة انواع عديدة في العراق يبلغ عددها 38 نوعا، ومجموع اعدادها في الوطن العربي 66 نوعا. ان الجدول (2-3) يوضح الاسماء العلمية والعربية الشائعة للأنواع الضارة في الوطن العربي من عائله الحشرات القشرية المدرعة.

الجدول (2-3) الاسماء العلمية والعربية الشائعة لحشرات عائله

Diaspididae المسجلة في الوطن العربي

الاسماء العلمية	الاسماء العربية الشائعة
<i>Aonidiella orientails</i> Newstead, 1894	حشرة البرقوق القشرية، حشرة السيسم القشرية، الحشرة الشمعية الحمراء، الحشرة القشرية الشرقية الصفراء، الحشرة القشرية الصفراء، الحشرة القشرية الصفراء، قشرية الحمضيات الصفراء، القشرية الشرقية الصفراء، القشرية الصفراء، قشرية الفاكهة الشمعية الحمراء
<i>Aspidiotus aonidum</i> Hemple, 1900	حشرة الحمضيات القشرية السوداء. الحشرة القشرية السوداء، قرمزية البرتقال السوداء، القشرية الارجوانية، القشرية السوداء، قشرية فلوريدا الحمراء، النمشة، نمشة الحمضيات السوداء، النمشة السوداء، نمشة فلوريدا الحمراء
<i>Aspidiotus aurantii</i> Maskell, 1879	حشرة البرتقال القشرية، حشرة سان جوس القشرية، الحشرة القشرية الحمراء، حشرة كاليفورنيا الحمراء،

حشرات نصفية الأجنحة الضارة بالنباتات الاقتصادية

	قرمزية البرتقال، القرمزية الفتاكة، القشرية الحمراء، قشرية كاليفورنيا الحمراء، قملة البرتقال، قملة كاليفورنيا الحمراء
<i>Aspidiotus camelliae</i> Signoret, 1869	حشرة الكاميليا القشرية، حشرة الكاميليا القشرية الأرجوانية، القشرية النحيلة
<i>Aspidiotus cyanophylli</i> Signoret 1869	قشرية النخيل
<i>Aspidiotus destructor</i> Signoret 1869	حشرة جوز الهند القشرية المدرعة، قشرية جوز الهند، القشرية المدرعة، قشرية نخيل النارجيل
<i>Aspidiotus hederæ</i> Valloot, 1829	حشرة الأوليندر القشرية، حشرة أولياندر القشرية المدرعة، حشرة الدفلة القشرية، حشرة الزيتون القشرية البيضاء، الحشرة القشرية البيضاء، قشرية الدفلة، قشرية الدفلة البيضاء
<i>Aspidiotus latania</i> Signoret 1869	حشرة السفرجل القشرية، حشرة العنب القشرية، حشرة اللاتانيا القشرية، حشرة اللاتانيا الملثوية، قرمزية السفرجل
<i>Aspidiotus perniciosus</i> Comstock, 1881	حشرة سان هوزيه القشرية، حشرة سان هوزيه القشرية الرخوة، القرمزية الفتاكة، قشرية سان خوسيه، القشرية الفتاكة، قملة سان جوزيه
<i>Aspidiotus uvæ</i> Comstock, 1881	حشرة العنب القشرية، حشرة العنب القشرية الحقيقية المدرعة، حشرة العنب القشرية الحقيقية المسلحة، قرمزية الكرم البيضاء
<i>Aspidoprouctus hyphaeniacus</i> Hall, 1925	بق النخيل الدقيقي
<i>Chionaspis furfura</i> Fitch, 1856	القشرية الهبريه
<i>Chionaspis striata</i> Newstead, 1894	قشرية السرو الثلجية
<i>Chrysomphalus dictyospermi</i> Morgan, 1889	حشرة الحمضيات القشرية الحمراء الغربية، حشرة دكتيوسبرمي، حشرة دكتيوسبرموم القشرية المدرعة، الغربية الحشرة القشرية الحمراء الغربية، القشرية الإسبانية الحمراء، القشرية الحمراء الغربية، قشرية دكتيوسبيرم
<i>Chrysomphalus ficus</i> Ashmead, 1880	حشرة التين القشرية السوداء، الحشرة القشرية السوداء
<i>Chrysomphalus personata</i>	حشرة البرسوناتا، حشرة البرسوناتا القشرية، حشرة

Fernald، 1903	العنب القشرية، الحشرة القشرية البرسوناتا، الحشرة القشرية البرسوناتي
<i>Diaspidiouts ancylus</i> Putnam، 1878	حشرة بتنام القشرية، حشرة بوتنام القشرية المدرعة، حشرة بوتنام القشرية المسلحة
<i>Diaspidiouts caucasicus</i> Borchsentius، 1935	حشرة القوغ القشرية
<i>Diaspis carulei</i> Targioni- Tozzet	قرمزية العرعر
<i>Diaspis echinocacti</i> Bouche، 1833	حشرة الصباريات القشرية المدرعة، حشرة الصباريات القشرية المسلحة، حشرة الصبير القشرية
<i>Diaspis pomorum</i> Bouche ، 1851	قرمزية التفاح
<i>Diaspis rosae</i> Bouche، 1833	حشرة الورد القشرية، حشرة الورد القشرية، قرمزية الورد، قشرية الورد
<i>Diaspis syriaca</i> Lindinger، 1912	حشرة الفستق الحلبي القشرية، حشرة الفستق القشرية، قشرية الفستق الحلبي، قشرية الفستق السوريه
<i>Dynaspidiotus sp.</i>	حشرة الارز القشرية، قشرية الأرز
<i>Epidiaspis gennadi</i> Leonardi، 1898	قشرية الفستق الحلبي
<i>Epidiaspis pyricola</i> Del Guercio، 1894	حشرة الاجاص القشرية المسلحة الإيطالية، حشرة الكمثرى القشرية الإيطالية
<i>Eucalymnatus tesselatus</i> signoret، 1873	القشرية الفسيفسائيه
<i>Fiorninia fioriniae</i> Targioni- Tozzet، 1867	قشرية النخيل الشفافة
<i>Fiorninia phoenicis</i> Balachowsky، 1881	قشرية النخيل الشفافة
<i>Hemiberlesia rapax</i> Comstock، 1881	الحشرة القشرية الشرهة
<i>Inulaspis pallidula</i> Grote	حشرة المانجو المحارية
<i>Koroneaspis aegilopos</i> Koroneos، 1934	قشرية الباميا
<i>Lepidosaphes beckii</i> Newman، 1869	حشرة الارز القشرية، حشرة بيكي القشرية، حشرة الحمضيات الأرجوانية القشرية، الحشرة القشرية الأرجوانية، الحشرة القشرية الرخوة السمرء، الحشرة

	القشرية السمراء، حشرة الموالح الأرجوانية، حشرة الموالح الأرجوانية المحارية، قشرية الارز، قشرية الحمضيات الأرجوانية، القشرية المحارية، النمشة الأرجوانية، نمشة الحمضيات الأرجوانية
<i>Lepidosaphes conchiformis</i> Gmelin, 1789	قشرية التين
<i>Lepidosaphes ficus</i> Signoret, 1870	حشرة التين القشرية، قرمزية التين، قشرية تين البحر المتوسط، قشرية التين المحارية
<i>Lepidosaphes juniper</i> Lindinger, 1912	قشرية العرعر
<i>Lepidosaphes minimus</i> Leonard, 1892	قشرية التين
<i>Lepidosaphes pallida</i> Green, 1896	حشرة المانجو المحارية
<i>Lepidosaphes pistaciae</i> Archangelskaya, 1930	قشرية الفستق
<i>Lepidosaphes syriacus</i> Mayet	الحشرة القشرية المحارية
<i>Lepidosaphes ulmi</i> Linnaeus, 1758	حشرة الحلويات المحارية، حشرة الحلويات المحارية القشرية، حشرة الفواكه المحارية القشرية، حشرة قوقعة المحار القشرية المدرعة، قشرية بلح البحر، قشرية المحار، نمشة التفاح
<i>Leucaspis pini</i> Hartig, 1839	حشرة الارز القشرية، حشرة الصنوبر القشرية، حشرة الصنوبر القشرية البيضاء، قشرية اوراق الصنوبر البيضاء، قشرية الأرز
<i>Leucaspis pistaciae</i> Lindinger, 1906	قشرية الفستق الحلبي، حشرة الفستق الحلبي القشرية
<i>Leucaspis riccae</i> Tigioni-Tozzet, 1881	حشرة الزيتون القشرية، حشرة الزيتون القشرية البيضاء
<i>Leucaspis striata</i> Newstead, 1897	قشرية السرو الثلجية
<i>Melanaspis inopinata</i> Leonardi, 1913	حشرة الفستق الحلبي والجوز والتفاح القشرية، قشرية الفستق الحلبي
<i>Mytilaspis pomorum</i> Bouche, 1851	الحشرة القشرية، الحشرة القشرية المحارية
<i>Parlatoria blanchardi</i>	بارلتوريا النخيل، الحشرة القشرية بارلتوريا، حشرة

Targioni- Tozzeti, 1892	نخيل التمر القشرية البيضاء، حشرة النخيل القشرية، حشرة النخيل القشرية البيضاء، قشرية بارلتوريا، قشرية النخيل، قشرية النخيل الحمراء، قشرية النخيل الرمادية
<i>Parlatoria calianthina</i> Berlese & Leonardi, 1896	حشرة التفاح القشرية
<i>Parlatoria crypta</i> Mekeinz, 1943	حشرة الدفلة القشرية، حشرة الروز القشرية، حشرة الفل القشرية، قشرية الدفلة
<i>Parlatoria oleae</i> Clovee, 1880	بارلتوريا الزيتون، حشرة البارلتوريا، حشرة البرقوق القشرية، حشرة الزيتون القشرية، قشرية الزيتون، نمشة الزيتون
<i>Parlatoria pergandii</i> Comstock, 1881	حشرة التين القشرية المدرعة، حشرة القش القشرية المدرعة، الحشرة القشرية الكاسية، قشرية الحمضيات الكاسية
<i>Parlatoria zizyphus</i> Lucas, 1835	الحشرة القشرية السوداء، قشرية بارلتوريا السوداء، قشرية بارلتوريا الشرقية
<i>Phoenicoccus marlatti</i> Cockerell, 1899	حشرة التمور القشرية الحمراء، الحشرة القشرية الحمراء، حشرة النخيل القشرية الحمراء، قشرية النخيل الحمراء، قشرية الرخوة، القشرية الحمراء، قشرية النخيل الحمراء
<i>Pinnaspis aspidistrae</i> signoret, 1869	حشرة المطاط القشرية، حشرة نباتات الصوب القشرية، قشرية السرخس
<i>Pinnaspis strachani</i> Cooley, 1899	قشرية الحمضيات البيضاء
<i>Pseudaonidia duplex</i> Cockerell, 1896	حشرة الكافور القشرية المدرعة، حشرة الكافور القشرية المسلحة
<i>Pseudaulacaspis pentagona</i> Targioni-Tozzeti, 1885	حشرة الاجاص القشرية المسلحة البيضاء، حشرة الخوخ القشرية البيضاء، حشرة سينامومي، حشرة الكمثرى القشرية المسلحة البيضاء، حشرة الموالح القشرية البيضاء، قمرزية التوت، قشرية الدراق البيضاء
<i>Quadraspidiotus forbesi</i> Johnson, 1896	حشرة فوريس القشرية المدرعة، حشرة فوريس القشرية المسلحة
<i>Quadraspidiotus juglandsregiae</i> Comstock	حشرة الجوز القشرية المدرعة، حشرة الجوز القشرية المسلحة
<i>Quadraspidiotus ostraeformis</i> Curtis, 1843	حشرة الثمار القشرية المسلحة الأوربية، حشرة الفواكه القشرية المسلحة الأوربية، قشرية المحار
<i>Quadraspidiotus pyri</i>	قشرية الاجاص

Lichtensteni, 1881	
<i>Salicicola kermanensis</i> Lindinger, 1905	حشرة القوغ القشرية
<i>Salicicola pistaciae</i> Lindinger, 1906	حشرة الفستق القشرية، حشرة الفستق القشرية المحارية
<i>Targionia vitis</i> Signoret, 1876	حشرة البلوط القشرية
<i>Unaspis citri</i> Comstock, 1883	حشرة الحمضيات الثلجية القشرية المدرعة، حشرة الحمضيات الثلجية القشرية المسلحة، حشرة الموالح القشرية البيضاء، قشرية الحمضيات الثلجية

ولعل من اهم الحشرات القشرية المدرعة الشائعة في العراق والوطن العربي ما يأتي:

أولاً) حشرة الزيتون القشرية Olive Scale

واسمها العلمي *Parlatoria oleae* Colvee

الانتشار: - تنتشر حشرة الزيتون القشرية في مناطق عديدة من العالم. فهي توجد في امريكا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية، وفي اسيا ودول حوض البحر المتوسط. وتنتشر في معظم اقطار الوطن العربي. وفي العراق تنتشر في محافظات الموصل والسليمانية واربيل ودهوك.

العوائل: - تصيب حشرة الزيتون القشرية، الاشجار المثمرة كالزيتون والتفاحيات والاشجار ذوات النواه الحجرية والرمان والعنب والتوت. وتصيب ايضا نباتات الزينة كالدفلة والورد rose والياسمين وال privet وال ash. واهم عوائلها الزيتون والتفاحيات واشجار ذوات النواه الحجرية.

الضرر والاهمية الاقتصادية: - تتغذى الحوريات والاناث الكاملة لهذه الحشرة على ثمار الزيتون وكذلك الاوراق والاعصان مسببه تلون مناطق الاصابة وتشوه الثمار وضعف النبات. فتظهر على ثمار الزيتون المصابة بقع سود

وفي الإصابة الشديدة تنتشوه الثمار. وحينما تصيب ثمار التفاح وثمار اشجار ذات النواه الحجرية، تظهر في مناطق التصاق الحشرات عليها بقع حمراء. يختفي الكلوروفيل من مناطق التغذية على الاوراق وتظهر محلها بقع حمراء بينما تظهر بقع حمراء غامقة في محلات الاصابة على الاغصان. ينشأ عن الاصابة الشديدة تيبس القلف وتشققه وموت الاغصان وبالتالي ضعف الاشجار وموتها. وتعتبر هذه الحشرة من الآفات المهمة (على التفاح في شمال العراق على الزيتون في سوريا).

تاريخ الحياه والوصف:- ان حشرة الزيتون القشرية آفة صغيرة بيضوية الشكل يبلغ طول جسم الانثى 1-1.4 ملم ولونها احمر ونهاية البطن بنيه. يغطي جسمها قشرة بيضاوية محدبة بيضاء رمادية ذات بقعه جانبية سوداء. يبلغ قطر القشرة 1.5-2.5 ملم. اما قشرة حورية الذكر والطور الساكن فمستطيله صفراء مسمرة طولها 1.3 ملم وعرضها 0.9 ملم. الذكر الكامل احمر اللون وقرون الاستشعار قصيرة وريشيه. وقد وجد ان هذه الافة تقضي فترة الشتاء على شكل حشرة كاملة ثم تبدأ بوضع البيض على الاغصان في محافظة السليمانية بين الاسبوع الاول من نيسان وحتى نهاية حزيران. تضع الانثى حوالي 30 بيضة او أكثر. والبيضة بيضوية عريضة قرمزية اللون اطوالها 0.25×0.18 ملم. تبلغ فترة حضانه البيض 7-28 يوما حسب درجات الحرارة. تخرج الزاحفات *Crawless* بين الاسبوع الثالث من نيسان وحتى منتصف مايس متجولة لتستقر بعد 2-4 ساعات في محل مناسب كالأغصان او الاوراق او الثمار. والزاحفة بيضوية صفراء محمرة طولها 0.3 ملم، وبعد ان تستقر خلال الفترة بين نهاية مايس والى الاسبوع الثالث من حزيران تبدأ

لإفراز قشرة فوق جسمها. وتكون قشرة حورية الانثى أعمق لونا من قشرة الانثى الكاملة في حين تكون قشرة حوريات الذكر والطور الساكن صفراء مسمرة ظهرت الكاملات في بداية تموز وبعد التزاوج وضعت البيض على الاوراق والنموات الحديثة في النصف الثاني من الشهر نفسه. للحشرة جيلان في السليمانية ودهوك. تستغرق فترة نمو الانثى من البيضة حتى الكاملة في فلسطين 36 يوما في الصيف و136 يوما في الشتاء. اما فترة نمو الذكر من البيضة حتى الكاملة فأقصر من الانثى. للحشرة من 2-3 اجيال في السنة في سوريا.

ثانياً) حشرة النخيل القشرية Date-Palme Scale

واسمها العلمي *Parlotoria blanchardii*

توجد هذه الحشرة في جميع مناطق زراعات النخيل في العالم ما عدا الولايات المتحدة الأمريكية حيث تم القضاء عليها.

العوائل: - تصيب هذه الحشرة العائلة النخيلية وخصوصا نخيل التمر. وقد ذكر

ايضا انها تصيب الجزء الخضري من الياسمين ونوعا من *Lantana sp.*

الضرر والاهمية الاقتصادية: - تعتبر هذه الالفه من اهم الحشرات التي تصيب

النخيل في العالم وخصوصا واحات شمال افريقيا . تتغذى الحوريات والاناث

الكاملة على جميع اجزاء النخلة الخضراء وكذلك الثمار مسببه ضعف الشجرة

وعدم اكتمال نضج ثمارها وتشويه منظرها مما يقلل من قيمتها التجارية.

تفضل هذه الحشرة المناطق ذات الرطوبة العالية والبعيدة عن ضوء الشمس

المباشر حيث الاماكن المظلمة ولذلك فكثافتها على النخل الواطئ خاصة

المظلل أكثر من النخل المرتفع. تختلف الاصناف المختلفة من النخيل في

حساسيتها للإصابة بهذه الحشرة حيث وجد ان الصنف دقله نور في شمال

افريقيا اشد اصابه من غيره من الاصناف وكذلك صنفى جبجاب وبرحي في العراق وصنفى سكري ومكتوم في السعودية.

الوصف وتاريخ الحياه:- قشرة الانثى بيضوية الشكل نوعا ما مسطحة بيضاء مشوبة بسمرة قطرها الطويل يتراوح بين (1.2-1.6 ملم) وقطرها القصير حوالي 0.3 ملم وتكون قشرة الذكر متطاولة طولها حوالي 1.0 ملم وعرضها حوالي 0.4 ملم. تضع الانثى الواحدة من 6-9 بيضة وردية اللون وطولها حوالي 0.04 ملم. يفقس البيض بعد حوالي 3-5 ايام صيفا الى حوريات صغيرة (الزاحفات) وردية اللون طولها حوالي 0.3 ملم تبقى لفترة معينه تحت قشرة الام تبعا للظروف الجوية ومن ثم تبدأ في التجول للتفتيش عن خوص مظلل او ثمار لكي تهيب لها محيطا رطوبته عالية وتبدأ في التغذية. تلعب الزاحفات دورا مهما في نشر الاصابة من مكان لآخر. وبعد فترة تبدأ هذه الزاحفات بالاستقرار في مكانها وتقوم بإفراز المادة الشمعية. تتسلخ حورية الانثى مرتين لكي تصل الى الدور الكامل اما حورية الذكر فتتسلخ اربعة مرات. الانثى حمراء وتتحول الى لون احمر بنفسجي عند وضع البيض. الذكر له زوج واحد من الاجنحة فقط. لهذه الحشرة اربعة اجيال متداخلة في العراق ومن 3-4 اجيال في المغرب ومن 3-5 اجيال في الباكستان.

ثالثاً) الحشرة القشرية الصفراء Oriental YellowScale

واسمها العلمي *Aonidiella orientalis*

تنتشر هذه الحشرة في بلدان كثيرة من العالم مثل ولاية فلوريدا وكاليفورنيا في الولايات المتحدة والمكسيك وجنوب افريقيا وهي من الآفات الهامة على الحمضيات في فلسطين وقبرص وفي العراق تصيب الحمضيات والزيتون

والقرع والتفاح والتين والنخيل وبعض نباتات الظل كالمطاط وكذلك الروز. كما تعد من حشرات دول حوض البحر الابيض المتوسط مثل اسبانيا واليونان وتركيا وسوريا.

الوصف: - يغطي جسم الحشرة قشرة شمعية صفراء اللون ويوجد في مركز القشرة سرة بنيه اللون تحيط بها دائرة بيضاء تليها منطقتان متميزتان باللون البني الفاتح والقشرة مستديرة مفلطحة بينما قشرة الذكر بيضاوية واصغر حجما والسرة غير مركزية ولون القشرة اصفر غامق.

دورة الحياه: - الانثى ولودة حيث يكتمل نمو الجنين داخل البطن ويفقس الطور المتحرك من البيضة مباشرة اثناء الوضع ويظل اسفل القشرة لمدة يومين بعدها يخرج ويثبت نفسه على عائله ويفرز خيوطا شمعية بيضاء لتغطي منطقة الظهر ويسمى الغطاء الابيض وعندما يكتمل التصاق هذا الغطاء يسمى nipple stage ويكون لونه ابيض فاتحا ثم يتحول الى اللون الاصفر. بعد الانسلاخ الاول تستمر الحشرة في تكوين القشرة فتتمد حوافها استعدادا للانسلاخ الثاني بعد (10-12) يوما من الانسلاخ الاول بعد ذلك تستمر الحشرة في تكوين القشرة ليكتمل نموها وبعد الانسلاخ الثاني مباشرة يتم التفقيح وتدخل الحشرة في فترة الوضع وتختلف مدة حياه الحشرة البالغة حسب الظروف الجوية، كما انها قد تعيش لمدة 6 أشهر إذا لم تكن قد لقحت. الانثى الواحدة تلد في المتوسط 150 حورية والذكر لا يمكن تمييزه في العمرين الاول والثاني ولكن بعد الانسلاخ الثالث يتحول الذكر الى طور العذراء وبعد الانسلاخ الرابع تخرج الحشرة الكاملة. للحشرة 4 أجيال في السنة.

الضرر: - تتغذى الحوريات والحشرات الكاملة على عصارة النبات من الاوراق والافرع والثمار وتسبب ضعفها واصفرار الاوراق.

عائله الحشرات القشرية الرخوة Coccidae

يطلق على هذه الحشرات القشرية الرخوة Soft Scale او الحشرات الشمعية Wax Scales او السلحفاة Tortoise Scales، اناث هذه العائلة بيضوية او متطاولة او احيانا دائرية تقريبا مسطحة الجسم يغطي الجسم غطاء شمعي كليا او جزئيا وأحيانا بدون اي غطاء او ان جدار الجسم نفسه يكون صلبا. لبعض منها كيس بيض قطني متطاول الشكل. لهذه الحشرات أرجل ولكن الانواع المستقرة منها قد تفقدها اما قرون الاستشعار فأنها مفقودة او مختزلة، الذكور تمر بتحول بعد ان تستقر على النبات العائل تحت قشرة رقيقة ومسطحة وشفافة وصغيرة تكون الذكور كاملة النمو اما مجنحة او عديمة الجناح. معظم الانواع تفرز مادة الرضاب Honeydew بكثرة تؤثر تأثيرا ضارا على النباتات بالإضافة الى امتصاص عصارة النبات واضعافه. تمضي الحشرات القشرية الرخوة فترة الشتاء بهيئة حشرات كاملة. تضم هذه العائلة 41 نوعا ضارا سجل وجودها في الوطن العربي وتعود لثمانية اجناس (الجدول 3-3)

الجدول (3-3) الاسماء العلمية والعربية الشائعة لحشرات عائله

Coccidae المسجلة في الوطن العربي

الاسماء العلمية	الاسماء العربية الشائعة
<i>Ceroplastes cirripediformis</i> Comstock, 1881	حشرة الارز القشرية الرخوة
<i>Ceroplastes florindensis</i> Comstock, 1881	حشرة الحمضيات الشمعية، الحشرة القشرية الشمعية، حشرة الموالح الشمعية، حلزون الحمضيات، قرمزية الحمضيات، قشرية الحمضيات الشمعية، نمشة الحمضيات الشمعية
<i>Ceroplastes rubens</i>	الحشرة القشرية الشمعية الحمراء، القشرية الشمعية

حشرات نصفية الأجنحة الضارة بالنباتات الاقتصادية

Maskell, 1893	القرنفلية اللون
<i>Ceroplastes rusci</i> Linnaeus, 1758	جرب التين، حشرة التين الشمعية، حشرة التين الشمعية القشرية، حشرة التين القشرية السوداء، الحشرة القشرية الكبيرة، الحزنون البني، حزنون التين، قرمزية التين، قشرية التين الشمعية
<i>Chloropulvinaria psidii</i> Maskell, 1892	حشرة البلفناريا، حشرة الجوافة الرخوة، حشرة الجوافة القشرية، الحشرة القشرية الرخوة الواقية الخضراء، قشرية الجوافة المغبرة
<i>Coccus acuminatus</i> Linnaeus, 1758	حشرة المانجو الرخوة، حشرة المانجو القشرية، حشرة المانجو القشرية الرخوة، قرمزية المانجو
<i>Coccus cacti</i> Linnaeus, 1758	قرمزية الصبار
<i>Coccus elongates</i> Linnaeus, 1758	حشرة العنب القشرية الرخوة
<i>Coccus hesperidum</i> Linnaeus, 1758	حشرة الحمضيات القشرية السمرء، الحشرة القشرية الرخوة، الحشرة القشرية الرخوة السمرء، الحشرة القشرية البنية الرخوة، الحشرة القشرية الرخوة السمرء، الحشرة القشرية البنية
<i>Coccus mangiferae</i> Green, 1889	قرمزية المن، قملة المن
<i>Coccus sp.</i>	القشريات الطرية
<i>Coccus viridis</i> Green, 1889	الحشرة القشرية الخضراء، القشرية الطرية الخضراء
<i>Eulecanium bituberculatum</i> Fernald, 1903	حشرة التفاح القشرية
<i>Eulecanium tiliae</i> Linnaeus, 1758	قشرية البندق
<i>Exaeretopus tritici</i> Williams, 1977	حشرة الحنطة القشرية الرخوة، الحشرة القشرية الرخوة
<i>Gascardia destructor</i> Newstead, 1917	القشرية الشمعية البيضاء
<i>Heterococcus sp.</i>	البن الدقيقي لحشيشة برمودا
<i>Lecanium amygdali</i> tryon, 1889	قرمزية اللوز
<i>Lecanium cerasorum</i>	الحشرة القشرية المرقطة

Cockerell, 1900	
<i>Lecanium ilices</i> Linnaeus, 1758	قرمزية البلوط
<i>Lecanium oleae</i> Olivier, 1791	قرمزية الزيتون
<i>Lecanium persicae</i> Fabricius, 1777	قرمزية الخوخ، قرمزية الدراق
<i>Lecanium pruinosum</i> Coquillett, 1891	القشرية ثلجية المظهر
<i>Parasaissetia nigra</i> Nietner, 1861	حشرة الحوافة الرخوة، حشرة الجوافة الشمعية، حشرة الجوافة القشرية الرخوة
<i>Parthenolecanium corni</i> Bouche, 1844	حشرة الثمار الأوروبية القشرية اللينة، حشرة الخوخ القشرية، حشرة الخوخ الضرية البنية، حشرة الفواكه الأوروبية الشمعية، حشرة الفواكه القشرية، الحشرة القشرية البنية، حشرة اللوزيات البنية، حشرة اللوزيات الشمعية، حشرة المشمش القشرية البنية، قشرية الخوخ
<i>Parthenolecanium persicae</i> Fabricius, 1776	حشرة الاجاص القشرية الرخوة الأوروبية، حشرة الدراق القشرية، حشرة الكمثرى القشرية الرخوى الأوروبية
<i>Parthenolecanium quercifex</i> Fitch, 1859	حشرة بلوط العفص الشمعية
<i>Protopulvinaria pyriformis</i> Cockerell, 1894	الحشرة القشرية الرخوة كمثرية الشكل
<i>Pulvinaria amygdale</i> Cockerell, 1896	حشرة الخوخ القطنية القشرية الرخوة، حشرة الدراق القطنية القشرية الرخوة
<i>Pulvinaria floccifera</i> Westwood, 1870	حشرة الجوافة الرخوة، حشرة الجوافة القشرية، الحشرة القشرية الرخوة الخضراء على الحمضيات
<i>Pulvinaria innumerabilis</i> Rathvon, 1859	حشرة الاسفندان القطنية القشرية الرخوة
<i>Pulvinaria mammeae</i> Maskell, 1895	الحشرة القطنية القشرية الرخوة الكبيرة
<i>Pulvinaria ribesiae</i> Douglas, 1890	قشرية الكشمش الصوفية
<i>Pulvinaria</i> sp.	بث القوغ الدقيقي
<i>Pulvinaria</i> sp.	القشريات القطنية
<i>Pulvinaria tenuivalvata</i> Newstead, 1911	قشرية قصب السطر الرخوة

<i>Pulvinaria vitis</i> Linnaeus, 1758	حشرة القيقب القشرية القطنية، حشرة القيقب القطنية، قرمزية الكرم الحمراء، قشرية العنب الصوفية، قشرية العنب القطنية، قشرية العنب القطنية، قشرية الكرمة الصوفية
<i>Rhizopulvinaria dianthi</i> Bodenhimer, 1943	حشرة القرنفل القشرية
<i>Saissetia coffeae</i> Walker, 1852	حشرة الجوافة الرخوة، حشرة الجوافة القشرية، الحشرة القشرية نصف كروية، الحشرة القشرية نصف الكروية الرخوة، قشرية الخوذة، نمشة القهوة
<i>Saisseti oleae</i> Olivier, 1791	حشرة الزيتون السوداء، حشرة الزيتون الشمعية، حشرة الزيتون القشرية، حشرة الزيتون القشرية السوداء، الحشرة القشرية السوداء، نمشة الزيتون السوداء، النمشة السوداء

ان من اهم امثلة الحشرات القشرية الرخوة في العراق والوطن العربي ما يأتي:

اولا) الحشرة القشرية الرخوة Soft Scale Insect

واسمها العلمي *Exaeretopus tritici*

تعتبر هذه الحشرة من اهم الآفات التي تصيب محصولي الحنطة والشعير وقد ظهرت حديثا وانتشرت انتشارا واسعا في شمال العراق (محافظة اربيل ونيوى). ومنذ منتصف السبعينات والمزارعون في هذه المنطقة الشمالية يعانون من ضرر هذه الافة لما تسببه من اضرار جسيمة لحاصلاتهم الزراعية الرئيسية. ففي عام 1976 تم مكافحة (50000) خمسين ألف دونم في قضاء تلعفر (محافظة نيوى) و(20000) عشرين ألف دونم في قضاء مخمور (محافظة اربيل). بينما في عام 1977 زادت المساحة المكافحة بالمبيدات الى (100000) مائه ألف و(32000) اثنين وثلاثين ألف دونم في القضائين سابقى الذكر على التوالي.

الحشرة الكاملة:- يختلف شكل وحجم الانثى باختلاف عمرها وكثافة اعدادها

على عائلها وعموما يصل طول الجسم ما بين 4.8-5.9 ملم وعرضه 2.7-3.2 ملم. الشكل العام بيضي محدب. واللون بني مصفر او بني داكن.

دورة الحياه:- بعد نهاية العمر الثالث اليرقي تبدأ الاناث استعدادها للتلقيح وهي اما ان تلقح وهي في مواقعها على النبات او انها تبدأ في الحركة وتمتد عن التغذية وتصبح حرة نشطة كثيرة التجول على اجزاء النبات المختلفة. حيث يتم تزاوجها وتلقيحها من الذكور. وبعد تمام عملية التزاوج والتلقيح تترك الانثى النبات الى سطح التربة لتبدأ فترة تجوال اخرى على سطح التربة للبحث عن الشقوق (Cracks) والانفاق الى ان تحدد المكان المناسب الذي سوف تستقر فيه لوضع بيضها في صورة Ovisacs اكياس بيض أسفل سطح التربة وبين حبيباتها وعندئذ تقل حركتها او تتوقف تماما. ولأهمية سلوك الحشرة في هذه الفترة لهجرتها من سطح النبات الى داخل التربة في مكافحة الافه باستخدام المبيدات قام سعد ويونس 1978 بتحديد هذه الفترة حيث تراوحت بين 6-11 يوم بمتوسط 9 ± 0.56 ايام وان نسبة الاناث التي هاجرت من النبات الى التربة قد تراوحت بين 16.47% في اوائل هذه الفترة الى 2.2% في نهاية هذه الفترة وان متوسط الهجرة اليومية بلغ 9.9% انثى. كما انه ثبت ان نسبة 71.67% من مجموع الاناث قد تمت هجرتها في خلال الخمسة الايام الاولى. بعد هجرة الاناث الى التربة تبدأ في افراز النسيج القطني الشمعي على الحافتين الجانبيتين للجسم تليها مقدم المنطقة الظهرية الوسطية ثم تمتد حتى مؤخرته ثم تبدأ في تغطية السطح البطني مبتدئه من مؤخر الجسم حتى مقدمته وبعد ذلك يتوالى الافراز حتى يتم تغطية الفراغات البينية للجسم مكونة في النهاية كيس البيض Ovisacs وعندئذ تبدأ الانثى

بوضع البيض داخل الكيس وباستمرار عملية وضع البيض تأخذ الحشرة في الانكماش التدريجي حتى تنتهي عملية وضع البيض ثم تموت الحشرة وقد بلغ عدد ما وضعتة الانثى الواحدة 96 الى 271 بيضة بمتوسط 183.7 +- 17.31 بيضة وذلك من خلال فترة وضع البيض التي بلغت 10-17 يوما بمتوسط 13.4 +- 0.6 يوما. ويتميز طور البيضة بفترة حضانة طويله بل يعتبر من اطول اطوار الحشرة في مدته حيث كان 248 الى 270 يوما بمتوسط 258.4 +- 1.4 يوما (20.3 م و 49.6 % رطوبة نسبية)، يفقس البيض الى الطور الاول ويتميز بأنه نشط يتحرك في جميع الاتجاهات وعلى اجزاء النبات المختلفة وسطح التربة قبل ان يثبت نفسه ويبدأ في التغذية (جميع اطوار هذه الحشرة تفضل السطح السفلي للأوراق لتثبيت نفسها والتغذية) وبعد 26.16 +- 0.21 يوما يكتمل نمو العمر الاول. ثم يحدث الانسلاخ الاول الى العمر اليرقي الثاني الذي يبلغ في المتوسط 22.9 +- 0.38 يوما (19.5 م و 81.9 % رطوبة نسبية) حيث يحدث الانسلاخ الثاني يبدأ الطور اليرقي الثالث وهو يتميز بالنمو السريع ويبدو ان الطور اليرقي الثالث هو أقصر اطوار العمر اليرقي حيث يبلغ 7-11 يوما بمتوسط 8.1 +- 0.49 يوما (19.6 م و 51.9 % رطوبة نسبية)، ويتميز ذكر هذه الحشرة بوجود طور ما قبل العذراء وطور العذراء). تتغذى يرقات العمر الثالث (الاناث) وتتزاوج مع الذكور وتبدأ في ترك النباتات الى التربة للتحويل الى اكياس البيض. وللحشرة جيل واحد في السنة يبدأ في ايار وينتهي في ايار من السنة التالية.

مظهر الإصابة والضرر:- وينحصر الضرر الناجم عن هذه الالفه في طريقة

وطبيعية تغذيتها فهي من الحشرات الثاقبة الماصة للعصارة النباتية. علاوة على افرازها للندوة العسلية. وعموما تسبب الحشرة تشوها للأجزاء المصابة علاوة على ما تسببه عملية الوخز والثقب للأنسجة النباتية بأجزاء منها من دمار وتشوه للنباتات المصابة ويتقدم الاصابة قد تؤدي الى جفاف النباتات خاصة إذا صادف ذلك نقص في كميته الرطوبة (نقص في كمية الامطار) او في المناطق التي تفتقر الى الرطوبة اللازمة لاحتياجات النبات. ويحدث افراز الندوة العسلية اساسا باناث هذه الحشرة في فترة نموها السريع وذلك في بداية العمر الثالث اليرقي خلال شهر نيسان. والندوة العسلية المفترزة بهذه الحشرة على اجزاء النبات المختلفة يتسبب منها غشاء من مادة سكرية لزجة تتجمع عليها الاتربة وفي بعض الاحيان جراثيم الفطريات Sooty Moulds. ومن البديهي ان الاجزاء النباتية المغطاة بهذه الإفرازات العسلية غالبا ما تكون ضعيفة لعدم قدرتها على القيام بعملية التمثيل الضوئي على الوجه الاكمل والنتيجة النهائية قلة الحاصل حيث ينعكس ذلك على حجم الحبوب التي تكون قليلة وكذلك صغر حجم السنابل الناتجة. ويعتبر محصولي الحنطة والشعير من ضمن العوائل النباتية الاساسية التي تهاجم بالحشرة القشرية الرخوة *E. tritici* كما وجد ان عوائل اخرى دغليه Weeds عديدة من العائلة النجيلية منها رويطة، حنطية والشوفان البري.

ثانياً الحشرة القشرية الكبيرة Fig Wax Scale

واسمها العلمي *Ceroplastes rusci* L.

الانتشار:- تنتشر الحشرة القشرية الكبيرة في المنطقة الاستوائية وفي مناطق حوض البحر المتوسط. وفي الوطن العربي توجد في العراق وفلسطين وسوريا ولبنان ومصر وليبيا وتونس.

العوائل: - تصيب التين بصورة خاصة وتصيب عوائل نباتيه اخرى كالحبة الخضراء في تركيا كما تصيب نباتات الزينة.

الضرر والاهمية الاقتصادية: - يسبب تغذية الحوريات والكاملات من الاناث على الاوراق ضعف الاغصان المصابة والثمار ويزيد من تأثيرها افراسها للرضاب (الندوة العسلية) التي تنمو عليها فطريات سوداء. ان اضعاف اشجار التين بسبب تغذي هذه الافه يعرضها الى الاصابة بحقارات السيقان. ولأتوجد دراسة كافية عن مدى اضرارها هذه الافه في العراق.

تاريخ الحياه والوصف: - ان الحشرة القشرية الكبيرة تقضي الشتاء في المنطقة المحيطة ببيروت كحورية في الطور الثاني ونادرا في مرحلة الحشرة الكاملة. يموت الكثير منها عند تساقط الاوراق بينما تعيش الافراد الباقية على الاغصان. والانثى الكاملة بيضوية محدبة طولها 2.4 ملم وعرضها 1.8 ملم وطول جسمها مع الترس 3-6 ملم وعرضه 2-3 ملم، ولون الجسم احمر فاتح. والترس طبقة سميكة نسبيا من مادة شمعية بيضاء ارجوانية في قمته بقعه بنيه وعند حافته (8) صفائح مربعه بيضاء في وسط كل منها نقطة بنيه حمراء. اما الحورية في الطور الاول (الزحافة) فطولها 0.32×1.18 ملم. بنيه ذات 3 ازواج من الارجل كاملة النمو. حورية الطور الثاني طولها 1×0.7 ملم ذات قشرة تشبه النجمة مؤلفة من 15 بروز شمعي عند الحافة، والبروز الظهرى المخروطي مقسم الى نصفين والترس الذي يغطي الحشرة احمر اللون. ومع ارتفاع الحرارة في الخريف، تبدأ حوريات الطور الثاني بالتغذي والنمو ونزع جلدها في بداية اذار حتى تصبح كاملات. تضع الاناث بيضها عذريا تحت القشرة، ويبلغ عدده 150 - 1800 بيضة للأنثى. يفقس

البيض بعد 4 - 15 يوما في اواسط مايس. تزحف الحوريات من تحت قشرة الام متجولة على الاوراق والفروع والثمار لمدة 3-8 يوم حتى تجد مكانا مناسباً تلتصق عليه وتبدأ بالتغذي. وأكثر الحوريات تستقر على العروق اوسطيه والباقي على العروق الاخرى وعلى الثمار. يستغرق الطور الحوري الاول 1-3 يوم والطور الحوري الثاني 4 اسابيع بعده تتكون الكاملات التي تتضج جنسيا بعد 10-15 يوم. وعليه فيستغرق تكون الجيل الواحد في الربيع 8-10 اسابيع. تظهر زاحفات الجيل الصيفي في بداية آب وتكمل دورة حياتها في 8 اسابيع. تضع كاملات هذا الجيل بيضها في تشرين الاول. ولهذه الحشرة ثلاثة اجيال في السنة وربما جزء من رابع على السواحل السورية واللبنانية.

عائله البق الدقيقي Pseudococcidae

جاء اسم هذه الحشرات بسبب الغطاء الشمعي الابيض الذي يغطي اجسامها الذي يشبه الدقيق وأحيانا الغطاء يشبه القطن. يأخذ هذا الغطاء اشكالا مختلفة بحسب الانواع. الانثى بيضاوية الجسم واضحة الحلقات وأرجلها نامية تضع اناث بعض الانواع البيض بينما انواع اخرى تلد صغارا - بيضوية ولودة - تضع الانثى (الببوضة) بيضها في كيس ابيض الذي يوجد خلف الانثى مباشرة. بعض انواع البق الدقيقي مهمة اقتصاديا مثل بق الهبسكس الدقيقي او ما يعرف عندنا ببق الحمضيات الدقيقي *Nipaecoccus vastator* الذي يصيب الحمضيات ونباتات عديدة اخرى. في الوطن العربي هناك 24 نوعا ضارا وجدت على العديد من النباتات ذات الاهمية الاقتصادية والجدول (3-4) يحوي الاسماء العلمية والعربية الشائعة.

الجدول (3-4) الاسماء العلمية والعربية الشائعة للأنواع التابعة لعائلة البق

الدقيقي Pseudococcidae في الوطن العربي

الاسماء العلمية	الاسماء العربية الشائعة
<i>Anapulvinaria pistaciae</i> Bodenhimer, 1926	بق الفستق الدقيقي، حشرة الفستق القطنية، حشرة الفستق القشرية القطنية، الحشرة القشرية الرخوة الخضراء على الفستق الحلبي
<i>Antonina graminis</i> Maskell, 1897	بق الثيل الدقيقي
<i>Dactyopius adonidum</i> Linnaeus, 1758	بق الحمضيات الدقيقي، البق الدقيقي ذو الذيل الطويل، قمة الدفيئات
<i>Dysmicoccus bonensis</i> Kuwana, 1909	البق المغبر على قصب السكر
<i>Nipaecoccus vastator</i> Maskell, 1895	البق الدقيقي، البق الدقيقي الكروي، البق الدقيقي الوردي، الرحيق الدقيقي
<i>Phenacoccus basorae</i> Bodenhimer, 1943	بق الثيل الدقيقي
<i>Phenacoccus hirsutus</i> Green, 1908	بق الخمطي، البق الدقيقي الشمعي، بق الروز الدقيقي، بق الهبسكس الدقيقي
<i>Phenacoccus solani</i> Ferris, 1918	بق الباذنجانيات الدقيقي
<i>Planococcus aceris</i> Signoret, 1875	بق الاسفندان الدقيقي، بق التفاح الدقيقي، البق المغبر على التفاح، قشرية الخيار
<i>Planococcus citri</i> Risso, 1813	بق الحمضيات الدقيقي، بق العنب الدقيقي، البق المغبر على الحمضيات، بق الموالح الدقيقي، قرمزية البرتقال البيضاء
<i>Planococcus ficus</i> Signoret, 1875	بق التين الدقيقي
<i>Planococcus lilacinus</i> Cockerell, 1905	بق المانجو الدقيقي
<i>Pseudococcus affinis</i> Maskell, 1894	البق الدقيقي القاتم
<i>Pseudococcus brevipes</i> Cockerell, 1893	بق الاناناس الدقيقي، البق المغبر على الاناناس، بق نخل التمر الدقيقي
<i>Pseudococcus calceolariae</i> Maskell, 1897	بق الحمضيات الدقيقي

<i>Pseudococcus comstocki</i> Kuwana, 1902	بق الحمضيات الدقيقي، بق الموز الدقيقي
<i>Pseudococcus longispinus</i> Targioni -Tozzeti, 1867	البق الدقيقي طويل الذيل، البقة المغبرة الطويلة الذيل
<i>Pseudococcus maritimus</i> Ehrhorn, 1900	بق ببيكر الدقيقي، بق العنب الدقيقي، بق العنب المغبرة
<i>Pseudococcus nipae</i> Maskell, 1893	بق نخل النارجيل الدقيقي
<i>Pseudococcus sacchari</i> Cockerell, 1893	بق القصب الدقيقي
<i>Pseudococcus virgata</i> Cockerell, 1893	البق الدقيقي الابيض، البق الدقيقي طويل الذنب، البق الدقيقي المحطط، بق الفرجاتس الدقيقي، الفيرجاتس الدقيقي
<i>Pseudococcus vitis</i> Niediel, 1870	بق العنب الدقيقي، قرمزية الكرم البيضاء، من الكرمة الدقيقي
<i>Puto sandini</i> Washburn, 1965	بق التنوب الفضي الدقيقي
<i>Rhizoecus cynodontis</i> Green, 1931	بق الثيل الدقيقي
<i>Rhizoecus falcifer</i> Kunckel d Herculais, 1878	البق الدقيقي الارضي

ومن اهم الانواع الممثلة لهذه العائلة ما يأتي

أولاً) بق الحمضيات الدقيقي Citrus Mealybug

واسمها العلمي *Nipaecoccus vastator*

سجل في العراق اثنان وعشرون نوعاً من البق الدقيقي في المدة من عام 1942 لغاية عام 1974 وهي تنتمي جميعها الى عائلة Pseudococcidae ومن هذه الانواع هو *Nipaecoccus vastator* وبعد هذا النوع من أكثر الانواع انتشاراً ويصيب ما يقرب من اربعين نوعاً من اشجار الفاكهة والمحاصيل الحقلية والخضر والزينة. يرجع تاريخ ظهور هذه الالفه بالعراق لعام 1966 حيث شوهدت اولى اصابتها على اشجار الليمون

الحامض والحلو ببعض الحقائق المنزلية في منطقة المنصور ببغداد والاحتمال الكبير ان يكون هذا النوع من البق الدقيقي قد دخل القطر مع الشتلات المستوردة من سوريا ولبنان والاردن، وقد انتقلت الاصابة سريعا الى الانواع الاخرى من الحمضيات والى اشجار النبق والتوت. وظهرت الاصابة بشكل وبائي في جميع انحاء بغداد عام 1968 ورغم الحجر الزراعي الداخلي الذي فرض آنذاك فقد انتشرت الاصابة في محافظات واسط وكربلاء والانبار وديالى. ولوحظت الاصابة سنة 1972 - 1973 في محافظتي نينوى واربيل.

العوائل:

أ-) اشجار الفاكهة: النبق، التوت، الحمضيات، الياس، الرمان، العنب، التين،

المشمش، النخيل، التفاح، السفرجل، العرموط، الزيتون؟

ب-) المحاصيل الحقلية: القطن، الخروع، عباد الشمس

ت-) الخضراوات: الكرفس، القرع العراقي، البطاطا، الطماطه.

ث-) نباتات الزينة: اكليل الملك، ورد القهوة، القرنفل، الداودي، الجعفري،

الدقلة، ورد البوق، فرشة البطل، الجيرانيوم، السلفيا، الروز.

ح-) الادغال: المرير، عنب الديب، الشوك.

الوصف: - الانثى: بيضوية الشكل ذات لون بني غامق جسمها مقسم الى

حلقات واضحة عديمة الاجنحة جسمها مغطى بمادة شمعية بشكل مسحوق

ابيض اللون له اجزاء فم ثاقبه مثة طويله . قرون الاستشعار خيطية قصيرة

يتراوح طولها بين (0.79-0.8) ملم وتتراوح طول الانثى بين (2.27-2.3)

ملم وعرضها (1.66-1.71) ملم.

البيضة: - ذات شكل بيضوي ولون بنفسجي غامق لماع طول البيضة

(0.32-0.36) ملم وعرضها (0.19-0.22) ملم.


الحورية:- حوريات العمر الاول صغيرة مغزليه الشكل ذات لون بني مصفر مغطاة بمادة شمعية بيضاء جسمها مقسم الى حلقات واضحة. للحورية ثلاثة ازواج من الارجل القصيرة وزوج من قرون الاستشعار الخيطية القصيرة. ينتشر على جوانب جسم الحورية 14 زائدة على كل جانب بشكل شعيرات بيضاء اللون متساوية بالطول والمسافة الفاصلة بين شعرة واخرى. وفي نهاية جسمها يوجد زوجان من الزوائد الوسطية وهي اطول عادة من الزوائد الجانبية. اما حوريات العمر الثاني فلا تختلف عن حوريات العمر الاول الا في الحجم. اما حوريات العمر الثالث فتزداد كمية المادة الشمعية الموجودة على الجسم. اما حوريات العمر الرابع فتمتاز بجسمها المغطى بمادة شمعية كثيفة بحيث لا يمكن مشاهدة تعقيل الجسم.

الذكر: لونه بني قاتم له زوج من الاجنحة الامامية غشائية والزوج الثاني متحور الى نتوء صغير له قرن استشعار خيطي يتراوح طوله بين 0.6-0.65 ملم ينتهي جسم الذكر بزواج من الزوائد الخيطية البيضاء. يتراوح طول الجسم 0.95-1.1 ملم وعرضه بين 0.35-0.39 ملم.

دورة الحياه:- تضع الانثى البيض في كيس قطني مكون من خيوط قطنيه شمعية بيضاء اللون تفرزه الانثى في نهاية جسمها. يتراوح عدد البيض الذي تضعه الانثى الواحدة بين (90-138)، ان عدد البيض الذي تضعه الانثى الواحدة على درجة حرارة 25 م والمربأة على درنات البطاطا تتراوح بين (12-454) بيضه ويرجع هذا الاختلاف الى نوع العائل المستخدم في تربية الحشرة. تضع الانثى البيض بصورة فردية وتدفعه داخل الكيس الشمعي حيث يختلط مع كرات البراز السوداء اللون الصلبة القوام. تتراوح فترة حضانة البيض

بين (10-13) يوما. يفقس عن حوريات عمر اول تمتاز بنشاطها وحركتها على العائل وبعد ان تجد المكان المناسب تستقر وتبدأ بامتصاص العصارة النباتية بواسطة اجزاء فمها الثاقبة الماصة ثم تتحرك وتنتقل الى مكان اخر من العائل. تقضي حورية العمر الاول فترة (6-8) ايام تتسلخ بعدها الى حورية العمر لثاني ويستغرق فترة من (8-9) ايام. اما حوريات العمر الثالث فتكون اقل حركه من حوريات العمر الاول والثاني وبعد مرور (8-9) ايام تتسلخ الى حوريات العمر الرابع الذي يستغرق فترة تتراوح بين 9-10 يوما وتتسلخ بعدها لتتحول الى انثى كاملة. اما من ناحية حورية الذكر فأنها بعد انسلاخها الاول تثبت نفسها في مكان ما على سطح الورقة ثم تفقد زوائد جسمها صانعه ما يشبه الشرنقه حيث تستمر بالتغذية والانسلاخ ولا تتحرك من مكانها حيث تتسلخ انسلاخين داخل الشرنقه التي يصبح لونها بمرور الزمن قائما وبعد اكتمال نموها تتحول الى ذكر بالغ. يستغرق فترة الطور الحوري (31-44) يوما. يعيش الذكر لفترة (2-3) يوم، اما الانثى فتعيش لفترة تتراوح بين (17-25) يوم وتقضي الحشرة البيات الشتوي بشكل بيض مع اعداد قليلة من الحوريات والبالغات توجد في الاماكن المحمية من الشجرة. للحشرة 6 اجيال متداخلة في السنة. في الاردن وجد ان للحشرة (6-7) اجيال في وسط العراق وتتراوح مدة الجيل الواحد (28-56) يوما حسب درجات الحرارة. كما وجد ان الحشرة بدأت بالظهور على شجيرات الدفلة في الاسبوع الاول من شهر اذار ووصلت اعدادها الذروة الاولى في منتصف شهر ايار عند معدل درجات الحرارة ورطوبة نسبية 33.21، 93،40 % على التوالي.

اما ذروة الثانية فقد كانت في منتصف شهر تشرين الاول عند معدل درجة حرارة 65، 21 م ورطوبة نسبية 47،2.



الشكل (3-4) دورة الحياة العامة لحشرات البق الدقيقي

الاصابة والضرر:- يحدث الضرر نتيجة تغذي الحوريات والحشرات الكاملة الاناث على امتصاص العصارة النباتية من الاوراق والافرع والثمار فتؤدي الى اصفرار الاوراق وتجدها ثم سقوطها وكذلك سقوط الثمار خصوصا بعد العقد وسقوط الثمار الناضجة الباقية على الاشجار في فصل الخريف كذلك فان الحشرة تفرز الندوة العسلية على الاوراق والاجزاء الاخرى التي تنمو عليها الفطريات فتؤدي الى تجمع الاتربة على الاوراق والثمار ونمو بعض الفطريات التي تعيق من عملية التركيب الضوئي، وقد لوحظ ان الاصابة في الحدائق المنزلية تفوق الاصابة بالبساتين وهذا يرجع الى تقارب المسافات بين الاشجار في الحدائق المنزلية مما يسهل انتقال الحوريات وانتشارها وكذلك الى ارتفاع

درجة الحرارة داخل اسوار المنازل اذا ما قورنت بالبساتين مع ارتفاع نسبه الرطوبة بها نتيجة الري الغزير وغسل الاشجار لتنظيفها ولترطيب الجو حولها وهي ظروف تساعد على سرعه تكاثر الحشرة كما ان استعمال المبيدات الكيماوية في مكافحة الحشرة بكثرة والذي يقضي على نسبة كبيرة من الاعداء الحيوية للحشرة واختلال حالة التوازن الطبيعي بينها. كما تختلف انواع الحمضيات في درجة اصابتها ويتضح ذلك من الجدول (3-5)

الجدول (3-5) التفضيل الغذائي لبق الحمضيات الدقيقي

الصف	عدد الحشرات/ قدم من الغصن	% لأصابه الثمار
ليمون حامض	69	9
برتقال	65	14
ليمون حلو	62	24
نارنج	116	25
طرنج	50	14
لانكي	39	4

ثانياً) بق العنب الدقيقي Grape Mealy bug

ويسمى ايضا بق الحمضيات الدقيقي واسمه العلمي *Planococcus citri* وكان يعرف سابقا بالاسم *Pseudococcus citri*، تنتشر هذه الحشرة في جميع انحاء العالم وخاصة مناطق زراعة الحمضيات في العالم ينتشر في الوطن العربي في العراق، سوريا ومصر ولبنان وفلسطين وليبيا والمملكة السعودية وكذلك تركيا والولايات المتحدة الأمريكية وتصيب كل من الحمضيات والعنب والرمان والتوت والزيتون وتربى في المختبر على درنات البطاطا، كما تصيب بعض نباتات الزينة كالدفله.

الوصف:- البيضة: طويله يبلغ طولها 0.2-0.3 ملم لونها اصفر وتشاهد بين الخيوط الشمعية.

الحورية: طولها بعد الفقس 0.4 ملم، لونها اصفر وتفرز مسحوقا شمعيا ابيض اللون يجعل مظهرها ابيض. تمر الانثى بثلاث مراحل وتحتفظ بأرجلها وقرون استشعارها كما في الحشرات الكاملة. اما الذكر فيختلف عن الانثى فهو أصغر منها وله زوج من الاجنحة وأرجله تامة النمو وقرون استشعاره طويله ذات 10 عقل ويحمل الرأس اربعة عيون بسيطة بينما لا توجد عيون مركبه.

الحشرة الكاملة: يبلغ طول الانثى الكاملة 2.5-5 ملم وعرضها 3 ملم لونها اصفر باهت او بني يميل الى البرتقالي الجسم مغطى بمسحوق ناعم شمعي ابيض اللون. يحيط حافة الجسم 17 زوج من خيوط شمعية قصيرة بيضاء متساوية في المسافة وكذلك متساوية في الطول عدا الزوج الشرجي في نهاية البطن فأطول بقليل قرون الاستشعار تتكون من 8 عقل.

تاريخ الحياه:- تضع الانثى بيضا غالبا في كيس مكون من مادة شمعية بيضاء تغطي كتلة البيض وعند اشتداد الاصابة ترى اكياس البيض موزعه على الاجزاء المختلفة من النبات، يبلغ عدد البيض الذي تضعه الحشرة الانثى بين 300-500 بيضه في فترة تتراوح بين 4-14 يوما في الصيف. واطول من ذلك عندما يكون الطقس باردا. بعد حوالي 6-20 يوما الى حوريات صغيرة لونها اصفر باهت. تموت الانثى بعد انتهاء وضع البيض وتحتاج الحوريات الصغيرة الى فتره شهر ونصف تقريبا لإكمال تطورها. لهذه الحشرة

(4-7) اجيال في السنة وقد تقضي الحشرة فصل الشتاء في اطوارها المختلفة ولكن غالبا بطور اليرقة، وتزداد الاصابة عادة خلال الربيع والخريف. **الضرر:** - تتغذى الحشرات الكاملة والحوريات على عصارة النبات في السيقان والافرع والعناقيد وتفرز الندوة العسلية التي ينمو عليها الفطر الاسود. كذلك يؤدي وجود الندوة العسلية. تجمع التراب على مناطق الاصابة، تتحصر اضرار هذه الحشرة في المناطق الاكثر رطوبة.

عائله القشريات العملاقة **Margarodidae**

تمتاز الانواع التابعة لعائله **Margarodidae** باحتواء الهيموليمف فيها على صبغة الهيموكلوبين الحمراء، كذلك يلاحظ تلطخ اليد بالدم الاحمر عند مسك الجذور بعد قلع النباتات المصابة نتيجة الضغط على الحوريات وتمزق اجسامها، تضم هذه العائلة سبعة انواع تعود لأربعة اجناس سجلت مهاجمتها للعديد من النباتات الاقتصادية في الوطن العربي (الجدول 3-6).

الصفات المظهرية المميزة لعائله القشريات العملاقة:

ان من اهم الصفات المميزة للعائلة ما يأتي:


- 1- الأرجل الامامية للإناث معدة للحفر حيث يتضخم بها الفخذ بشكل كبير، والمخالب يكون متصلب بشكل جيد ويتحد مع الرسخ.
- 2- الاناث عديمة اجزاء الفم ولا تتغذى.
- 3- للعمر الحوري الاول ثلاثة ازواج من الأرجل، فيما تختفي الأرجل في العمر الحوري الثاني المتكيس.
- 4- اجزاء الفم في العمر الحوري الاول والثاني تكون متدللية بشكل حزمة من درقة الدرغ الشفوي (الشكل 3-3).

الجدول (3-6) الاسماء العلمية والعربية الشائعة للأنواع التابعة لعائلته

الحشرات القشرية العملاقة Margarodidae في الوطن

العربي

الاسماء العلمية	الاسماء العربية الشائعة
<i>Icerya aegyptiaca</i> Doughlas, 1890	البق الدقيقي المصري، القشرية الشريطية المصرية، قشرية المزمار المصرية
<i>Icerya purchase</i> Maskell, 1876	البق الدقيقي الاسترالي، البق المغبر العملاق، الحشرة القشرية الصوفية، قرمزية استرالية، قرمزية الليمون، قشرية الحمضيات المحززة، القشرية المعسلة، الكرمس القطني
<i>Icerya seychellarum</i> Westwood, 1855	القشرية الشريطية السيشلية
<i>Matsucoccus josephi</i> Bodenhimer & Harpaz, 1955	حشرة الصنوبر الشمعية
<i>Porphyrophora polonica</i> Linnaeus, 1758	بق القمح الدقيقي
<i>Porphyrophora tritici</i> bodenhimer, 1941	بق جذور الحنطة، بق جذور الحنطة الدقيقي، بق جذور القمح والشعير الدقيقي، بق الحبوب الدقيقي، بق القمح والشعير الدقيقي، لآلى الأرض
<i>Pseudaspidopectus hypheniacus</i> Hall	البق الدقيقي العملاق



الشكل (3-5) رسم تخطيطي لحورية العمر الاول والثاني والانثى البالغة

لحشرة لاليء الارض تتضح فيها اهم الصفات المظهرية

لعائله Margarodidae.

ان من اهم انواع هذه العائلة المسجل وجودها في العراق:

حشرة بق الحنطة والشعير الدقيقي (لاليء الارض): ويطلق على النوعين

Porphyrphora tritici Bod و *P. polonica* L.

أولاً) الانتشار في دول الجوار:- سجل وجود كلا النوعين من بق الحنطة

والشعير الدقيقي في مناطق الحنطة والشعير في سوريا وتركيا وايران. وفي

سوريا منذ عام 1983 سجل وجود النوعان في محافظات الحسكة والرقعة

وحلب وادلب وحمص وحماة ودمشق والسويداء، وقد تسبب النوعان في احداث

خسائر اقتصادية كبيرة لمزارعي الحنطة والشعير وصلت في بعض حقول

محافظة الرقة الى 100 %.

ثانياً) الانتشار في العراق:- ان وجود هذه الحشرة يكاد يقتصر على النوع *Porphyrophora tritici* في بعض مناطق محافظة نينوى مثل ربيعة وتلعفر وسنجار حيث ظهرت في بعض حقول الحنطة والشعير بشكل بؤر متفرقة هنا هناك ولا تتوفر لحد الان احصائيات دقيقة عن المساحات المصابة بالحشرة ومقدار الضرر الذي سببته في الحقول المصابة.

الانواع الاخرى التي يتوقع دخولها الى العراق

ان الجنس *Porphyrophora* spp يضم عدة انواع الا ان هناك نوعين يتوقع دخولها الى العراق في اي وقت هما:

1- *Porphyrophora polonica* L. هذا النوع منتشر حالياً في سوريا وتركيا وايران ويهاجم محصولي الشعير والحنطة.

2- *Porphyrophora medicaginis*: هذا النوع ينتشر في حقول الجت في ايران ويسبب خسائر كبيرة لمزارعي الجت في ايران، الا انه لم يسجل لحد الان في دول جوار العراق الاخرى اضافة لما سبق هناك انواع اخرى سجل وجودها في روسيا ودول القوقاز اضافة الى دول اوربا الغربية وامريكا مثل:

- 1- *Porphyrophora hameli*
- 2- *Porphyrophora akirtobiensis*
- 3- *Porphyrophora altaiensis*
- 4- *Porphyrophora arnebiae*
- 5- *Porphyrophora bolivar*

مظهر الاصابة والضرر:- يختلف مظهر الاصابة والضرر بحسب نوع البق الدقيقي الذي يهاجم محصولي الحنطة والشعير وكما يأتي:

1- بالنسبة للنوع *Porphyrophora tritici* تتغذى حوريات هذا النوع بامتصاص عصارة النبات من منطقة التاج فوق الجذور مباشرة وتحت سطح التربة حيث يتواجد عادة من 2-16 حورية على النبات الواحد مما يسبب موت النبات في اواخر شهر نيسان من مرحلة تكوين السنابل وان الاصابة بهذا النوع لا تظهر للعيان الا بعد موت النبات او اصفراره لان الحوريات توجد تحت سطح التربة.

2- بالنسبة للنوع *Porphyrophora polonica* L.: تهاجم الحوريات هذا النوع اوراق وسيقان و سنابل الحنطة والشعير وتتغذى عليها بامتصاص العصارة وتؤدي في حال الاصابة الشديدة الى موت النبات بالكامل وذلك خلال شهر نيسان وفي حالة الاصابة الخفيفة فأنها تعمل على ضعف نمو النبات وبالتالي ضعف الحبوب الناتجة عنها وخفض كمية الحاصل وتتميز النباتات المصابة بهذا النوع باصفرارها ووجود الحوريات الملاصقة على الاوراق والسيقان والتي يمكن مشاهدتها بالعين المجردة مما يسهل من عملية تشخيص الاصابة بالحشرة على العكس من النوع الاول. ان كلا النوعين يهاجم الشعير والحنطة وهما اشد ضراوة وضررا في الحقول الديمية مقارنة بالمزروعات المروية انظر الصورة (1-3 و 2-3)



الصورة (1-3) حقل مصاب بحشرة بق الحنطة والشعير الدقيقي
(لألى الارض)



الصورة (2-3) مظهر الإصابة على الاوراق والسنايل لبق الحنطة
والشعير الدقيقي *P. polonica*

تاريخ الحياه:- ان تاريخ الحياه لنوعي الحشرة متشابه الى حد كبير مع وجود بعض اوجه الاختلاف الطفيفة، لذلك سيتم شرح تاريخ الحياه لكل نوع على انفراد.

أولاً) النوع *Porphrophora tritici* Bod : تقضي الحشرة فترة بياتها الصيفي Aestivation بطور البيضة داخل حوصلة البيض التي تصنعها الاناث خلال شهر حزيران وتحتوي الحوصلة الواحدة على ما يقرب من 160 بيضة، هذه الحوصلات توجد في التربة او متصلة بقواعد اعقاب سيقان الحنطة والشعير (الصورة 3-3) ومع نهاية الخريف في شهر تشرين الثاني بفس البيض داخل الحوصلة عن حوريات صغيرة تبقى داخل الحوصلة بانتظار ظهور بادرات الحنطة والشعير وتدخل الورقة بين الورقة الاولى والساق، ثم تتجه نزولاً الى الاسفل لتستقر بمنطقة التاج وتتوقف عن التغذية تقريباً لمدة شهر ونصف حتى ترتفع درجة الحرارة حيث تتغذى الحورية الاولى ثم تتسلخ وتبدأ بإفراز الطبقة الشمعية التي تغطيها وهي شبه كروية من الاعلى وذات لون داكن ولامع (انظر الصورة 3-4) هذا العمر الحوري يشاهد عادة خلال شهر نيسان وايار عندما يكون النبات في مرحلة تكوين السنابل. في بداية حزيران تبدأ الاناث بالخروج من اماكن تكوين السنابل في اواخر شهر ايار وبداية حزيران حيث تتجول فوق سطح التربة لمدة 2-3 ايام ويستمر خروج الاناث عادة قبل الذكور، وفي حالة عدم وجود الذكور فان الاناث تتكاثر عذرياً. بعد تجوال الاناث بحثاً عن الذكور وسواء تم التزاوج او لم يتم فان الانثى تستقر في شقوق التربة او قرب نبات عشبي وتبدأ بتكوين حوصلة البيض (انظر الصورة 3-3) حيث تستغرق في تكوين الحوصلة ما

حشرات نصفية الأجنحة الضارة بالنباتات الاقتصادية

بين 11-18 يوم ثم تبدأ بوضع البيض داخل الحوصلة وبعد ثلاث اسابيع من وضع البيض تموت الاناث ويدخل البيض فترة بياته الصيفي لتعيد الحوريات بعد خروجها من البيض دورة الحياة ثانية وهكذا.



الصورة (3-3) لنبات حنطة مصاب ببق الحنطة الدقيق *P. tritici* وتظهر في الأعلى حويصلات العمر الثاني للحشرة



الصورة (3-4) الطور الحوري لبق الحنطة والشعير الدقيقي


ثانياً) النوع *Porphyrophora polonica* L. : تقضي هذه الحشرة فترة البيات الصيفي بطور البيضة داخل حوصلة لبيض وفي بداية الشتاء (كانون الاول - كانون الثاني) يفس البيض وتخرج الحوريات من الحوصلة وتتسلق بادرات الحنطة والشعير لتلتصق بالأوراق وتبدأ بامتصاص العصارة النباتية وتكون الحوريات صغيرة الحجم ولا تظهر اية اعراض للإصابة في هذه المرحلة. نظرا لكون التغذية قليلة وذلك فأنها لا تسبب حتى في اصفرار النبات، تنتقل بعدها الحوريات الى الاوراق الحديثة ومع تقدمها بالعمر وتبدأ اعراض الإصابة بالظهور بشكل واضح في شهر نيسان، ويكون شكل الحورية بيضاوي متطاوول لونها اخضر زيتوني يشبه اوراق النبات وتتركز الإصابة في الحقول اما بشكل بقع في البداية او على اطراف الحقل ثم تعم الحقل بأكمله، وفي اواخر شهر نيسان وبداية ايار تغادر الحوريات نباتات الحنطة والشعير بعد ان تكون قد اكملت نموها متجهه الى التربة لتدخل شقوق التربة او تحت الحجارة الموجودة عند حواف الحقل وفي هذه المرحلة يحدث موت بنسبة عالية خاصة في الافراد التي لا تتمكن من الاختباء في الشقوق او تحت الحجارة. في بداية حزيران تظهر الذكور المجنحة وتكون الاناث غير مجنحة (الصورة 3-5) حيث يتم التزاوج ثم تبدأ الاناث بوضع البيض داخل الحوصلة الشمعية والتي قد يصل الى 200 بيضه. البيض كروي الشكل ابيض شاحب، يفس البيض في الخريف ليعيد دورة الحياة من جديد والشكل (3-4) يوضح دورة حياه هذين النوعين من لآلى الارض.

العوائل الغذائية: - ان نوعي بق الحنطة والشعير الدقيقي يفضلان الشعير على الحنطة في المزروعات الديمية مقارنة بالمروية فضلا عن مهاجمتهم

حشرات نصفية الأجنحة الضارة بالنباتات الاقتصادية


للعديد من الادغال النجيلية مثل الانواع التابعة للأجناس *Agropyron* spp.

Bromus spp.، *Avena* spp.



الصورة (3-5) الطور الكامل لأنثى غير مجنحة وذكر مجنح لبق الحنطة

والشعير الدقيقي *P. polonica*



الشكل (3-6) رسم تخطيطي يوضح دورة حياة بق الحنطة والشعير الدقيقي

وأوقات وجود الاطوار المختلفة للحشرة في الحقل

المكافحة: - ان بق الحنطة والشعير الدقيقي *Porphyrophora tritici* يعد من الآفات الحشرية التي دخلت الى العراق حديثا وبالأخص في محافظة نينوى وهذا يتطلب التعامل معها كافة دخيلة لا تخضع لمقاييس المكافحة التقليدية واتخاذ الاجراءات المناسبة والقاسية في محاولة لإبادتها ومنع توطنها في العراق وانتشارها في جميع مناطق زراعة محصولي الحنطة والشعير ويتم ذلك من خلال اتباع الاستراتيجيات الآتية:

أولا) استخدام التشريعات والقوانين المناسبة: ان استخدام تعليمات وقوانين الحجر الزراعي يمكن ان يؤدي الى الحد من انتشار هذه الحشرة الدخيلة مثل:
1- منع نقل المعدات الزراعية كالمحاريث والبازرات والحاصدات التي استخدمت في المناطق الموبوءة الى المناطق والحقول السليمة لمنع انتشار الحشرة الى مناطق جديدة.

2- منع المزارعين من زراعة الحقول المصابة بالحشرة وتبوير الارض مع الحراثة الصيفية ومكافحة الادغال النجيلية.

3- إلزام اصحاب الحقول والاراضي الموبوءة بالحشرة باعتماد الدورة الزراعية
4- في حالة اصابة جزء من الحقل يفضل حراثة هذا الجزء بعد الانتهاء من حراثة الجزء السليم.

ثانياً) احتواء حشرة بق الحنطة والشعير الدقيقي: ان عملية الاحتواء تتم من خلال التشريعات والتعليمات المذكورة في اولا وذلك لان الحشرة تمكنت من الدخول الى العراق والاستقرار في بعض مناطق محافظة نينوى وبدأت

بالانتشار الى مناطق جديدة ضمن المحافظة وإذا لم تنجح عملية الاحتواء فهي مرشحة للظهور في محافظات العراق الاخرى.

ثالثاً) الإبادة Eradication: كما ذكرنا في البداية فان اجراءات مكافحة الآفات الدخيلة يجب ان تكون من القوة والصرامة بحيث تعمل على منع انتشار هذه الحشرة وحصرها او عزلها بمساحة محدودة جداً، فضلا عن ضرورة المتابعة اليومية لنتائج تأثير طرائق المكافحة المختلفة، الا ان الهدف الذي يجب ان نسعى الى تحقيقه هو اباداة الافة تماما في المنطقة التي تمكنت الافة او الحشرة من اجتياحها.

ان عملية الابادة تتطلب تعاون وتضافر جهود جميع المؤسسات الحكومية ذات العلاقة بالموضوع فضلا عن ضرورة قيام الدولة بالدعم المالي اللازم لتغطية تكاليف الابادة، فضلا عن ضرورة فرض غرامات مالية على الاشخاص والجهات التي لا تلتزم بتنفيذ اجراءات الابادة ان عمليات الابادة الحقيقية يمكن ان تتم بأشراف مؤسسات الدولة المختصة في هذا المجال وذلك من خلال ما يأتي:

- 1- حرق متبقيات النباتات في الحقول المصابة
 - 2- رش التربة بالمبيدات ذات الاثر الباقي مثل الاندوسلفان
 - 3- حرارة التربة مرتين الى ثلاث مرات خلال الصيف
 - 4- تبوير الارض
 - 5- اعادة الخطوات (1،2،3) مرة ثانية
- اجراء فحص دقيق بعد ذلك للتأكد من اباداة الحشرة ولضمان عدم عودة الحشرة يفضل اجراء ما يلي:

- 1- عدم زراعة الشعير لأنه العائل المفضل للحشرة
- 2- معاملة بذور الحنطة التي ستزرع في الاراضي المصابة بالحشرة سابقا بأحد مبيدات الحشرات الجهازية مثل المبيدات التابعة لمجموعة النيكوتين الحديثة Neonectinoides مثل Imidacloprid او thiamethoxam المعروف بالعراق باسم Actara او Crusier.

مكافحة الحشرات القشرية والبق الدقيقي

ان مكافحة هذه المجموعة من الحشرات الضارة بالنباتات الاقتصادية يمكن انجازها باستخدام واحدة او أكثر من طرائق المكافحة التقليدية المعروفة، وان العامل الرئيسي المحدد لعملية اختيار طريقة او طرائق المكافحة التي ستستخدم في المكافحة هو المكان الذي ستنتم فيه عملية المكافحة، ان كانت حقول كبيرة او بيوت زجاجية او حدائق منزلية او حدائق عامة... الخ وكذلك نوع المحصول والقيمة الاقتصادية للمحصول، فضلا عن الوقت من الموسم الذي ستنتم فيه عملية المكافحة. ان من اهم الطرائق المتبعة في مكافحة الحشرات القشرية والبق الدقيقي ما يأتي:

- أولاً) **المكافحة الكيميائية Chemical Control**: ان تحقيق مكافحة كيميائية ناجحة لهذه المجموعة من الآفات الحشرية ينبغي مراعاة ما يأتي:
 - 1- ان الاطوار المتغذية من هذه الحشرات تكون مغطاة بقشور او حراشف شمعية او مسحوق شمعي يوفر لها حماية نسبية من المبيدات.
 - 2- ان الاطوار المتغذية تكون ثابتة غير متحركة على الانسجة النباتية التي تتغذى عليها وهذا يتطلب تغطية النبات بالكامل بمحلول الرش.

3-) ان قشور الحشرات واكياس البيض القطنية تبقى على النبات المصاب بعد موت الحشرات مما يعطي انطباع بان المبيدات لم تكن مؤثرة او فعالة.

ان معالجة المشكلة 1 و2 يمكن ان تتم باستخدام أحد مبيدات الحشرات الجهازية حيث سيصل المبيد مباشرة الى الاطوار المتغذية مباشرة ودون الحاجة الى تغطية النبات لان المبيد ينتقل جهازيا الى جميع اجزاء النبات، هذه المبيدات يكون تأثيرها في الافة المستهدفة فقط من دون التأثير في اعدائها الطبيعية. في حالة عدم توفر مبيدات الحشرات الجهازية، فانه يمكن اختيار أحد مبيدات الحشرات التي تعمل باللامسة ويفضل تلك المجهزة بشكل مركبات قابلة للاستحلاب Emulsifiable Concentrate لاحتوائها على مذيبات عضوية تسهل عملية اختراق قشور او دروع الحشرات القشرية والوصول الى الحوريات المتغذية مباشرة، ويفضل مع مبيدات الحشرات غير الجهازية اعتماد طريقة الرش بالحجم الكبير لضمان تغطيته النبات بالكامل. ان عملية معالجة المشكلة رقم (3) يمكن ان تتم بأخذ عينه عشوائية من النباتات المعاملة بعد مرور 24 ساعة من المعاملة للتأكد من موت الحشرات. تتوفر اليوم مجموعة جيدة من مبيدات الحشرات التابعة لمجموعة الفسفور العضوية ومجموعة البايروثروبيدات المحضرة صناعيا ومجموعة النيكوتين الحديثة Neonicotenoïdes التي يمكن استخدامها في مكافحة هذه الحشرات ضمن التراكيز الموصى بها في علامة المبيد.

ثانياً) **المكافحة الزراعية Cultural Control**: للعمليات الزراعية تأثير متباين في السيطرة على الحشرات القشرية والبق الدقيقي ومن هذه العمليات ما يأتي:

1- الحجر: ان عدم وجود الحشرات القشرية في حقل او بيت زجاجي تجعل من عملية منع دخولها الى ذلك الحقل او المكان مسألة مرغوب فيها للحد من انتشارها، حيث من المعروف ان دخول الحشرات القشرية والبق الدقيقي الى مناطق جديدة يتم دائماً عن طريق استيراد او شراء اصناف نبات مصابة او اجزائه التكاثرية، لذلك فان التفتيش وعمليات الحجر يمكن ان تلعب دورا في خفض الاصابة بهذه المجموعة من الحجر.

2- الدورة الزراعية: يمكن استخدام الدورة الزراعية بنجاح مع الحشرات القشرية التي تصيب النباتات الحولية مثل الحشرة القشرية الرخوة على الحنطة وحشرة لآلى الارض على الحنطة والشعير.

3- النظافة: وتشمل نظافة الادوات الزراعية من ساحبات وادوات بذار وحرثه وتسوية لأنها تعمل على نقل اطوار الحشرة والموجودة في التربة وعلى متبقيات النبات، كذلك فانه عملية النظافة تشمل ازالة الادغال التي تعد عوائل ثانوية للحشرات القشرية والبق الدقيقي.

4- زراعة الشتلات والاصول الخالية من الاصابة بالحشرات القشرية والبق الدقيقي.

5- التبوير: ان ترك الارض بدون زراعه يعني استبعاد العائل المناسب للأفة مما يؤدي الى كسر دورة نمو الحشرة وزيادة اعدادها وعليه فان التبوير يهدف الى تجويع الافه وموتها في النهاية، وقد اثبتت هذه الطريقة

نجاحها مع الحشرة القشرية الرخوة وحشرة لآلى الأرض على محصولي الحنطة والشعير.

6-) الخدمة الجيدة للمحصول: ان الخدمة الجيدة للمحصول تؤدي الى انتاج نباتات قوية تتمكن من تحمل الاصابة الحشرة ومقارنها. ان الخدمة الجيدة للمحصول تتم من خلال تنظيم الري والتسميد المناسب والمتوازن وتهيئه التربة بشكل جيد.

ثالثاً) المكافحة الفيزيائية والميكانيكية Physical and Mechanical

Control: ومن اهم الطرائق الفيزيائية والميكانيكية المستخدمة في مكافحة الحشرات القشرية والبق الدقيقي ما يأتي

1-) الحرق: تستخدم هذه الطريقة في حرق الادغال ومتبقيات النباتات المصابة بالحشرات القشرية للتخلص من مصادر الإصابة.

2-) الحراثة: يمكن استخدام الحراثة الصيفية مع الحشرات القشرية والبق الدقيقي التي يقضي أحد اطوارها الصيف في التربة حيث تعمل الحراثة على تعويض تلك الاطوار لأشعة الشمس ولأعدائها الطبيعية كما قد تعمل على قتلها ميكانيكياً، وقد اظهرت الحراثة نجاحاً في مكافحة الحشرة القشرية الرخوة وحشرة لآلى الأرض على الحنطة والشعير.

3-) اللقط باليد: هذه الطريقة يمكن استخدامها بنجاح لإزالة الاوراق المصابة بالحشرات القشرية والبق الدقيقي في البيوت الزجاجية على نباتات الزينة وفي المنازل ونباتات السنادين في الفنادق والمستشفيات والاماكن العامة.

رابعاً) المكافحة الحيوية **Biological Control:** للحشرات القشرية والبق الدقيقي العديد من الاعداء الطبيعية (طفيليات، مفترسات، ومسببات مرضية)

تلعب دورا في الطبيعة في خفض اعداد هذه المجموعة من الآفات الحشرية بشكل فعال، وهذا يتطلب حماية تلك الاعداء في المناطق التي توجد فيها، ومن اهم هذه الاعداء ما يأتي:

أ- الدعاسيق المفترسة Coccinellidae مثل:

Diomus rubidus
Exochomus nigripennis
Cryptolaemus montrozieri
Hyperaspis pumila
Pullus subvillosus
Scymnus syriacus
Stetharus gilvifrons
Pharoscymnus anchorago
Pharoscymnus smirovi
Pullus ebneri
Nephus quadrimaculatus
Chilocorus bipustulans

1- المفترسات من عائلة Nitidulidae

Cybocephalus ruffrons
Cybocephalus mesopotanicus

2- المفترسات من عائلة Chrysopidae وتضم:

Chrysopa carnea
Dicrodiplosis sp.

3- المفترسات من عائلة Phytoseiidae وتضم العديد من انواع الحلم

المفترس الذي يتغذى على بيض وهوريات الحشرات القشرية.

ب- الطفيليات Parasitoides: من اهم الطفيليات المسجلة على الحشرات

القشرية والبق الدقيقي ما يأتي:

1- *Anagyrus pseudococci* (Gir) ، Encyrtidae

2-*Prochiloneurus aegyptiacus* (Marret) ، Encyrtidae

3-*Chartocerus kurdijumovi* (Nikois) ، Signipharidae

4-*Marictta picta* (Andre) ، Aphelinidae

5-*Tetrastichus* sp. ، Eulophidae

6-*Pachyneuron* sp. ، Pteromalidae

7-*Aphytis phoenicis*

8-*Leptomastidae abnormis*

9-*Aspidiotiphagus lounusbaryi* ، Chalcididae

10-*Aspidiotiphagus citrinus* ، Chalcididae

ان تحقيق مكافحة حيوية ناجحة باستخدام الاعداء الطبيعية السابقة يمكن من خلال انجاز الدراسات الخاصة بتحديد كفاءه تلك الاعداء ودرجة تخصصها وامكانية تربيتها واطلاقها في الحقل عند الحاجة، وقد تم فعلا في اوربا وامريكا انتاج بعض تلك الاعداء الطبيعية تجاريا، وغيرها من المفترسات والطفيليات وفيما يأتي عرض لاهم الاعداء الحيوية والتجارية:

أ- (المفترسات التجارية: ويمثلها الدعسوقة المفترسة *Cryptolaemus*

montrouzieri Mulsont من عائلة Coccinellidae وتسمى بالدعسوقة

الاسترالية او محطمة البق الدقيقي او مفترسة البق الدقيقي. ان الموطن

الاصلي للدعسوقة هو استراليا، يتم انتاجها تجاريا بتربيتها على البق الدقيقي

وتشحن كخنافس بالغة او يرقات مع غذائها هذا المفترس يتغذى على جميع

انواع البق الدقيقي فضلا عن تغذيته على الحشرة القشرية والمن.

الفاعلية الحيوية Biological Activity: تضع الانثى المفترس بيضها

بالقرب او بداخل اكياس بيض البق الدقيقي، ليرقه المفترس اربعة اعمار

واليرقة الكاملة النمو يصل طولها الى 13 ملم وجسمها مغطى بنتوءات

شمعية، تغذية اليرقة في المناطق المجمعة على الساق او تحت الاوراق.

الحشرة الكاملة دعسوقة صغيرة سوداء بنيه ورأسها برتقالي طولها بحدود 4 ملم.

الافتراس Predation: يرقات وبالغات الحشرة تتغذى على البق الدقيقي، اليرقات الصغيرة وبالغات يفضلان بيض البق الدقيقي والحوريات الصغيرة، اما يرقات المفترس الكبيرة فهي تتغذى على جميع اطوار البق الدقيقي.

تاريخ الحياه Life History: تتزاوج الانثى بعد خروجها بفترة قصيرة وتبدأ بوضع البيض خلال خمسة ايام، وان عدد البيض الذي تضعه الانثى يعتمد بدرجة كبيرة على الوجبات الغذائية التي تتبادلها الانثى حيث يتراوح بين 200-700 بيضة / انثى حيث تضع ما بين 7-11 بيضة / يوم. ان فترة نمو وتطور المفترس يعتمد على درجة الحرارة، حيث يفقس البيض خلال 8-9 أيام عند درجة حرارة 21م فيما يفقس من خلال 5-6 أيام عند درجة حرارة 27 م فيما يستغرق العمر اليرقي والعذري الدرجات الحرارية السابقة 19-26 يوم و12-17 يوم و14 و47 يوم على التوالي، البالغات تعيش ما بين 27-70 يوم.

كفاءة المفترس: ان قدرة البالغات على الطيران مكنها من تغطية مساحة واسعة في البحث عن الفرائس، اليرقات بإمكانها استهلاك أكثر من 250 حورية من حوريات البق الدقيقي عند درجة 21 م خلال فترة العمر اليرقي. ان جميع اطوار المفترس تنتشط في الايام المشمسة عند درجات حرارة تتراوح بين 21-29م حيث تتراوح الرطوبة النسبية بين 70-80%. يتوفر هذا المفترس تجاريا بشكل بالغات او يرقات مجهزة بالغذاء ومصدر للماء توضع في قنينه او انبوبة تحوي ما يقرب من 40 خنفساء بالغة وتباع تحت العديد من الاسماء

التجارية مثل Cryptobug و Crypto linem و Cryptosure و Predator و MealyBug.

التطبيق Application: يتم إطلاق المفترس في بداية الربيع عندما تكون أعداد البق الدقيقي منخفضة وبنسبه 5 خنافس كل نبات مصاب او 2-5 خنافس / م2 او 300-3000 خنفساء كل دونم.

ب- الطفيليات Parasitoides: من اهم الطفيليات المتوفرة تجاريا لمكافحة الحشرات القشرية والبق الدقيقي ما يأتي:

- الطفيل *Aphytis melinus*: طفيل على الحشرة القشرية الحمراء ويعود لعائلة Aphelinidae من غشائية الاجنحة. ويسمى ايضا بطفيل القشرية المدرعة. ان الموطن الاصلي للطفيل الهند وباكستان ويتم انتاجه تجاريا بتربيته على الحشرات القشرية وبياع بشكل زنابير بالغه تتغذى على العسل لمدة 24 ساعة قبل شحنها. هذا الطفيل يستخدم لمكافحة الحشرة القشرية الحمراء والحشرة القشرية الشرقية على الحمضيات والزيتون وكذلك القشرية *Aonidiella aurantii* و *A. orientalis* و *nerii Aspidiotus* على نباتات الزينة واللوزيات.

الفاعلية الحيوية Biological Activity: تضع انثى الطفيل بيضها تحت قشرة الحشرة القشرية وعلى جسم حورية العمر الثاني وعلى اناث الحشرات القشرية وعلى جسم حورية العمر الثاني وعلى اناث الحشرات القشرية غير الملقحة التي تطلق الفيرومون لجذب الذكور للتزاوج وفي نفس الوقت يقوم بجذب اناث الطفيل ويفقس بيض الطفيل عن يرقات عديمة الارجل القشرية غير الملقحة التي تطلق الفيرومون لجذب الذكور للتزاوج وفي نفس الوقت يقوم

بجذب اناث الطفيل ويفقس بيض الطفيل عن يرقات عديمة الارجل تبدأ بالتغذية على الحشرة القشرية عن طريق امتصاص سوائل جسمها، وان جميع اطوار الحشرة القشرية تكون معرضة للتغذية من قبل اليرقة. ما عدا الزاحفات، وبعد ان يكتمل نمو يرقة الطفيل تتحول الى عذراء داخل الحشرة القشرية، بعد ذلك تخرج الحشرات الكاملة للتزواج واعادة دورة الحياة.

القدرة التطفلية: للطفيل الواحد القدرة على قتل 30 حشرة قشرية خلال فترة حياته.

وضع البيض: تضع انثى الطفيل تحت قشرة انثى الحشرة القشرية حيث تضع من 1-5 بيضة تبعا لحجم القشرة وتتمكن انثى الطفيل من وضع البيض في ستة حشرات قشرية خلال اليوم الواحد. ان فترة تطور البيض الى الحشرة الكاملة تستغرق من 12-13 يوم وان الحشرات البالغة تعيش لمدة 26 يوم عند توفر الغذاء. يتوفر هذا الطفيل تجاريا داخل صناديق تحوي اوراق رطبة وتوضع الصناديق في مكان بارد، كما يجهز هذا الطفيل داخل كبسولات ويباع تجاريا تحت الاسم *Aphytis melinus*، ويتم استخدامه عن طريق تعليق حاويات الطفيل على انواع الاشجار، ويستخدم بمعدل كبسولة واحدة لكل 9-12 شجرة، ويبدأ إطلاق الطفيل قبل التزهير وتستمر عملية الاطلاق لغاية الخريف، وان الطفيل يكون فعالا جدا قبل طيران ذكور الحشرات القشرية، وان نسبة الاطلاق الموصى بها هي 3000-6000 زنبور / دونم.

• الطفيل *Aphytis liganensis*: يعود لعائلة Aphelinidae من رتبة غشائية الاجنحة ويسمى طفيل القشرية الحمراء او طفيل القشرية المدرعة

وموطنه الاصلي الهند وباكستان. ان عملية انتاج هذا الطفيل وحياتيته وكفاءته تشبه النوع السابق.

- الطفيل *Leptomastix dactylopii*: ويعود لعائله Encyrtidae من رتبة غشائية الاجنحة ويسمى بطفيل البق الدقيقي او طفيل البق الدقيقي الكالسيد Chalcid Mealy bug Parasite، وموطنه الاصلي امريكا الجنوبية ومن المحتمل البرازيل وقد ادخل الى كاليفورنيا في عام 1934 وحاليا ينتشر في معظم دول العالم. تم انتاجه تجاريا بتربيته على عائله معروف بق الحمضيات الدقيقي *Planococcus citri* ويستخدم لمكافحة ال *P. citri* على نباتات الزينة والحمضيات والخضراوات.

الفاعلية الحيوية Biological Activity: تضع انثى الطفيل بيضها في حوريات العمر الثالث للبق الدقيقي، بعد فقس البيض تخرج اليرقات التي تمر بأربعة اعمار يرقيه قبل ان تعذر في مومياءات البق الدقيقي، بعد ذلك تخرج البالغات من فتحه دائريه تصنعها في المومياء، الاناث غير الملقحة تضع بيضا ينتج ذكورا فقط، وفي الظروف المثالية تضع الانثى من 60-100 بيضة خلال 10-14 يوم وعادة تضع الانثى بيضة واحدة في كل حورية من حوريات البق الدقيقي. ان فترة تطور هذا الطفيل تتباين تبعا لدرجة الحرارة حيث تستغرق 45 يوما عند درجة حرارة 17م و12 يوما عند درجة حرارة 30م. للطفيل القدرة على الطيران وهو ذو كفاءة ممتازة في البحث عن عائله. يباع تجاريا بشكل حشرات بالغه او عذارى داخل مومياءات البق الدقيقي تحت العديد من الاسماء منها Leptopar و Lepsure و Leptolined يطلق هذا الطفيل بمعدل 1-2 فرد / م 2 او اكثر من خمسة زنابير / شجرة ويستمر الاطلاق لمدة 4-6 اسابيع. اضافة لما سبق فان هناك عدد كبير من

المفترسات والطفيليات التي تم انتاجها تجاريا للاستخدام في برامج ادارة للحشرات القشرية والبق الدقيقي.

خامساً) الادارة المتكاملة Integrated Managment: وتقوم برامج الادارة المتكاملة على تحقيق التكامل بين طرائق مكافحة المتاحة من اجل خفض اعداد الافة الى ما دون مستوى الحد الاقتصادي الحرج بأقل تكلفه ممكنه ويضمن سلامة البيئة وصحة الانسان. ان تحقيق هذا التكامل يتطلب توفر العديد من المستلزمات التي قد لا تتوفر حاليا في البلاد العربية والعديد من دول العالم الاخرى. ولعل من اهم تلك المستلزمات ما يأتي:

أ- تحديد الحد الاقتصادي الحرج ومستوى الضرر الاقتصادي لأنواع

الحشرات القشرية والبق الدقيقي على عوائلها المختلفة.

ب-تحديد اعدائها الحيوية ودرجة تخصصها فضلا عن الالامام التام بالجوانب التصنيفية والحياتية والبيئية لتلك الأعداء.

ت-تطوير طرائق رصد الآفات واعدائها الطبيعية.

ث-تطوير نماذج تنبؤيه بالظروف المناخية السابقة في المنطقة التي سينفذ فيها برنامج الإدارة المتكاملة.

ج- تطوير سلالات مقاومة من الاعداء الطبيعية للمبيدات المستخدمة في مكافحة الحشرات القشرية والبق الدقيقي.

ح- توفير المبيدات المتخصصة لمكافحة الحشرات القشرية والبق الدقيقي.

خ- تحديد تراكيز المبيدات غير المؤثرة في الاعداء الطبيعية للحشرات القشرية والبق الدقيقي.

د- المعرفة الجيدة بنظام زراعته وخدمة المحصول الذي سيطبق عليه برنامج الإدارة المتكاملة.

الفصل الرابع

الذباب الابيض

افة الزراعة المكشوفة والمغطاة

المقدمة

الموقع التقسيمي لعائلة الذباب الابيض

الذباب الابيض في البلاد العربية

الاهمية الاقتصادية للذباب الابيض

الخصائص البيئية للذباب الابيض

الذباب الابيض والفايروسات

انتشار الذباب الابيض في الانظمة الزراعية

تاريخ حياة الذباب الابيض

الاضرار العامة للذباب الابيض

انواع مهمة من الذباب الابيض

ادارة الذباب الابيض الضار

المقدمة

في العقود الخمسة الاخيرة ظهرت الذبابة البيضاء كأفهم حشرية مهمة في منطقة البحر المتوسط ومنها البلاد العربية وخاصة في مناطق انتاج الخضراوات والقطن، وقد زاد اهتمام العاملين في مجال الزراعة من باحثين ومرشدين زراعيين ومزارعين بهذه الافة ليس لامتصاصها عصارة النبات وافراز الندوة العسلية بل لأنها تعتبر من انشط الحشرات الناقلة لمسببات امراض النبات الفايروسية مثل الفايروس المسبب لمرض اصفرار وتجعد اوراق الطماطة. ان القدرات التي تتمتع بها هذه الذبابة كالقدرة التكاثرية العالية والسريعة وامكانية مهاجمتها لمدى واسع من العوائل النباتية البرية والاقتصادية فضلا عن انتشارها الجغرافي الواسع هذه القدرة جعلت من الذبابة البيضاء مشكلة زراعية تحتاج الى بذل الجهود الكبيرة في مجال البحث والدراسة من اجل فهم كل الجوانب الحياتية والبيئية والسلوكية لتحديد نقاط الضعف والقوة فيها من اجل مكافحتها. ان انتشار هذه الافة بصورة وبائية والخسائر الناجمة عنها، يجعل مهمة هذا الفصل صعبة جدا لأنه يهدف الى تسليط الضوء على كل ما يتعلق بالذباب الابيض.

الموقع التقسيمي لعائلة الذباب الابيض

Aleyrodidae Whiteflies Classification Position

ان الاسم الشائع (الذبابة البيضاء) الذي تعرف به هذه الافة مشتق من الافرازات الشمعية البيضاء التي تكون بشكل مسحوق ابيض يغطي او يزرکش جميع جسم الحشرة الكاملة واجنحتها، وان جذر اسم العائلة Aleyrodidae هو الكلمة اليونانية Aleuro وتعني الطحين ان الاسم الشائع (الذبابة

البيضاء) يوحي بانها تعود لرتبة ذات الجناحين الا انها في الحقيقة تعود لرتبة نصفية الاجنحة وكما يأتي:

Order : Hemiptera
Sub order : Heteroptera
Infra order : Pentatomorpha
Super Family : Aleyrodoidea
Family : Aleyrodidae
Sub Family : Aleyrodicinae
Sub family : Aleyrodinae

تضم تحت عائلة Aleurodicinae 20 جنسا و 130 نوع، اغلبها وجدت في وسط وجنوب امريكا وفي منطقة الكاريبي كما تمتاز ببالغاتها الكبيرة الحجم حيث يصل طولها اكبرها 1 سم. وبأجنحتها ذات التعريق الكثيف والمعقد. اما تحت عائلة Aleurodinae فتضم 140 جنسا وتضم أكثر من 1450 نوعا تنتشر في المناطق الاستوائية والمعتدلة وبالغاتها صغيرة الحجم مقارنة بتحت عائلة Aleyrodicinae.

الذباب الابيض في البلاد العربية

Whiteflies in Arab World

بالرغم من ان هناك ما يقرب من 1560 نوعا موصوفا من الذباب الابيض في العالم، الا ان الاعداد المسجلة في البلاد العربية هي اعداد متواضعة (جدول 9-1) حيث لا تتجاوز الـ 27 نوع.

الجدول (1-4) الاسماء العلمية والعربية الشائعة لأنواع الذباب الابيض
الموجودة في البلاد العربية.

الاسماء العلمية	الاسماء العربية الشائعة
<i>Acaudaleyrodes alhagi</i> Prisner & Hosny, 1934	الذبابة البيضاء، ذبابة الرمان البيضاء
<i>Acaudaleyrodes citri</i> Prisner & Hosny, 1934	الذبابة البيضاء، ذبابة التوت البيضاء، ذبابة الحمضيات البيضاء، ذبابة الحمضيات السوداء، ذبابة الخضراوات البيضاء، ذبابة الموالح البيضاء، ذبابة النبق البيضاء
<i>Aleurocanthus woglumi</i> Ashby, 1915	الذبابة البيضاء، ذبابة الحمضيات السوداء
<i>Aleuroclava jasmine</i> Takahashi, 1932	ذبابة الياسمين البيضاء
<i>Aleurolobus olivinus</i> silverstri, 1911	ذبابة الزيتون البيضاء
<i>Aleurothrixus floccosus</i> Maskell, 1895	الذبابة البيضاء الزغبية، الذبابة البيضاء الصوفية، الذبابة الصوفية البيضاء
<i>Aleyrodes fragariae</i> Walker, 1848	ذبابة الفريز البيضاء
<i>Aleyrodes lonicerae</i> Walker, 1852	ذبابة الفريز البيضاء
<i>Aleyrodes proletella</i> Linnaeus, 1758	ذبابة القرنبيط البيضاء، ذبابة الكرنب البيضاء، ذبابة الكمثرى
<i>Aleyrodes rubi</i> Signoret, 1868	ذبابة الفريز البيضاء
<i>Aleyrodes spiraeoides</i> Quaintance, 1900	ذبابة الايرس البيضاء، ذبابة زهر السوس البيضاء، ذبابة السوسن البيضاء
<i>Bemisia tabaci</i> Gennadius, 1899	ذبابة البطاطا الحلوة البيضاء، الذبابة البيضاء، ذبابة التبغ البيضاء، ذبابة الخضراوات البيضاء، ذبابة الطماطة البيضاء، ذبابة القطن البيضاء، الفرفور الأبيض
<i>Dialeurodes Kirkaldyi</i> kotinsky, 1907	ذبابة الفل البيضاء، ذبابة القطن البيضاء، ذبابة كيركالدي البيضاء، ذبابة الياسمين البيضاء
<i>Neomaskellia myricae</i> Kuwana, 1927	
<i>Paraleyrodes minei</i>	ذبابة مينو البيضاء

Laccarino، 1989	
<i>Singhiella elbaensis</i> Priesner & Hosney، 1934	ذبابة البيضاء
<i>Singhius hibisci</i> Kotinsky، 1907	ذبابة الخبازي البيضاء
<i>Siphoninus finitimus</i> <i>silvestri، 1915</i>	ذبابة التفاح البيضاء، ذبابة التين البيضاء
<i>Siphoninus granati</i> prisoner & Hosny، 1932	ذبابة الرمان البيضاء
<i>Siphoninus phillyrese</i> Gautier ، 1949	الذبابة البيضاء، ذبابة التين البيضاء، ذبابة الرمان البيضاء
<i>Trialeurodes abutilonea</i> Haldeman، 1850	الذبابة البيضاء ذو الأجنحة المخططة
<i>Trialeurodes floridensis</i> Quaintance، 1900	ذبابة ثمرة الأفوكادو
<i>Trialeurodes packardi</i> Morril، 1903	ذبابة ثمرة الفريز البيضاء، ذبابة ثمرة الفريز البيضاء، ذبابة الفراولة البيضاء
<i>Trialeurodes ricini</i> Misra، 1929	ذبابة الخروع البيضاء
<i>Trialeurodes sp</i>	الذبابة البيضاء
<i>Trialeurodes vaporariorum</i> Westwood، 1856	ذبابة البيوت البلاستيكية البيضاء، ذبابة البيوت الزجاجية البيضاء، ذبابة الحمضيات البيضاء، ذبابة نباتات الزينة البيضاء
<i>Trialeurodes vittata</i> Quaintance ، 1900	ذبابة ثمرة العنب البيضاء، ذبابة العنب البيضاء

الاهمية الاقتصادية للذباب الابيض

Whiteflies Economic Importance

تتباين الاهمية الاقتصادية للذباب الابيض وذلك تبعاً للنوع الحشري والعائل النباتي والمنطقة الجغرافية والنظام الزراعي السائد في المنطقة. ان الاهمية الاقتصادية للذباب الابيض تتضح من خلال ما يأتي:

1- انتشارها العالمي:- تنتشر انواع الذباب الابيض في مساحات جغرافية واسعة حيث وجدت انواعها في المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية فضلا عن انتشارها في المناطق المعتدلة من العالم كما وجدت العديد من انواع الذباب الابيض في المناطق الباردة خاصة في انظمة الزراعة المحمية. ان هذا الانتشار الواسع ربما يرجع الى قدرتها على التكيف وتنوع عوائلها الغذائية.

2- المدى العائلي الواسع:- تشير المراجع الى ان عدد العوائل الغذائية التي يهاجمها الذباب الابيض في مناطق العالم تقترب من ال 500 نوع نباتي تتوزع ما بين نباتات او محاصيل ذات اهمية اقتصادية ونباتات بريه. في البلاد العربية تضم قائمة العوائل النباتية ذات الاهمية الاقتصادية القطن والطماطه والبادنجان والبطاطا والخيار والكوسا والبطيخ والبطاطا الحلوة واللهايه والقرنبيط والرمان والتفاح والحمضيات والعنب والورد والفاصوليا بأنواعها والبرسيم والجت والذرة الصفراء والحلوة فضلا عن نباتات الزينة وقائمه طويله من انواع النباتات البرية.

3- القدرة العالية على التكاثر:- للذباب الابيض قدرة عالية على التكاثر من حيث عدد اجيالها خلال الموسم الواحد او عدد الذرية الناتجة عن كل زوج وخصوصا عندما تكون الظروف الجوية مناسبة ففي وادي الاردن استطاعت الحشرة ان تكون 15 جيلا خلال الموسم في الظروف المثالية ويستطيع الزوج الواحد من الحشرات ان ينتج 184 حشرة في كل جيل في الصيف تحت درجة حرارة 25-29 م الا ان عدد الحشرات يتناقص عندما تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض لتصل الى 18 حشرة / زوج وهو الحد الأدنى عند درجة حراره 14م. ان متوسط عدد الاجيال في معظم مناطق انتاج

الخضراوات في العالم العربي قد يصل الى 7 اجيال ليستطيع خلالها الزوج الواحد من انتاج 100 فرد في كل جيل من الناحية النظرية فان زوجا واحدا من الذبابة البيضاء يستطيع ان ينتج بعد مرور الذبابة بـ 7 اجيال خلال موسم واحد ما مجموعه 700 مليار حشرة كاملة نصفها من الذكور والآخر من الاناث.

4- امتصاص العصارة النباتية:- تبدأ حوريات الذباب الابيض ومنذ خروجها من البيضة بامتصاص عصارة النبات العائل من انسجة اللحاء وتستمر ملازمة للنبات العائل وحتى موت الحشرة الكاملة وقد اظهرت الدراسات ان انثى الذبابة تستمر بالتغذية دون التوقف حتى اثناء التزاوج ووضع البيض وانها لا تترك عائلها الا في حاله موتها او موت عائلها.

5- نقل الامراض الفايروسية:- ان من اهم اخطار الذبابة البيضاء في البلاد العربية والذي يزيد من اهميتها الاقتصادية هو قدرتها على نقل العديد من الفايروسات الممرضة للنبات وبطريقه كفؤه حيث تشير الدراسات والبحوث المنجزة في المنطقة العربية الى ان عدد الامراض الفايروسية التي تنقلها الذبابة البيضاء قد بلغت 9 امراض تتميز معظمها بأعراض تجعد الاوراق او اصفرها او كليهما معا ومن هذه الامراض:

* اصفرار وتجعد اوراق الطماطه

* اصفرار عروق اوراق الخيار

* تجعد اوراق البطيخ

دراسات عالميه اشارت الى ان للذباب الابيض القدرة على اكتساب ونقل أكثر من 200 فايروس واغلبها تعود للفايروسات من مجموعه Begomovirus.

6- **الندوة العسلية:** - تفرز الذبابة البيضاء مادة عسلية لاصقة تنتشر على اجزاء النبات وازهاره مما يقلل من القيمة الجمالية والتجارية بالنسبة لنباتات الزينة وعلى الثمار فتخضع قيمتها التسويقية وعلى الاوراق حيث تشجع نمو فطريات العفن الاسود وتحجب اشعة الشمس من الوصول الى الخلايا السطحية للأوراق، هذه الافرازات في النهاية تضيف عاملا اخر لجعل هذه الحشرة مشكلة اقتصادية تستحق الاهتمام.

الخصائص البيئية للذباب الأبيض

Ecological Characteristics of Whiteflies

ان عاملي الحرارة والرطوبة يعدان من أكثر العوامل البيئية في نمو وتطور اطوار الذباب الابيض والقيام بعملياتها الحيوية ومنها عملية التكاثر، لذلك فان مراقبة وقياس الظروف الجوية يزيد من قدرتنا على خفض الاضرار الناجمة عن الذباب الابيض، ومن هنا من الضروري ان نتذكر ان الذباب الابيض يتقبل الظروف او الاجواء الاستوائية من طقس حار او رطب ومظلل، وفيما يلي ملخص في اهم الواجه التي تربط بين الظروف الجوية ونمو الذباب الابيض وتكاثره:

1- ان درجة الحرارة 27م هي الدرجة الحرارية المثلى لنمو الذباب الابيض وتكاثره حيث تكمل دورة حياتها في أقصر مدة والتي بلغ متوسطها اسبوعين في حالة كون الرطوبة النسبية 60%.

2- تزداد المدة التي يكمل فيها الذباب دورة حياته في كل جيل كلما ارتفعت درجة الحرارة عن 27م او انخفضت عن ذلك اذ تصل المدة في المتوسط الى 5 اسابيع في الربيع والخريف في مناخ البحر المتوسط الطبيعي

(لبنان، غرب سوريا، فلسطين، المرتفعات الاردنية، شمال تونس، والجزائر
وغرب المغرب وشمال مصر) وحوالي 8 اسابيع في الشتاء، وتطول هذه
المدة او تقصر بالقدر الذي تختلف فيها درجات الحرارة عن اعتدالها، اذ
تقصر هذه المدة في مناطق مثل شتاء وادي الاردن او شتاء الامارات
وعمان وجنوب العراق ومنطقة الاحساء في السعودية. مما سبق نستنتج
ان الذبابة تكمل ما بين 10-12 جيلا في الصيف الذي يسود مناطق
ساحل لبنان وغزة وسوريا وشمال تونس والجزائر وغرب المغرب وما
متوسطه 14-16 جيلا طيلة العام في مناطق مثل وادي الاردن والدلتا
المصرية.

(3-) يفقس بيض الذباب الابيض بعد ستة ايام من وضعه في الصيف
المعتدل (25-28م) فيما يستغرق الطور الحوري عشرة ايام للوصول الى
طور الحشرة الكاملة تحت الظروف نفسها.

(4-) تتوقف اناث الذباب الابيض عن وضع البيض عندما تنخفض درجة
الحرارة الى اقل من 14 م وعند سقوط الامطار او عند انخفاض الرطوبة
النسبية الى اقل من 60% فمثلا يحدث في ايام هبوب رياح الخماسين
وفي أشهر الصيف الحارة والجافة الا ان الانثى لا تموت تحت هذه
الظروف، اذ تبقى قادرة على وضع البيض عند زوال هذه الظروف.

(5-) تموت الذكور في الجو الجاف والحار الذي ترتفع فيه درجة الحرارة عن
35 م وينخفض الرطوبة النسبية فيه عن 60% وبالتالي فان اعداد
الاجيال التي تلي هذه الظروف الجوية تكون قليلة نظرا لضعف عمليات
التزاوج او انقطاعها كما يحدث خلال أشهر الصيف الحارة الجافة في

مناطق مثل وادي الاردن والمناطق الداخلية في مصر والمغرب والرياض
وبغداد.

6-) يقل نشاط الذباب الابيض بجميع اطواره كما تنخفض كفاءته في القيام
بالعمليات الحيوية مثل التزاوج ووضع البيض والفقس والنمو وذلك عندما
تنخفض درجات الحرارة والرطوبة عن المستويات المثالية ويتناسب النشاط
عكسيا مع مزيد من انحراف الطقس عن المستوى المثالي فكلما انخفضت
درجة الحرارة او زادت يقل نشاط الذبابة أكثر وأكثر الى ان تتوقف تماما
تحت الظروف التي سبقت الإشارة إليها في رقم (4).

الذباب الابيض والفايروسات Viruses and Whiteflies

سبقت الإشارة الى ان أحد اهم اخطار الذباب الابيض هو قدرته على نقل
العديد من الفايروسات النباتية ومن اهم هذه الفايروسات فايروس تجعد
واصفار اوراق الطماطه التي ينتشر بشكل وبائي في مزارع الطماطه في
جميع الدول العربية وفيما يأتي اهم المعلومات المتعلقة بنقل فايروس تجعد
واصفار اوراق الطماطه من قبل الذباب الابيض:

1-) تصبح الذبابة البيضاء الكاملة ناقله للفايروس بعد ان تتغذى على نبات
طماطه مصابه بالفايروس لمدة 24 ساعة وبذلك تستطيع نقل الفايروس
الى نبات سليم عند انتقالها من نبات لآخر.

2-) تبقى الذبابة معدية وقادرة على نقل الفايروس لمدة 10-12 يوم من وقت
حصولها على الفايروس الا ان كفاءتها على العدوى تقل تدريجيا مع
مرور الوقت بعد اكتسابها للفايروس ولحسن الحظ لا تستطيع الذبابة
البيضاء اكتساب او تجديد مخزونها من الفايروس طالما ان هناك بقايا

فيه من الاكتساب الاول الا ان الذبابة تصبح قادرة على اكتساب الفايروس لدورة اخرى اذا تخلصت من الفايروس او بعد مرور من 10-12 يوم من الاكتساب الاول ويسمى هذا بالاكتساب الدوري هذا الاكتساب او هذه العلاقة اقرب ما تكون الى العلاقة الميكانيكية وهذه العلاقة لا توفر الفرصة الكافية لتكاثر الفايروس داخل الذبابة وبمعنى اخر ان الذبابة الحاملة للفايروس تصبح غير معدية بعد مرور 10-12 يوم من اكتسابها للفايروس ولا تتمكن من نقل الفايروس الا اذا جددت مخزونها من الفايروس من خلال التغذية لمدة 24 ساعه على نبات طماطه مصاب.

3-) تتحرك الذبابة البيضاء بأعداد منها ما هو معدي وما هو غير معدي ولكن إذا زاد عدد الذباب الناقل للفايروس عن 5% من العدد فان ذلك يكفي لنقل المرض. وفي الواقع فان الذبابة البيضاء توجد بأعداد هائلة اثناء موسم الزراعة والنمو بشكل يؤمن العدوى الكاملة لمحصول الطماطه بالمرض مهما كانت نسبة الذباب المعدي بين الانواع الموجودة فقد تبين ان الاعداد التي تهبط على حقل الطماطه في الموسم المثالي تصل ما بين الفين الى 20 ألف ذبابة للمتر الواحد في وادي الاردن على سبيل المثال وهذه الاعداد تكفي عادة لأحداث عدوى بالمرض تشمل مائه بالمئة من النباتات مهما كانت نسبة الحشرات الناقلة للمرض.

4-) تبدأ الإصابة في العادة على اطراف الحقل السليم (عندما لا تكون الاشتال قد نقلت الى الحقل وهي غير مصابه بالفايروس) وهو مؤشر من ان الذبابة المعدية قد حطت على تلك الاطراف وسرعان ما تنتقل

الإصابة الى النباتات المجاورة تبعا لاتجاه حركه الريح الى ان يصاب الحقل بكامله وعندما تترك الذبابة دون مكافحة والامر الخطير بطبيعة الحال هو نقل الشتلات الى الحقل الدائم وهي مصابه بالفايروس وهذا يعطي للذبابة فرصتها الذهبية لنشر الفايروس في النباتات السليمة على اوسع نطاق وفي سرعه كبيره تتناسب وسرعه الريح في المنطقة ومن الجدير بالذكر هنا ان الذبابة البيضاء تستطيع الحصول على فايروس تجعد واصفرار اوراق الطماطه من مصادر عدوى متعددة منها نباتات الطماطه المصابة في اي وقت من السنه وعدد من النباتات الاخرى التي تصاب بالفايروس مثل التبغ والمديد والخبيزة والفاصوليا المتسلقة.

انتشار الذباب الابيض في الانظمة الزراعية

Agircultural Systems and Whiteflies Distribution

تنتشر الذبابة البيضاء في اربعة نظم زراعيه في المنطقة العربية اولها واهمها نظام زراعه الخضراوات في الحقل المفتوح ربا سواء باستعمال التقنيات الحديثه (اصناف الخضراوات الهجينة، الري الحديث بالتنقيط او الرش، واستخدام البلاستيك الاسود لحفظ الرطوبة واستخدام المصاطب لزراعة الشتلات قبل نقلها للحقل واستعمال الاسمدة الورقية ومنظمات النمو وغيرها) اما النظام الثاني فهو زراعه الخضراوات تحت الانفاق او في البيوت البلاستيكية المحمية او الزجاجية واما النظام الثالث فيشمل زراعه الاشجار المثمرة اما تحت الري المنتظم او الري التكميلي او مطريا تبعا لنوع الفاكهة او المنطقة، ان الاشجار التي تدخل في هذا النظام هي الحمضيات والتفاح والرمان والاجاص وهناك النظام الرابع وهو زراعه المحاصيل الصناعية مثل القطن والتبغ وغيرها من

المحاصيل التي تزرع في العادة تحت الري بمستويات متفاوتة من المدخلات التقنية. تشكل الذبابة البيضاء مشكله حقيقية وتسبب خسائر فادحة بصورة مباشرة في النظم الثلاثة الاول والثاني والرابع ولكنها ليست مشكله مقلقه في النظام الثالث وهي الاشجار المثمرة. وتكمن مشكله الذبابة البيضاء انها اصبحت افه مستعصية نظرا لازدياد اعدادها وانتشار اطوارها المختلفة على المحاصيل الاقتصادية والنباتات البريه وبمعنى اخر تكون للذبابة في نظم الزراعة العربية مخزونا من اعدادا الذبابة تشكل مصدر عدوى للظروف الجوية وطرائق المكافحة المستعملة وكثافه النباتات المزروعة والذي يزيد من خطورة هذه الافه ان معظم المحاصيل ان لم يكن اغلبها التي تستعمل في النظم الزراعية الأربعة تشكل عوائل مناسبة للذبابة بل ان عدد منها تشكل افضل العوائل مثل افراد العائلة الباذنجانية والقثائية والصليبية والبقولية وهناك عامل اخر وهو ان البيئات الزراعية في معظم البلدان العربية تسمح بإنتاج المحاصيل التي تصاب بالذبابة على مدار العام وبالتالي تشكل حلقة كاملة لبقاء الذبابة بأعداد واجيال تهدد بانتشار الافه بصورة وبائية في هذه المنطقة الزراعية او تلك على مدار العام ففي مصر على سبيل المثال حيث يوجد اكثر النظم الزراعية كثافه حيث تزرع المحاصيل التي تهاجمها الذبابة البيضاء على مدار العام مهية بذلك بيئة صالحة لتكاثرها المستمر كما يسود في الاردن بيئتين زراعتين رئيسيتين وجد اولهما في وادي الاردن والاعوار التي تقع في جنوب البحر الميت وثانيهما في المرتفعات الجبلية وسهول البادية حيث تزرع الخضار ربا في كليهما ويبدأ موسم الزراعة في وادي الاردن والاهوار الجنوبية في نهاية الصيف ويستمر طيلة اشهر الشتاء والربيع وتنقطع الزراعة اعتبارا

من شهر حزيران (الشهر السادس) وحتى منتصف اب (شهر الثامن) ولكن الذبابة تجد ما يكفي لبقائها في هذه المناطق خلال اشهر الصيف فتعيش على الحمضيات المنتشرة في تلك المنطقة وعلى العوائل البريه المنتشرة على جوانب قنوات الري ومحاصيل الخضر الموجودة في السفوح المجاورة لمنطقة وادي الاردن بالإضافة الى بعض المحاصيل المتبقية من الموسم السابق من طماطة وبادنجان وغيرها التي يستمر نموها في المناطق الظليلة بين الاشجار وعلى جوانب الطرق والقنوات. تبدأ اعداد الذباب الابيض بمهاجمة الخضراوات التي تزرع في نهاية الصيف والخريف وتزداد اعدادها في منتصف الخريف اذ تصبح الظروف البيئية من حراره ورطوبة مثاليه لتكاثر الذباب بشكل وبائي وتقل اعدادها خلال اشهر الشتاء تبعاً لمدى انخفاض درجة الحرارة وسرعان ما تتابع الذبابة تكاثرها بشكل وبائي خلال اشهر الربيع ثم تنخفض اعدادها قليلا في شهري ايار وحزيران هذه الظروف تسمح للذباب الابيض بالمرور في 10-12 جيل تتكاثر خلالها بأعداد هائلة تسبب خسائر فادحة عن طريق امتصاص عصاره النبات ونقلها للعديد من الفايروسات ومنها فايروس تجعد واصفرار اوراق الطماطه.


اما في المرتفعات الأردنية حيث تنقطع زراعه الخضراوات الهامة طيلة أشهر الشتاء، فان الذبابة البيضاء تبدأ نشاطها وبأعداد قليلة نسبيا في نهاية الربيع للتكاثر مع ارتفاع درجة الحرارة في بدايه الصيف وما يتلوه من فترات النمو وحتى نهاية شهر تشرين الاول وتستطيع الذبابة من الناحية النظرية ان تتكاثر في هذه المنطقة من خلال 10 اجيال على الاقل. في العراق ودول الخليج العربي فان خطر الذباب الابيض يشهد بالزراعات المكشوفة اعتبارا من نهاية

أشهر الخريف مروراً بأشهر الشتاء والشهر الأول والثاني من الربيع وبالتالي فان مثل تلك الظروف تسمح بتكاثر الذباب الابيض من خلال 8 اجيال على الاقل وخصوصا على الخضراوات التي يتم زراعتها بين الاشجار المثمرة. ان ما ذكرناه عن وبائية الذباب الابيض في المرتفعات الأردنية ينطبق بصورة او بأخرى على مناطق انتاج الخضراوات خلال اشهر الربيع والصيف والخريف في بلدان مثل لبنان وسوريا وليبيا وتونس والجزائر والمغرب التي تقع معظم مناطق انتاج الخضراوات فيها تحت بيئة البحر الابيض المتوسط فأينما تزرع الطماطه في الوقت الحاضر ينتشر فيها اصفرار وتجعد الاوراق الفايروسي بدرجات متفاوتة من الشده اذ استوطن هذا المرض في جميع بلدان المنطقة العربية واصبح يهدد نجاح زراعه الطماطه في معظم المواسم نظرا لوجود الذبابة البيضاء الناقل ومصادر العدوى للمرض والظروف الجوية المناسبة في ان واحد اما في السودان فان خطر الذبابة يظل محدودا على الخضراوات لقله ما يزرع منها هناك الا انها تشكل افه هامه لمحصول القطن الذي يعتبر احد اعمدة الزراعة.

تاريخ حياة الذباب الأبيض Whiteflies Life History

التكاثر في الذباب الابيض عادة هو تكاثر جنسي يتم من خلال التزاوج بين الذكور والاناث التي تبدأ بعد ذلك بوضع البيض على السطح السفلي لأوراق العائل النباتي، البيض بيضوي الشكل ويوضع على سويق قصير جدا مغروس في خلايا الورقة النباتية وللبيض سطح أملس لامع، وفي الغالب تعمل الانثى على وضع البيض في دوائر Circles او على شكل اقواس Arcs، تضع الانثى الواحدة خلال فترة حياتها ما بين 150-250 بيضة وذلك تبعا لنوع

الذبابة ونوع العائل الغذائي والظروف الجوية السائدة في منطقة وجود النوع. تتباين فترة حضانة البيض ونسبة الفقس تبعاً للنوع الحشري ونوع العائل الغذائي والوقت من الموسم والظروف الجوية السائدة في المنطقة. يفقس البيض عن حوريات العمر الأول التي تتجمع قرب أماكن وضع البيض وتسمى بالزاحفات Crawlers حيث تقوم بالتجول على السطح السفلي لأوراق العائل النباتي لتقوم بغرز أجزاء فيها حيث تبدأ بالتغذية بعد ذلك تتسلخ إلى العمر الحوري الثاني حيث تصبح الحورية في هذا العمر غير متحركة Immobile أي أنها تبقى ثابتة في موقعها ولا تنتقل إلى مكان آخر وبعد أن يكتمل العمر الحوري الثاني وتتسلخ إلى العمر الحوري الثالث وفي نهاية هذا العمر تتوقف الحورية عن التغذية وتدخل في طور العذراء أو طور الراحة وبعد اكتمال هذا الطور تبدأ الحشرات الكاملة المجنحة بالظهور للتزاوج وتعيد دورة الحياة ثانية وهكذا (الشكل 4-1). أن فترات الأعمار الحورية وطور العذراء وطور الحشرات الكاملة وفترة الجيل وعدد الأجيال في السنة تتباين هي الأخرى تبعاً لنوع الذبابة ونوع العائل الغذائي والظروف الجوية السائدة في منطقة انتشار النوع.



الشكل (1-4) دورة الحياة العامة للذبابة البيضاء

الاضرار العامة للذباب الأبيض

Whiteflies General Damage

تستخدم حوريات وكاملات الذباب الابيض اجزاء فمها الثاقبة الماصة في التغذية على انسجة لحاء النبات العائل وذلك عن طريق امتصاص العصارة النباتية بشراهة حيث تؤدي هذه العملية الى ضعف النبات بشكل عام وخفض انتاجية النبات كما ونوعا ان عملية ثقب النسيج النباتي للتغذية يؤدي الى ظهور بقع موضعية ذات لون اصفر تتحول فيما بعد الى اللون البني وفي حالة الاصابة الشديدة تتساقط الاوراق المصابة مما يؤدي في النهاية الى ضعف نمو النبات وتقزمه، ان ازالة الحشرات من على الاجزاء المصابة لا يؤدي الى استعادة النسيج الخضري لعافيته.

ان الاوراق المصابة من الخضراوات بالذباب الابيض يظهر عليها شريط ابيض خاصة في منطقة العروق، وان تغذية اطوار الذباب الابيض على النبات العائل تؤدي الى حالات النضج غير المنتظم او غير المتجانس Irregular ripening لثمار النبات العائل، هذه الظاهرة سجلت في محصول الطماطة حيث لوحظ ان تغذية الذبابة البيضاء على المجموع الخضري لنبات الطماطة وبالرغم من عدم تضرر المجموع الخضري للطماطة فان جزءا من المحتوى الداخلي للثمار لا ينضج بشكل جيد، حيث تظهر بقع او اشربة صفراء على سطح تلك الثمار. ان الاصابة بذبابة القرع البيضاء *Bemisia argentifolli* تؤدي الى تحول عروق اوراق القرع الى اللون الابيض وكذلك البتلات وفي حالة الاصابة الشديدة قد تصبح الثمار بيضاء اللون وكذلك انسجة الورقة بين العروق. ان النتيجة الحتمية لعملية امتصاص العصارة النباتية هو افراز كميات كبيرة من الندوة العسلية التي تشجع نمو فطريات العفن الاسود *Sotty mold* وتراكم الغبار مما يؤدي الى خفض كفاءة عملية التركيب الضوئي في انسجة الاوراق المصابة. اضافة لما سبق فان للعديد من انواع الذباب الابيض القدرة على نقل العديد من الفايروسات الممرضة للنبات والتي قد يزيد من ضرر ووبائية الذباب الابيض.

انواع مهمة من الذباب الابيض

Whiteflies Important Species

بالرغم من وجود 27 نوع من الذباب الابيض في البلاد العربية (الجدول 4-1) الا ان أكثر الانواع شيوعا وانتشارا في المنطقة العربية هما النوعان:

ذبابة البيوت الزجاجية البيضاء *Trialeurodes vaporariorum*

ذبابه التبغ البيضاء او ذبابه القطن البيضاء *Bemisia tabaci*

وفيما يأتي عرض لاهم الجوانب الحياتية لذبابة التبغ البيضاء وتسمى ايضا

ذبابه البطاطا الحلوة *Sweet Potato Whiteflies*

وذبابه القطن البيضاء *Cotton Whiteflies*

الانتشار: - هذه الحشرة شائعة الانتشار في المناطق الاستوائية وشبه

الاستوائية في افريقيا وامريكا واسيا كما انها معروفة في منطقة البحر المتوسط

والقريبة منها فهي موجودة في افغانستان والهند وباكستان وايران ولبنان سوريا

واليمن ومصر والسودان وفي العراق.

العوائل: - ان لذبابه التبغ البيضاء العديد من العوائل ويصل عدد عوائلها الى

اكثر من خمسين نوع تعود الى 17 عائلة نباتية ثلثا هذه العوائل هي من

النباتات الاقتصادية والثلث الاخر يشمل نباتات بريه او ادغال. أكثر النباتات

التي تصيبها هذه الحشرة تعود للعائلة القثائية والعائلة الخبازية والعائلة

الباذنجانية والعائلة الصليبية. فمن هذه النباتات انواع تتضرر كثيرا مثل القطن

والخيار والبطاطا والطماطه والباذنجان والقرنبيط.

الضرر والاهمية الاقتصادية: - تتغذى هذه الحشرة كبقية افراد رتبة نصفية

الاجنحة على امتصاص عصارة النبات. فتمتص الحوريات بكل اطوارها

والحشرات الكاملة عصارة النبات العائل من السطوح السفلى للأوراق وبما ان

هذه الحشرات تعيش متجمعة وبأعداد كبيرة ولطبيعة تغذيتها فان اضرارها

بالغ. ومما يزيد من اضرارها افرازها داخل انسجة النبات لعابا يحتوي انزيمات

لتسهيل هضم ما تمتصه من غذاء. ولهذه الانزيمات أثر ضار على النبات

فتؤدي الى موت انسجته وجفافه كما انها تفرز كمية غزيرة من الرضاب او

الندوة العسلية على النبات العائل والنباتات التي تعيش عليها فتنمو عليها الفطريات فتلتصق عليها الأتربة وينجذب اليها النمل. يتضرر منها الخيار في العروة الخريفية كثيرا نظرا لان اعدادها تصل الى بضع مئات من الحوريات على الورقة الواحدة. حتى ان الاتربة تحت النباتات تبدو رطبه من غزاره الرضاب الذي تفرزه الحشرات وهي بذلك تسبب اصفرار الاوراق وتجعلها وتؤدي الى قصر عمر النبات وقله انتاجه، اما على القطن فتزداد اعدادها في الخريف حيث تبدو الإصابة بها في حقل القطن واضحة وتتميز عن بعد من اللمعة على اوراق النباتات المصابة الناتجة من مادة الرضاب التي تسيل على الاوراق. من المعروف عن الذبابة البيضاء انها تنقل فايروسات مسببه امراضا نباتيه بين بعض انواع عوائلها النباتية، مثل فايروس مرض اصفرار عروق الخيار CVYV وفايروس تجعد واصفرار اوراق الطماطه TYLCV وفايروس تجعد اوراق القطن وغيرها. الذبابة البيضاء افه مهمه في كل من سوريا والسودان وظهرت اهميتها في السنين الاخيرة على الطماطه في الزراعة المحمية في العراق والاردن وذلك لنقلها فايروس تجعد واصفرار اوراق الطماطه. وقد تسبب موت جميع النباتات من بعض البيوت المحمية مما يضطر الى اعادة زراعتها.

تاريخ الحياه والوصف:- الحشرة الكاملة الانثى صفراء طول جسمها 0,9 - 1,4 واقصى عرض (0,3-0,4) ملم وعيناها سوداوان ومتباعدتان عن بعضهما. قرنا الاستشعار مكون من سبعة قطع وبطول 0,2-0,3 ملم. واجنحة الحشرة (عددتها اربعة) شفافة ومغطاه بمسحوق شمعي ابيض. طول الجناح الامامي 0,9 وعرضه 0,3 ملم، الارجل الخلفية اطول من كل من

الأمامية والوسطى. اما الذكر فأصغر من الانثى، طول جسمه 0,2X1,0 ملم وكذلك الحال في قرني الاستشعار والاجنحة فهي الاصغر. بطن الذكر تستدق نحو النهاية والملاقط التناسلية (في السوءة) رفيعة ومغطاه بشعيرات. والقضيب منحني قليلا وأقصر مما في ال Parameres.

تقضي الحشرة فصل الشتاء في الطور الحوري الجالس على السطوح السفلية للأوراق. وفي الربيع تظهر الحشرة الكاملة وتتراوح ثم تبدأ الانثى في وضع البيض. تضع الانثى معظم بيضها اعتياديا على السطوح السفلى لأوراق القمة. ولهذا الغرض فان الانثى تغرز أله وضع البيض المدببة داخل بشرة النبات العائل الى النسيج الميزوفيلي حيث تضع البيضة في مكان امين بعيدا عن التأثيرات البيئية الخارجية فتلتصق حامل البيضة في الثقب الذي عمله أله وضع البيض وبقية جسم البيضة للخارج. تضع الانثى بيضها منفردا او في مجاميع صغيرة وقد يشاهد ازدحام البيض في انسجة النبات خلال موسم النشاط والتكاثر. وان معدل ما تضعه الانثى الواحدة هو 50 بيضة وقد وجد ان الحد الاعلى لعدد البيض وصل الى 236 بيضة للانثى في 25 م والحد الادنى 43,6 بيضة في 15 م. ينتج البيض الملقح اناثا والبيض غير الملقح ذكورا. تكون البيضة متطاولة وليست كروية تحمل على عنق صغير يثبت في انسجة النبات اما جسم البيضة فيخرج على سطح الورقة. سطح البيضة أملس ولماع وتكون عند اول وضعها مخضرة وشفافة تقريبا ثم تتحول تدريجيا للبنى. البيضة بحجم $0,2 \times 1$ ، 0 ملم، طول حامل البيضة 0,03 ملم. تمر البيضة بدور الحضانة 4-8 يوما في درجة حرارة 26 م او 8 - 22 يوم في درجة الحرارة 20م. ولا يفقس البيض في حرارة تقل عن 12,5 م.

تفقس البيضة الى حورية زاحفة نشطه الحركة تنتقل وتتجول على النبات حتى تجد المكان الملائم لتغذيتها. تكون الحورية الزاحفة شبه بيضوية ذات لون اصفر فاتح الى مخضر، تستقر في المكان الملائم لتغذيتها طيلة بقية دورها الحوري ويكون ذلك على السطح السفلي للأوراق الوسطية وقسم قليل منها على السطح العلوي ايضا خاصة عندما تزداد اعدادها. يصل حجمها في نهاية هذا العمر الى 0,26 - 0,15 ملم ثم تتسلخ فتفقد قرون استنعارها وأرجلها وتتحول الى العمر الحوري الثاني وتدعى بالحورية الجالسة وتبقى مستقرة كذلك حتى اكتمال العمر الحوري. تبدأ الحورية بإفراز غطاء شمعي لها ذي حواف عليه خيوط شمعيه ايضا والغطاء والخيوط الشمعية مميزة للنوع. تتغذى الحورية بامتصاص عصارة النبات وتنمو وتتسلخ فتمر بثلاث اعمار حورية جالسه (فيكون المجموع اربعة اعمار حورية بضمنها العذراء). تخرج الحشرة الكاملة بشق الجزء العلوي للغطاء الشمعي للحورية شقا بشكل حرف T فيخرج من هذا الشق رأس الحشرة وصدرها اولا ثم بحركات للأمام والخلف تخرج بطنها ايضا وبعدها مباشرة تأخذ اجنحتها بالانفراد لتأخذ شكلها الطبيعي. تتزاوج الحشرات الكاملة بعد خروجها من العمر الحوري الاخير بعد 1-2 ساعة في الصيف او 1-3 يوما في الخريف والشتاء وتتلقح الانثى عدة مرات في حياتها. تضع الانثى بيضها بعد 1-6 يوما من خروجها في الصيف قد تصل هذه المدة الى اسبوعين في اوائل الربيع وفي الخريف وبعد 22 يوما في الشتاء. وبذلك يستغرق نمو الحشرة من البيضة الى الحشرة الكاملة حوالي اسبوعين في 30 م على كل من الباذنجان والطماطه. للحشرة 11-15 جيلا في السنة. ان العامل الرئيس المحدد لتكاثر هذه الحشرات وزيادة اعدادها هو

درجة الحرارة المعتدلة والرطوبة النسبية العالية ولذلك فان الزراعة الكثيفة والزراعة الخريفية تزيد من مشكله الذباب الابيض. تتأثر الذبابة البيضاء بالحرارة - كما أسلفنا - فدرجة الحرارة المثلى التي تزداد عندها الكثافة السكانية زيادة سريعة هي 25-30 م. ففيها ينتج زوج واحد 184 حشرة بينما في درجة 14 م ينتج 18 حشرة فقط. اما الرطوبة فهي الاخرى لها تأثير فعال على حياه وتكاثر الذبابة البيضاء. فتقل اعدادها فيما تنخفض الرطوبة النسبية دون 60% وهذا يفسر اتجاه حجم سكانها خلال السنة. فالملاحظ ان اعداد الذبابة يكون واطئا نوعا ما في الربيع ثم ينخفض أكثر خلال الصيف وبعدها يزداد زيادة كبيرة خلال الفصل الخريفي مسببا اضرارا اقتصادية في العروة الخريفية للخيار وأحيانا وفي بعض اجزاء من حقول القطن في الخريف ايضا.

ادارة الذباب الابيض الضار

Injurious White Flies Management

ان فشل الطرائق التقليدية المعروفة في تحقيق مكافحة ناجحة للذباب الابيض في الزراعة المغطاة والمكشوفة على المحاصيل المختلفة، دفع العاملين في مجال مكافحة الآفات الزراعية الى محاولة تطوير نظم لأداره الانواع الضارة من الذباب الأبيض، خاصة وان هناك اليوم العديد من العوامل المشجعة للعمل على تطوير انظمة ادارة للسيطرة على الانواع الضارة من الذباب الابيض وهي:

أولا) فشل المكافحة الكيميائية:- ان الكفاءة الحيوية العالية للذباب الابيض وضراوتها وسرعه اظهارها للسلاسل المقاومة للمبيدات وما تسببه المبيدات من اضرار للأعداء الحيوية وللبيئة جعلت من عملية المكافحة الكيميائية للذباب عملية محدودة الفائدة خاصة مع الانواع الناقلة للفايروسات.

ثانياً) توفر كم كبير من المعلومات المرتبطة بالجوانب البيئية والحياتية للذباب الابيض والتي يمكن تلخيصها فيما يأتي:

1-) تطير الحشرة الكاملة خلال 10-20 دقيقة من خروجها من طور العذراء باحثه عن مكان مناسب لتبدأ التغذية من خلال ثقب نسيج الورقة النباتية بواسطة اجزاء فمها الثاقبة الماصة.

2-) تفضل الحشرة التغذية على الاوراق حديثه النمو لنفس النبات الذي كانت تتغذى على أوراقه.

3-) تخرج الذبابة البيضاء بأعداد نصفها عادة من الذكور والنصف الاخر من الاناث.

4-) يبدأ التزاوج في الظروف المثالية بين الذكر والانثى بعد 1-2 ساعة من خروجها من طور العذراء وقد يتأخر التزاوج الى يوم او ثلاثة ايام من خروج الحشرة الكاملة تحت درجات الحرارة التي تنخفض عن 20 م او اقل.

5-) تضع الانثى بيضها الملقح بعد ايام قليلة (من 2-6 ايام في الصيف وتتضاعف هذه المدة كلما انخفضت درجة الحرارة في الخريف او الشتاء) وتبقى الذبابة خصبه (التزاوج ووضع البيض) طيلة فتره حياه الحشرة، اذ تستطيع الحشرة التزاوج ووضع البيض أكثر من مرة، وتبلغ كفاءة الذبابة لوضع البيض بمعدل 10 بيضات في اليوم تحت درجات الحرارة من 20-23 م.

6-) تضع الانثى بيضها في صفوف على سويق Pedicel تغرسه بين خلايا الورقة الداخلية لتوفر من خلاله الرطوبة لبقاء البيض حيا ويصل عدد

- البيض من 50-300 بيضه / انثى تبعا للعائل النباتي والظروف الجوية
وان المتوسط العام لعدد البيض فهو 100 بيضه / انثى.
- 7-) يفقس البيض خلال ستة ايام من وضعه في الصيف وضعف هذه المدة
في الشتاء وتقل نسبه فقس البيض الملقح في الطقس الجاف والحار
وينتج عنه ذكور واناث فيما ينتج البيض غير الملقح الذكور فقط.
- 8-) يتميز الذباب الابيض بشرهة في امتصاص عصارة النبات ولا يتوقف
عن التغذية حتى عند التزاوج ووضع البيض.
- 9-) يطير الذباب الابيض بعد خروجه من العذراء مسافات لا تتعدى 6 أمتار
الى الاعلى الا انها تنتقل الى مسافات تصل الى 7 كيلومترات او أكثر
بمساعدة التيارات الهوائية والتي قد تزيد احيانا عن 100 كيلو متر.
- 10-) لا يفضل الذباب الابيض بطبعه الانتقال كثيرا من مكان توالده بوجود
العائل المناسب ولذلك نجده ينتشر بصورة تدريجية الى النباتات السليمة
المجاورة وبكثافته تعكس درجة قرب النباتات او بعدها من مكان الإصابة
الاولية الا ان الحشرات الكاملة من الذباب الابيض تفضل الانتقال من
الاوراق القديمة الى الاوراق الجديدة لتضع بيضها في مكان مناسب
يضمن لأطوارها اللاحقة مصدرا مناسباً للتغذية عليه.
- 11-) اشارت الدراسات الى ان اطوار الذباب الابيض تتوزع على النبات
الواحد على النحو التالي: الذباب الكامل والبيض وحوريات العمر الاول
تفضل قمة النبات، اما الحوريات الكاملة والعذارى فتفضل الاوراق
الوسطى من النباتات والعذارى تكون في الاوراق السفلى.

12-) لا توجد اسباب مؤكدة معروفة عن تفضيل الذباب الابيض لعائل دون اخر الا ان الذباب الطائر ينجذب بشدة الى اللون الاصفر المخضر يليه في التفضيل اللون الاصفر ثم الاحمر فالبرتقالي المحمر والاخضر الغامق ثم البنفسجي، الا ان دراسات اخرى اشارت الى ان الذباب الابيض ينجذب بصورة شديدة الى اللون الاصفر وبعده اللون الازرق فوق البنفسجي.

13-) تفضل كاملات الذباب الابيض مهاجمة السطح السفلي لأوراق النبات العائل بعيدا عن اشعة الشمس الحارقة وقريبا من الظل والرطوبة التي تتبخر من هناك حيث تكثر فتحات النتح لمعظم المحاصيل كما تكثر الشعيرات السفلية التي تحمي الذباب من هبوب الرياح.

14-) اظهرت الدراسات ان كاملات الذباب الابيض قليلة الحركة بطبعها وهي لا تنتقل من مكان لأخر على النبات الواحد او بين النباتات الا عندما تذهب الى مكان أفضل لها وإذا اضطرت الكاملات للحركة لأي سبب كان فأنها تطير في ساعات الصباح الاولى او في ساعات المساء وتقل حركتها بصورة ملحوظة او تنعدم في ساعات الظهيرة عندما تكون الحرارة على أشدها.

15-) يتجنب الذباب الابيض الطيران اثناء هبوب الرياح حيث يلجأ الى الاماكن المحمية أسفل الاوراق او في حماية اي جسم في الحقل بعيدا عن اتجاه الرياح.

16-) تبدأ اعداد الذباب الابيض بالزيادة في بداية الموسم المناسب لنشاطها حيث سرعان ما تزداد اعدادها بشكل كبير في وقت قصير حيث تطير بأعداد كثيفة عند هبوب الرياح او عند ازعاجها.

17-) ان الذباب الابيض يفضل الباذنجان اولا ثم الخيار والطماطم والفلفل وهي تفضل عموما الاوراق الكبيرة ذات الشعيرات الكثيفة.

ثالثاً) تم تحديد الحد الاقتصادي الحرج للذباب الابيض في العديد من بلدان العالم: ويفتقر عالمنا العربي لمثل هذه الدراسات لحد الان وقد اوصت اغلب الدراسات برش المبيدات عند وصول الذباب الى مستوى 3 حشرات بالغة / ورقة او 0,5 حورية كبيرة لكل 6,7سم² من مساحة الورقة.

رابعاً) توفر الاعداء الحيوية: للذباب الابيض مجموعة جيدة من الاعداء الطبيعية من طفيليات ومفترسات ومسببات مرضية تم تسجيلها على الذباب الابيض كما تم توفير البعض منها على مستوى التجاري لاستخدامها في برامج مكافحة الحيوية ومنها:

1-) المبيد الحيوي الفطري *Beauveria bassiana*

2-) المبيد الحيوي الفطري *Paecilomyces fumosoroseus*

3-) المبيد الحيوي الفطري *Verticillium lecanii*

4-) المفترس الحشري *Delphastus pusillus*

5-) الزنبور المتطفل *Encarsia Formosa*

6-) الزنبور المتطف *Eretmocerus californicus*

7-) المفترس الحشري *Hippodamia convergens*

خامساً) توفر العديد من البرامج والمشاريع: التي تقودها العديد من المنظمات الدولية والهيئات الزراعية في مجال تطوير اصناف وسلالات من انواع الخضراوات المقاومة والمتحملة للذباب الابيض باستخدام تقنيات الهندسة الوراثية وقد تكلفت تلك الجهود بإنتاج بعض الاصناف المقاومة.

سادساً) توفر مدى واسع من مبيدات الحشرات والمواد الطاردة: التي يمكن استخدامها بنجاح في برامج وانظمة ادارة الذباب الابيض. ان ما سبق يشكل قاعدة رصينة لتطوير نظام لإدارة الذباب الابيض الضار وذلك من خلال التكامل بين ادوات مكافحة المتاحة.

الطرائق المستخدمة في نظام ادارة الذباب الأبيض

Methods Used In White Flies Management System

هي مجمل العمليات والطرائق التي تمكن الانسان من ابتكارها وتطويرها من اجل خفض اعداد الآفات بشكل عام ومن هذه الطرائق ما يأتي:

أولاً) **العمليات الزراعية Agricultural Practices**:- تهدف العمليات الزراعية بشكل رئيسي الى ادارة المحصول من اجل نباتات قوية تستطيع تحمل الإصابة الحشرية ودحرها ومن اهم العمليات في هذا المجال ما يأتي:

- 1-) الري المنتظم والتسميد المتوازن يعملان على انتاج نباتات قوية.
- 2-) الحراثة: للقضاء على العوائل الثانوية وبقايا النباتات الاقتصادية من المحصول السابق لأنها تشكل مصدر عدوى بالذباب الابيض كما ان بعضها قد تعد مخازن لفايروس اصفرار وتجعد اوراق الطماطة.
- 3-) انتاج شتلات سليمة بعيدا عن الذبابة البيضاء ومصادر العدوى بالفايروسات اذ من الشائع في العديد من البلدان العربية انتاج شتلات الخضراوات في مشاتل محمية صممت خصيصا لإنتاج الشتلات.
- 4-) المصائد النباتية حيث يمكن مثلا زراعه خطوط من الخيار في حقول الطماطة وذلك لان الذباب الابيض يفضل الخيار على الطماطة.
- 5-) زراعه الاصناف المقاومة والمتحملة للذباب الابيض

ثانياً) الطرائق الفيزيائية **Physical Methods**:- من الوسائل الفيزيائية

المعتمدة في مكافحة الذباب الابيض ما يأتي:

1-) المصائد اللونية اللاصقة: ويمكن استخدام هذه المصائد في الحقول المكشوفة وفي الزراعة المغطاة وذلك بتعليق مصائد كارتونية صفراء لاصقة حيث تتجذب اليها كاملات الذباب الابيض لتلتصق بها وتموت مما يخفض من اعداد الذباب الابيض.

2-) الحواجز الفيزيائية: وتضم مجموعه من الحواجز والاطية التي تعمل

على منع وصول الذباب الابيض الى عوائله النباتية وهي:

أ-) الاغطية الشبكية: ان نجاح هذه الاغطية يعتمد على ان لا تزيد مساحة الفتحات فيها عن 0،19 ملم لمنع مرور الذباب الابيض من خلالها، هذه الاغطية يمكن ان تستخدم في تغطية مراقد الشتلات وخطوط النباتات المزروعة في الحقل.

ب-) الاغطية الطافية **Floating Covers**: وهي اغطية خفيفة جدا مصنوعة

من الـ **Polyster** تفرش فوق المروز ولا تحتاج الى اي دعائم لتثبيتها.

ت-) الالواح البلاستيكية المدمصة لجزء من الاشعة فوق البنفسجية حيث

تستخدم هذه الالواح في صناعة البيوت البلاستيكية وفي هذه البيوت يجد

الذباب الابيض صعوبة بالغة في العثور على عائله النباتي نتيجة اختلاف

لون العائل.

3-) تيارات الهواء: حيث يمكن وضع مراوح عند المداخل وبوابات البيوت

البلاستيكية والزجاجية لتوليد تيار هواء قوي يطرد الذباب الابيض ويمنعه

من الدخول الى البيوت البلاستيكية.

4-) الحرق: تستخدم عادة قاذفات اللهب في حرق الادغال والاوراق

المتساقطة والاعشاب للتخلص من مصادر العدوى بالذباب الابيض

ثالثاً) **المكافحة الحيوية Biological control**:- ان المكافحة الحيوية

للذباب الابيض في المنطقة العربية تعتمد على استراتيجيتين هما:

الاستراتيجية الاولى: حماية وتطوير الاعداء الطبيعية المحلية:

تتوفر اليوم مجموعة كبيرة من الاعداء الطبيعية للذباب الابيض المسجل

وجودها في المنطقة العربية، هذه الاعداء تقع في ثلاثة مجاميع هي الحشرات

والعناكب والفطريات والتي تقتل الذباب الابيض في اطواره غير المتحركة عن

طريق الافتراس والتطفل فتتفاوت تلك الاعداء في سلوكياتها وقدرتها في

القضاء على انواع الذباب الابيض المختلفة فمنها من يفترس او يتطفل على

نوع بعينه من الذباب الابيض كذلك فان هناك عدة انواع من الاعداء للنوع

الواحد من الذباب. من الاعداء الطبيعيه المسجل وجودها على الذباب الابيض

في المنطقة العربية ما يأتي *Trichoporus spp* ، *Coccophagus spp* ،

Eretmocerus spp وجميعها متطفلات على الذباب *Prospaltella spp*

الابيض فضلا عن وجود عدد من المفترسات الحشرية العامة اهمها المفترس

Clitostethus arcuatus Rossi ، ان حمايه وتطوير الاعداء الطبيعية

المحلية يمكن ان يتم من خلال اتباع ما يأتي:

1-) استخدام مبيدات الحشرات المتخصصة او استخدامها بتركيز منخفضه

او استخدامها في الاوقات التي تقل فيها الاعداء الطبيعية في الحقل.

2-) استخدام مبيدات الحشرات الجهازية.

3-) توفير الملاجئ والاعذية البديلة للأعداء الطبيعية في الحقل لإدامة وجودها بأعداد جيدة عند انخفاض اعداد الذباب الابيض في الحقل.

4-) اجراء المزيد من الدراسات والبحوث حول كفاءه الاعداء الحيوية المحلية وبيان مدى امكانية تربيتها واكثارها بأعداد كبيرة واطلاقها في الحقل

الاستراتيجية الثانية: استيراد الاعداء الحيوية:

تتوفر اليوم على مستوى العالم العديد من الاعداء الحيوية المنتجة على المستوى التجاري من قبل العديد من الشركات حيث يمكن استيرادها واطلاقها في الحقول المصابة بالذباب الابيض ومنها: المفترس *Delphastus pusillus* : ويعود لعائله *Coccinellidae* من رتبه غمديه الاجنحة ويسمى بالخنفساء المفترسة للذباب الابيض ينتشر هذا المفترس في الطبيعة في وسط وجنوب امريكا الشمالية وفي وسط وجنوب امريكا الجنوبية، تم انتاج هذا المفترس تجاريا بتربيته على الذباب الابيض داخل البيوت الزجاجية لاستخدامه في مكافحة الذباب الابيض داخل البيوت الزجاجية على الخيار والفلفل ومحاصيل الخضر الاخرى المزروعة داخل البيوت الزجاجية. يتوفر هذا المفترس تجاريا تحت العديد من الاسماء التجارية منها *Delphastus-A*، *Delphastus- system* وغيرها. وتطلق هذه الخنفساء المفترسة بمعدل خنفساء كاملة لكل 10م² بين النباتات المصابة بالذباب الابيض.

2-) الطفيل *Eretmocerus californicus* ويعود لعائلة *Aphelinidae* من غشائية الاجنحة وتنتشر في الجنوب الغربي من امريكا خاصة في المناطق الصحراوية من كاليفورنيا واريزونا وهو طفيل اجباري على الذباب الابيض ويتم انتاجه تجاريا بتربيته على ذبابة التبغ البيضاء. ويستخدم

لمكافحة ذبابة التبغ البيضاء *B. tabaci* في البيوت الزجاجية وفي الزراعة المكشوفة على المحاصيل المصابة بالذباب الأبيض، يتوفر هذا الطفيل تحت العديد من الاسماء التجارية مثل Excel و Eretsur وغيرها ويتوفر هذا الطفيل بشكل عذاري توضع فوق النباتات المصابة.

رابعاً) استخدام مبيدات الحشرات **Insecticides Use**:- تتوفر اليوم مجموعة جيدة من مبيدات الحشرات التي يمكن استخدامها بالتكامل مع الطرائق السابقة في نظام ادارة الانواع الضارة من الذباب الابيض، ان من اهم مجاميع مبيدات الحشرات المستخدمة في هذا المجال ما يأتي:

1-) مبيدات الحشرات الكيميائية المصنعة: تعد مبيدات البايروثرويد المحضرة صناعياً والمبيدات التابعة لمجموعة النيكوتين الحديثة *Neonecotinoides* من المبيدات الحديثة التي تمتاز بفعاليتها وسرعة تحللها وانخفاض سميتها للبائن ومن هذه المبيدات الـ *Cypermethrin* والـ *Deltamethrin* والـ *Imidacloprid* وغيرها.

2-) مبيدات الحشرات الكيموحيوية: وتضم عدد من المبيدات التي نالت شهرة جيدة في مكافحة الحشرات ومنها الذباب الابيض ومن هذه المبيدات الافيرمكتينات *Avermectin* والاسبينوسات *Spinosad* ومثبطات تصنيع الكايتين مثل الـ *Applaud*.

3-) مبيدات الحشرات المايكروبية ومنها:

أ-) الفطر *Beauveria bassiana* وله عدة سلالات الا ان السلالة *GHA* هي السلالة الفعالة ضد الذباب الابيض ويتوفر هذا المبيد تجارياً بشكل حبيبات طينية مايكروبية او بشكل مسحوق قابل للبلل او بشكل سائل

مركز للمبيد العديد من الاسماء التجارية مثل Dstrinil و Mycotol

ويرش بمعدل 200-250 مل / دونم.

ب-) الفطر *Verticillium lecanii* وغيرها.

مما سبق يتبين ان هناك عدد جيد من الخيارات التي يمكن اعتمادها لإدارة

الذباب الابيض الضار في الزراعات المغطاة والمكشوفة.

الفصل الخامس

بق النبات الحقيقي

اهم زراعية مهمه

الموقع التسميمي لبق النبات

اهم الصفات الحيوية تحت رتبة مختلفة الاجنحة

عوائل البق الحقيقي نباتية التغذية

Pentatomidae عائلة البق النتن

Miridae عائلة بق الازهار

Lygaeidae عائلة بق البذور الحقيقي

Tingidae عائلة البق الطرز

Scutellaridae عائلة البق الناصع (السونة)

الموقع التقسيمي لبق النبات

Plant Bugs Classification Position

تتنمي جميع انواع بق النبات الحقيقي الى تحت رتبة مختلفة الأجنحة Heteroptera التابعه لرتبة نصفية الاجنحة Hemiptera وفيما يأتي الموقع التصنيفي لهذه المجموعة من الحشرات:

Order : Hemiptera
Sub order: Heteroptera
Infra order : Cimicomorpha
Super Family: Miroidea
Family: Miridae
Super Family: Tingoidea
Family : Tingidae
Super Family : Cimicoidea
Family : Nabidae
Infra order : Pentatomorpha
Super Family : Coreoidea
Family :Coreidae
Super Family : Lygaeoidea
Family : Pentatomidae
Family : Scutellaridae
Family : Pyrrhocoridae

اهم الصفات الحيوية لتحت رتبة مختلفة الأجنحة نباتية التغذية

Phytophagous Heteroptera Biological Characteristics

ان وجود انواع بق النبات الضار بالنباتات الاقتصادية في تحت رتبة منفصلة ضمن رتبة نصفية الأجنحة Hemiptera يرجع لتميزها بالعديد من الصفات وهي كالاتي:

- 1- (الاجنحة الأمامية جزؤها القاعدي جلدي والجزء الآخر غشائي والاجنحة الخلفية غشائية بالكامل. (الشكل 5-1)
- 2- (لحشرات هذه المجموعة تركيب يشبه الدرع في منطقه الصدر من الجهة الظهرية يسمى بالـ Scutellum والذي يقع بين مقدمة الاجنحة (الشكلان 5-1 و 5-2).
- 3- (لحشرات مختلفة الاجنحة غدد رائحة في منطقه البطن كل من الحوريات وبالغات، كما توجد هذه الغدد في منطقه الصدر لبعض الحشرات الكاملة، الا انها تكون غير فعالة. وان الوظيفة الأساسية لتلك الغدد هي وظيفة دفاعية.
- 4- (العديد من انواع مختلفة الاجنحة هي مفترسات لمفصليات الارجل الاخرى فيما انواع اخرى تعد متغذيات على دم الفقريات مثل بق الفراش.
- 5- (تعد المجموعة الوحيدة من رتبة نصفية الاجنحة التي تضم انواعا تعيش في المياه المالحة والعذبة.
- 6- (ان العديد من حشرات الـ Heteroptera وخاصة حشرات رتييه Pentatomorpha تفضل الأجزاء التكاثرية للنباتات كالأزهار والمبايض والبذور الناضجة والتي في طور النضوج، فيما تعمل الحشرات التابعة للعوائل Miridae و Tingidae على تحريك النايتروجين في النبات للقيام بعمليات بناء وتصليح الاجزاء المتضررة من النبات.
- 7- (ان حشرات هذه المجموعة تسبب اضرار مباشرة للنبات عن طريق تحطيم انسجة النبات او خفض الخصوبة او التراكيب التكاثرية والمرغوبة من قبل الانسان او عن طريق اجبار النبات على القيام بإصلاح الأجزاء

النباتية المتضررة وهي اصلاحات مكلفه تحتاج الى طاقة، مما يؤثر في انتاجيه النبات.


8-) حشرات تغرز رمحها في انسجه النبات بين خلايا الانسجة وبالتالي فان رمح هذه الحشرات يكون اقل احتماليه في ان يكون في تماس مباشر مع المسببات المرضية على العكس من بقية حشرات متشابهة الاجنحة التي تغرز رمحها في خلايا النبات مثل المن والحشرات القشرية وغيرها وهذا يفسر سبب عدم قدره حشرات البق الحقيقي الـ Herteroptera على نقل المسببات المرضية.

9-) ان معظم انواع بق النبات الحقيقي هي حشرات كبيره الحجم نسبيا وهي بذلك تكون أكثر قدره على الانتشار وذو قدرة تناسليه أكبر، فضلا عن عدم انجذاب المفترسات الصغيره اليها. الا انها تكون أكثر وضوحا للمفترسات الكبيره مثل الفقريات الا انها تستطيع في كثير من الاحيان طرد تلك المفترسات عن طريق إطلاق الروائح الطاردة واستخدام الالوان التحذيرية.

عوائل البق الحقيقي نباتيه التغذية


Phytophagous Heteroptera Families

من ملاحظه الموقع التقسيمي لبق النبات الحقيقي يلاحظ ان الانواع الحشرية الضارة بالنباتات الاقتصادية التابعة لبق النبات الحقيقي تعود لثمانية عوائل ثلاث منها تعود لرتيبه Cimicomorpha وخمسه منها من رتيبه Pentatomorpha والجدول (5-1) يوضح الأهمية النسبية لتلك العوائل بحسب عدد الانواع الضارة التي تضمها كل عائله.



الشكل (1-5) منظر ظهري لحشره من تحت رتبة Herteroptera تتضح

فيها اهم الصفات المظهرية المميزة لهذه الرتبة.



الشكل (2-5) منظر جانبي لحشره من تحت رتبة Heteroptera تتضح

فيها اهم الصفات المظهرية المميزة لتحت الرتبة

الجدول (1-5) العائلات الحشرية من مختلفة الاجنحة التي تضم انواعا

ضاره بالنباتات الاقتصادية في الوطن العربي

الأهمية النسبية بحسب عدد		عدد الانواع	عدد الاجناس	العائلة
الانواع	الاجناس			
34.09	30.76	30	16	Pentatomidae
23.86	32.69	21	17	Miridae
14.77	15.38	13	8	Lygaeidae
11.36	7.69	10	4	Tingidae
5.68	5.76	5	3	Coreidae
5.68	1.92	5	1	Scutelleridae
3.40	3.84	3	2	Pyrrhocoridae
1.13	1.92	1	1	Nabidae
100	100	88	52	المجموع

من الجدول السابق يتبين ان عائله Pentatomidae او عائله البق النتن تحتل المرتبة الاولى من حيث عدد الانواع التي تمثلها في الوطن العربي تليها عائله Miridae من حيث عدد الانواع والاجناس المسجله في الوطن العربي.

أولاً) عائلة البق النتن Pentatomidae

المقدمة:- سميت حشرات هذه العائلة بالبِق النتن Stink bugs بسبب انتاجها لرائحة كريهة من غدد الرائحة الموجودة قرب حرقفة الزوج الاخير من الارجل في الحشرات الكاملة، فضلا عن امتلاك حورياتها لغدد الرائحة الواقعة في الجهة الظهرية للبطن. تعد هذه العائلة من أكبر عائلات تحت رتبة مختلفة الاجنحة Heteroptera حيث تضم 4123 نوعا من أصل 36096 نوعا موصوفا من الـ Heteroptera على مستوى العالم. وفي الوطن العربي يمثل هذه العائلة 30 نوعا ضارا سجل وجودها على العديد من المحاصيل ذات الاهمية الاقتصادية وتعود الى 16 جنسا. تضم هذه العائلة ثمانية تحت عوائل هي:

- | | |
|------------------|----------------------|
| 1-) Asopinae | 2-) Pentatominae |
| 3-) Edessinae | 4-) Discocephalinae |
| 5-) Cyrtocorinae | 6-) Serbaninae |
| 7-) Podopinae | 8-) Phyllocephalinae |

وتعد تحت العائلة Pentatominae الاكبر بين بقية تحت العائلات وان انواعها تعد متغذيات نباتيه تهاجم العديد من المحاصيل ذات الاهمية الاقتصادية. اهم الصفات المظهرية المميزة للبِق النتن:

(-1) حشرات مستديره الى بيضوية الشكل

(-2) قرن استشعارها يتكون من خمس عقل

(3-) رسغ الارجل يتألف من ثلاث عقل

(4-) الدرع او اللوحة الظهرية Scutellum قصيره وتضيق عند النهاية الخلفية لتعطي شكل المثلث المتساوي الضلعين.

الانتشار والاهمية الاقتصادية لحشرات عائلة البق النتن

تمتاز معظم انواع هذه العائلة بانتشارها العالمي حيث سجل وجود العديد من الانواع في العديد من بلدان قارات العالم المختلفة ان الاهمية الاقتصادية لأنواع هذه العائلة يمكن ان تعزى للأسباب الآتية:

(1-) تتغذى حشرات هذه العائلة بامتصاص عصارة عوائلها النباتية مستخدمة اجزاء فمها الثاقبة الماصة مسببة جروحا واضرارا في النسيج النباتي يؤدي فيما بعد الى ذبول النبات وتساقط الثمار والبذور، كما ان تغذيتها على الثمار قد تؤدي الى تشوه الثمار.

(2-) تهاجم انواع هذه العائلة مدى واسع من العوائل النباتية ذات الاهمية الاقتصادية. حيث وجد ان العديد من الانواع التابعة لتحت عائله Edessinae تتغذى على نباتات العائلة الباذنجانية حيث تعد افات على الطماطة والبطاطا في امريكا الجنوبية، فيما تتغذى الانواع الضارة لتحت عائلة Pentatominae على مدى واسع من النباتات تتوزع ما بين الاشجار والخضراوات، كذلك فان العديد من الانواع التابعة للأجناس Oebalus و Mormidea و Aelia تعد افات مهمه على العديد من المحاصيل النجيلية وخاصة محصولي الرز والحنطة، انواع اخرى من البق النتن هي افات مهمه على الاشجار منها بق الحمضيات ذو الاشواك Spined citrus bug المعروف بالاسم *Biprorulus bibax*

Breidin في استراليا وبق ال *Lincus spp* على اشجار جوز الهند في

امريكا الجنوبية وغيرها كثير .

3-) ان العديد من انواع هذه العائلة هي ذات انتشار عالمي مما يزيد من

اضرارها واهميتها الاقتصادية مثال ذلك حشرة البقة الخضراء *Nezara*

viridula وال *Piezodorus spp* في امريكا الجنوبية وشرق افريقيا وال

Eurydema spp في الشرق، وغيرها من الأنواع.

ان المدى الواسع لأنواع البق النتن وعوائله الغذائية وتأثيره في انتاجية النباتات

التي يهاجمها جعله من المجاميع المهمة اقتصاديا ضمن حشرات تحت رتبة

مختلفة الاجنحة، وكمثال على ذلك فقد بلغت الخسارة الكلية التي سببتها

حشرات هذه المجموعة خلال عام 1985 بلغت 3.5 مليون دولار في ولاية

جورجيا الأمريكية لوحدها. هذا فضلا عما تسببه حشرات البق النتن من ازعاج

للإنسان جراء مهاجمتها للمنازل بأعداد كبيرة خلال فصل الشتاء.

انواع البق النتن في الوطن العربي

من الجدول (5-1) يتبين ان هناك 30 نوعا من البق النتن التي تهاجم انواعا

مختلفة من النباتات والمحاصيل ذات الاهمية الاقتصادية والتي تنتمي الى 16

جنس وهذا يشير الى احتمالية ان تكون اغلب انواع هذه العائلة هي انواع

دخيله في الوطن العربي وذلك لقله الانواع المسجلة لكل من الاجناس الـ 16

المسجل وجودها في الوطن العربي. والجدول (5-2) يوضح الاسماء العلمية

والعربية الشائعة لأنواع البق النتن المعروفة في الوطن العربي.

الجدول (2-5) الاسماء العلمية والعربية الشائعة لأنواع البق النتن في

الوطن العربي

الاسماء العلمية	الاسماء العربية الشائعة
<i>Acrostemum hilare</i> (Say)	البقة الخضراء المنتنة ذات الرائحة الكريهة
<i>Aelia acuminata</i> Linnaeus, 1758	بق الحنطة، السونة السمرء، السونة الصغيرة
<i>Aelia albobittata</i> Fieber, 1868	السونة السمرء
<i>Aelia cognate</i> Fieber, 1868	السونة السمرء
<i>Aelia germari</i> Kuster, 1852	السونة السمرء
<i>Aelia rostrata</i> Boheman, 1852	السونة السمرء
<i>Antestiopsis faceta</i> German, 1837	بقة البن الكاميرونية
<i>Antestiopsis lineaticllis</i> stal, 1853	بقة البن، بقة البن شرق الأفريقية
<i>Apodiphus amygdale</i> Germar, 1817	بق اغصان القوغ، بق اغصان اللوزيات
<i>Aspongopus viduatus</i> Fabricius, 1775	بق اوراق البطيخ، بق ورق البطيخ، بقة الرقي، البقة السمرء، البقة السوداء، بقة ورق البطيخ
<i>Bagrada cruciferarum</i> Kirkaldy, 1909	بقة الصلبيات
<i>Bagrada hilaris</i> Burmeister, 1835	بقة باكرادا، البقة المبرقشة
<i>Brachynema venustulum</i> Schrank, 1874	بق الحنطة
<i>Carpocoris coreanus</i> Distant, 1899	بق الحنطة
<i>Carpocoris fuscipinus</i>	بق الحنطة، بق الحنطة والشعير

Boheman, 1849	
<i>Carpocoris nigricornis</i> Fabricius, 1775	بق الحنطة، بق الخضراوات، بقة دوليكورس
<i>Carpocoris purpureipennis</i> DeGeer, 1773	بق الخضراوات
<i>Deraeocoris pallens</i> Reuter, 1895	بقة الكتان
<i>Dolycoris baccarum</i> Linnaeus, 1758	بقة الحنطة، بقة دوليكورس
<i>Eurydema decoratum</i> Herrich-Schaffer, 1833	البقة المبرقشة
<i>Eurydema ornate</i> Linnaeus, 1758	بق الملفوف، البقة المبرقشة، بقة يورديما
<i>Eurydema rugulosum</i> Dorhn, 1860	بق الملفوف، البقة المبرقشة
<i>Eurygaster maurus</i> Linnaeus, 1758	السونة، سونة ماروس
<i>Euschistus conspersus</i> Uhler, 1897	البقة الناقرة كريهة الريحه
<i>Eysarcoris inconspicuous</i> Herrich-Schaffer, 1844	بقة فستق الحقل
<i>Nezara graminea</i> Fabricius, 1787	بق الحبوب الأخضر
<i>Nezara viridula</i> Linnaeus, 1787	البق النتن، بقة الارز الخضراء، بقة اوراق القطن الخضراء، البقة الخضراء، بقة الخضراوات الخضراء، البقة النتنه الخضراء، البقة النتنه الخضراء الجنوبية، بقة ورق القطن
<i>Scotinophara coarctata</i> Fabricius, 1798	بقة الارز اللاسعة المتشابهة، بق الارز المتشابه
<i>Scotinophara lurida</i> Burmeister, 1835	بق الارز اللاسع، بقة الارز السوداء
<i>Thyanta accerra</i> McAtee, 1919	البق ذات الرائحة الكريهة، البقة المنتنة ذات الاكتاف الحمراء

ومن الأمثلة الجيدة لحشرات هذه العائلة التي تتضح فيها اغلب الصفات

الحياتية والمظهرية لعائله البق النتن هي:

Green Stink Bug

البقة الخضراء الننته

وتعرف بالاسم العلمي *Nezara viridula*

الانتشار والاهمية الاقتصادية:- تعد حشرة البقة الخضراء الننته من الحشرات ذات الانتشار العالمي الواسع حيث تنتشر في المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية في اوربا واسيا وافريقيا وامريكا، تهاجم هذه الحشرة النباتات من ذوات الفلقة الواحدة والفلقتين حيث تهاجم ما يقرب من 145 نوع نباتي تعود لـ 32 عائلة نباتية والمسجلة كعوائل لهذه الحشرة وبالتأكيد فان هناك اعداد اخرى من هذه العوائل تم تسجيلها منذ العام 1965 ولحد الان وقد اظهرت هذه الحشرة تفضيلا للنباتات البقولية وهناك العديد من التقارير والدراسات التي تشير الى العوائل الغذائية لهذه الحشرة طوال حياتها وخلال كل جيل من اجيالها فمثلا في الولايات المتحدة وجد ان البالغات المشتية تبدأ خلال الربيع بالتغذية ووضع البيض على نباتات البرسيم والحبوب الصغيرة والخضراوات النامية مبكرا والذرة والتبغ، فضلا عن العوائل من الادغال او الاعشاب Weed حيث تكمل الجيل الاول لهذه الحشرة في حين تكمل الحشرة جيلها الثاني على النباتات البرية من العائلة البقولية والخضراوات ونباتات العائلة الصليبية cruciferous ونباتات الباميا والتي تعد من عوائل منتصف الصيف، بالغات الجيل الثالث تنتقل للتغذية على نباتات فول الصويا Soybean حيث تكمل الجيل الرابع والخامس على هذه النباتات. ان معرفة العوائل النباتية هذه من الاهمية بمكان وخاصة في مكافحة او ادارة هذه الافة بشكل أفضل.

الاضرار ومظاهر الإصابة:- تشير اكثر المراجع الى ان الإصابة بهذه الحشرة

ادت الى انخفاض في الحاصل كما ونوعا وكذلك التأثير في نسبة الانبات الناتجة عن تغذية هذه الحشرة في حين لم تتأثر محتويات بذور الصويا من الزيت والبروتين نتيجة للإصابة المتوسطة او الشديدة بهذه الحشرة، دراسات اخرى اشارت الى حدوث تغيير في المكونات الكيميائية للأحماض الدهنية نتيجة لتغذية هذه الحشرة وان نوعيه الزيت والبروتين قد يؤثر في وقت تطور الحوريات وكذلك في اوزان البالغات. كذلك فان بذور فول الصويا المتضررة من الاصابة بهذه الحشرة تصبح اكثر حساسيه للإصابة باقات الحبوب المخزونة فضلا عن زيادة وجود الكائنات الممرضة كما ان الثقوب الناتجة عن تغذية هذه الحشرة على البذور تؤدي الى ظهور بقع صغيرة داكنة وكذلك المظهر الطباشيري Chalky المتكون بشكل عام من الفراغات الهوائية الناتجة عن افرغ الخلية من محتوياتها نتيجة لتغذية هذه الحشرة يلي ذلك تلون المنطقة المحيطة بهذه الثقوب باللون الداكن فضلا عن تأثر الغشاء الداخلي لغلاف البذرة، هذه الحشرة تفضل وبشكل واضح التغذية على بذور فول الصويا الموجودة في النصف العلوي للنبات وحتى بلوغها درجة عالية من الإصابة وان البذور الخالية من الاصابة (اي السليمة) تزداد اوزانها وذلك للتعويض عن البذور المصابة وان الاضرار الناتجة عن تغذية البالغات والعمر الحوري الخامس لهذه الحشرات هي اعلى من تلك الاضرار المتسببة عن كل من الاعمار الحورية الثالثة والرابعة كذلك فان الاضرار الناجمة عن مهاجمة البالغات تختلف ايضا باختلاف العمر والحالة الفسيولوجية لحشرات البق. ان تغذية البقة الخضراء *N. viridula* على النباتات الصغيرة للذرة كان أكثر ضررا وتدميرا وان الانخفاض في الحاصل يشير الى الخسارة في كمية

العرائيص الكلية أكثر من كونه انخفاض في وزن الحبوب Kernel في حين ان تغذية حشرات البق هذه على نباتات الطماطة تؤدي الى انخفاض كبير في نوعية هذه الثمار وان هذه الحشرات تفضل التغذية على الثمار الخضراء الناضجة أكثر من الحمراء الناضجة إذا كانت بنفس الحجم.

تاريخ الحياه:- تضع اناث الحشرة عادة ما بين 30-130 بيضة خلال حياتها وعلى هيئة كتل تلصقها الانثى بشكل ثابت وقوي على السطح السفلي للأوراق، البيض الموضوع برميلي الشكل ويحتوي على فتحه في قمته ويحتاج البيض من 5-21 يوما لإكمال نموه وبقسه وذلك استنادا لدرجات الحرارة السائدة، الحوريات الحديثة تتجمع قرب البيوض الفارغة ولا تتغذى الا بعد مرور ثلاثة ايام من فقسها او من الانسلاخ الاول، تمر هذه الاعمار الحورية بخمسة انسلاخات وذلك قبل وصولها الطور البالغ حيث تزداد في الحجم خلال هذه الاعمار وكل عمر من هذه الاعمار يستغرق الاسبوع تقريبا، للحشرة اكثر من اربعة اجيال في السنه وان التطور من البيضة وحتى البالغة يستغرق حوالي 35 يوما وذلك في منتصف الصيف. تتجمع الحوريات عادة بعد الانسلاخ الثالث على النبات العائل وربما يكون الهدف من ذلك تجمع دفاعاتها الكيميائية ضد المفترسات مثل النمل.

وصف اطوار الحشرة

1-) البيض برميلي الشكل ارتفاعه 1/20 من الانج، يوجد على السطح السفلي للأوراق على هيئة كتل تضم الكتلة الواحدة من 5-8 صفوف مرتبطة مع بعضها بمادة لاصقه، البيض عند وضعه ابيض مائل للاصفرار يتحول بعد 4 ايام من وضعه الى اللون البرتقالي او الاحمر الوردي حيث يفقس عادة بعد 5-8 أيام.

2-) الحوريات الفاقسه حديثا حمراء اللون تبقى هذه الحوريات فوق كتل البيض لمدة 48 ساعة او أكثر حيث تتحول الى اللون الاحمر الداكن او البني خلال هذه الفترة، الاعمار الحورية الحديثة الفقس طولها 16/1 نج وتزداد لكي تصل 2/1. نج في العمر الحوري الخامس، جميع الحوريات عرضها تقريبا بقدر طولها ذات لون غامق مع علامات حمراء وبيضاء او صفراء منتشرة على جسمها.

الاعمار الحورية 2-4 تشبه كثيرا الدعاسيق ولكن الملاحظة القريبة والدقيقة ان هذه الحوريات لا تمتلك الاجنحة اضافة الى وجود الغدد المفرزة للروائح القوية.

3-) الحشرة الكاملة للبق النتن ذات شكل صفائي Shield، طول الحشرة الكاملة 2/1-4/3 نج وتقريبا 16/5. نج عرضا لونها ما بين الاخضر الفاتح والبني المحمر، تعيش البالغات عادة لعدة أشهر كما تمتاز بقدرتها العالية في الطيران حيث تطير عند انزعاجها الى الاسفل باتجاه الارض او الاجزاء السفلى للنبات كما ثبت تحرك هذه الحشرات باتجاه القمم او الافرع اعلى النبات وذلك في الصباح الباكر.

المكافحة

1-) **المكافحة الكيميائية:** - ان استخدام المكافحة الكيميائية لازالت هي الوسيلة الاكثر استخداما من قبل المزارعين فضلا عن الطرائق الزراعية والحيوية المستخدمة ايضا في مكافحة هذه الحشرة. فيما يخص المكافحة الكيميائية فقد استخدمت مبيدات الحشرات من الهيدروكاربونية الكلورة والفسفور العضوية مثل مثيل باراثيون، مونوكروتوفوس، تراي كلوروفون، داي

مثبت والاندلسفان، وفي البرازيل تم التوجيه باستخدام بعض هذه المبيدات لمكافحة حشرة *N. viridula* على نباتات فول الصويا بجرع وتراكيز منخفضة مع اضافة كلوريد الصوديوم الذي يعمل على زيادة كفاءة وفعالية هذه المبيدات الذي يعمل على زيادة فترة التغذية وبالتالي زيادة تعرض او ملامسه الحشرات لمبيدات الحشرات كذلك فان استخدام مبيدات الحشرات الطبيعية مثل مستخلص بذور النيم كان له اثره الفعال في خفض اعداد الندب الناتجة عن تغذية هذه الحشرة.

2- **المكافحة الحيوية:** - تهاجم الحشرة *N. viridula* العديد من الاعداء الحيوية الطبيعية والتي تشمل الطفيليات والمفترسات وكذلك مسببات الامراض حيث سجل ما يقرب من 57 نوع من الطفيليات على هذه الحشرة وان الاكثر اهمية من هذه الطفيليات هو طفيل البيض *Trissolcus basalis* وكذلك في العالم الجديد سجلت طفيليات البالغات *Trichopoda pennipes* (F) في شمال امريكا *T. giacomeli* (Blanchard)، ففي البرازيل يوجد حاليا برنامج لتجهيز مزارعي فول الصويا بمستعمرات لبيض *N. viridula* متطفل عليه من قبل *T. basalis* حيث ترسل الى الفلاحين بالبريد ومعها بطاقة المعلومات الخاصة باستخدام هذه البيوض حيث تحتوي كل بطاقة على ما يقرب من 5000 بيوضه توضع هذه البيوض بعد ربطها على نباتات فول الصويا (توزع هذه الكمية على مساحة هكتار من فول الصويا) حيث تخرج البالغات هذا الطفيل لكي تؤدي دورها في خفض اعداد الحشرة *N. viridula* الى ما دون الحد الحرج للإصابة. كذلك هناك العديد من المفترسات من مفصليات الارجل التي تتغذى على حشرة *N. viridula* والتي هي عبارة عن معقد غير

متخصص من هذه المفترسات وكذلك نمل النار *Solenopsis Fire ant* *invicta* Buren كمفترس جيد ومؤثر للبيض والاعمار البكرة للحشرة في الولايات المتحدة الأمريكية واخيرا فان هناك تقارير مهمة تشير الى وجود نسبه قتل مهمه للحشرة من قبل الطيور في الارجننتين.

3-) المكافحة بالطرائق الزراعية:- ان استخدام المصائد النباتية كان مفيدا في خفض الاصابة بهذه الحشرة وغيرها من الانواع التابعة لعائله Pentatomidae على نباتات فول الصويا. ان حشرات البق Stink bugs تتجمع على نباتات فول الصويا خلال فترات معينه من نموه وهي فترتي تكوين القرينات Pod-set وامتلاء القرينات Pod - Filling ولذلك فان الزراعة المبكرة لفول الصويا يعد عامل جذب عال لهذه الحشرات وبالتالي يمكن استخدام هذه الاستجابة السلوكية بجذب اعداد كبيرة من هذه الحشرات الى منطقة صغيرة تحتوي على هذه المصائد النباتية (عادة اقل من 10% من المساحة الكلية) ولنجاح المكافحة الكيميائية يفضل ان تتم او يتم التركيز على الاناث التي تضع البيض وكذلك الاعمار الحورية في توقيت عملية المكافحة وقبل ظهور بالغات الجيل اللاحق ومن ثم انتشارها الى الحقول المجاورة.

ثانياً) عائله بق الازهار Miridae

المقدمة:- هي العائلة الاكبر في تحت رتبة مختلفة الاجنحة Heteroptera اذ تضم اكثر من عشرة الاف نوع موصوف فعلا وان 10 % من هذه الانواع قد وصفت خلال السنوات العشرة الاخيرة، وان علماء التصنيف يعتقدون ان هناك الكثير من الانواع التي لازالت تنتظر الاكتشاف والوصف . لهذه العائلة عدد من الاسماء الشائعة منها الـ Capsid Bugs بق الكابسيد وذلك استنادا

الى الاسم القديم لعائله Miridae وهو Capsidae اما الاسم الالمانى الشائع لهذه العائلة فهو ال Blindwanzen ويرمز الى فقدان انواع هذه العائلة للعيون البسيطة باستثناء انواع تحت عائله Isometopinae. اما الاسم الشائع لهذه العائلة في الدانمارك فهو Blomstertaeger ويعني البق المرتبط بالأزهار. في الوطن العربي لا يوجد مسح او حصر شامل للأنواع التابعة لعائله ال Miridae سوى تلك الانواع الضارة بالنباتات الاقتصادية حيث يشير الجدول (1-5) الى وجود (21) نوعا تعود لـ (17) جنس. تضم هذه العائلة ثمانية تحت عوائل هي: Cylapinae، Oeraeocorinae، Ismetopinae، Bryocorinae، Psallopimae، Phylinae، Miridinae، Orthotylinae.

المدى العائلي والتغذية لعائلة Miridae: - تعد حشرات هذه العائلة من اكثر الحشرات تواجدا على الاعشاب Herbs والشجيرات Shrubs والاشجار trees وان الانواع المرتبطة بالشجيرات والاشجار تميل الى ان تكون احادية الجيل univoltine وانها تقضي او تعبر موسم الشتاء في مرحلة او طور البيضة. معظم ال Miridae هي متغذيات نباتية ولكن بالطبع نصف هذه الانواع تتغذى كحشرات كانه (تتغذى على المواد الحية والميته) Scavengers او كمفترسات اختيارية في حين ان هناك بعض الانواع تعد مفترسات بشكل خاص وهذا مما جعلها اي عائله ال Miridae ذات اهمية وذلك لاستخدامها في مجال المكافحة الحيوية وبنجاح. القليل من حشرات ال Mirids ذات التغذية النباتية هي وحيدة العائل Monophagous حيث تتغذى وتتطور على عائل واحد فقط على العكس من ذلك فان بعض بق اللايكس Lygus bugs المتعدد العوائل Polyphagous مثل Lygus

L. lineolaris و *hesperus* في شمال أمريكا و *L. rugulipennis* في أوروبا
وآسيا تتغذى على أكثر من 100 عائل نباتي. ان معظم حشرات بق النبات
محدودة العوائل الغذائية Oligophagous حيث تتغذى وتتمو عادة على
عائلة نباتيه واحدة او على نباتات تعود لعائلات قليلة وقريبة الشبه او متقاربة،
ان حشرات الـ Mirids ذات التغذية النباتية تستخدم عادة منطقة الميزوفيل
mesophyll الغنية بالعناصر الغذائية وكذلك القمم المرستيميه apical
meristems او حبوب اللقاح Pollen في تغذيتها حيث تتغذى عادة على
المحتويات السائلة لهذه الخلايا اكثر من او مفضله ذلك على امتصاص
عصاره النبات. وتتشرك اجزاء فم هذه الحشرات (Stylet) المرنة او القابلة
للانثناء مع استعمال او استخدام انزيمات Polygalacturouase وانزيمات
اخرى اضافة الى طريقه التغذية عن طريق تمزيق النسيج وامتصاص العصاره
التي تجعل من الانسجة النباتية او الحيوانية ذات شكل سوطي او خيطي
وذات قوام حسائي يمكن امتصاصه. ان عمليات الهضم الفموي الاضافي
Extraoral digestion والمتضمن التغذية على المواد الصلبة والسائلة
Solid to liquid feeding تتكامل مع التحورات المورفولوجيه والسلوكية
والكيموحيوية والتي في النهاية تؤدي الى الاستخدام الامثل للمصادر الغنية
بالعناصر الغذائية. ان حشرات Mirids تظهر مرونة في تغذيتها أكثر مما في
حشرات تحت رتبة auchenorrhyncha و sternorrhyncha (من متشابهه
الاجنحة Homoptera) وكذلك من غيرها من الـ Heteroptera.

الأهمية الاقتصادية لعائلة ميريدي: - لاحظنا من خلال المدى العائلي
وطريقة التغذية المتبعة من قبل انواع هذه العائلة مقدار الضرر الذي يمكن ان

تحدثه في النباتات الاقتصادية التي تهاجمها. حيث تسبب حشرات هذه العائلة جروحا لجميع المحاصيل المهمة في العالم تقريبا، حيث تعد افات رئيسيه key Pest للقطن حيث صرفت لحد الان بلايين الدولارات لمكافحة هذه الحشرات على محصول القطن فضلا عن تكاليف البحوث والدراسات الخاصة بمكافحتها. اضافة لمحصول القطن فان العديد من حشرات بعض انواع هذه العائلة تعد افات مهمه على اشجار الكاكاو في غرب افريقيا حيث تسبب خسائر موسمية في محصول الكاكاو تتراوح ما بين 20-30%، كما تؤدي الهجمات المتكررة للأنواع التي تهاجم اشجار الكاكاو والاشجار الاخرى الموجودة في المناطق الاستوائية الى منعها من الوصول الى حجمها وشكلها الطبيعي. ان ضرر العديد من انواع هذه العائلة لا يقتصر على القطن والكاكاو وذلك لان العديد من انواعها تعد افات رئيسه على اشجار التفاح والكازو والجوافة والمانجو والخوخ والكمثرى فضلا عن مهاجمتها لثمار الشليك والجوز. ان تغذية الانواع الحشرية على الثمار تخفض من القيمة التسويقية للثمار، كما تؤدي التغذية على الازهار الى فشل عقد الثمار وتشوه الثمار الصغيرة وتساقط الازهار. ان الجروح التي تسببها الحشرات للثمار تعد مدخلا للعديد من الفطريات المسببة للعفن وخياس الثمار مما يزيد من الخسائر الحاصلة في الثمار. ان ضرر العديد من انواع هذه العائلة لا يقتصر على القطن واشجار الفاكهة بل يمتد ليشمل محاصيل الجت والذرة البيضاء والشاي اضافة الى مهاجمتها للعديد من نباتات الزينة مما يقلل من قيمتها الجمالية والتسويقية.

انواع بق الميريد في الوطن العربي

ان الجدول (3-5) يشير الى انواع الميريد المسجلة في الوطن العربي.

الجدول (3-5) الاسماء العلمية والعربية لأنواع بق الميريد الموجودة في

الوطن العربي

الاسم العلمي	الاسماء العربية الشائعة
<i>Adelophocoris rapidus</i> say, 1832	بقة اوراق القطن، بقة النبات السريعة
<i>Calocoris norvegicus</i> Gmelin, 1790	كبسيد البطاطا
<i>Campylomma diversicornis</i> Reuter, 1878	بق الاوراق، بق النبات
<i>Creontiades pallidus</i> Rambur, 1832	بق اسقاط البراعم الزهرية، بق اسقاط البراعم الزهرية واللوز، بق اسقاط البراعم الزهرية ولوز القطن، بقة القطن، مسقط براعم وازهار القطن
<i>Diocontus cruentatus</i> Brulle, 1832	بقة ازهار الحمضيات
<i>Helopeltis schoutedent</i> Retuer, 1904	كابسيد الكاكاو
<i>Helopeltis</i> spp	بقة الشاي، بقة نبات الشاي، بقة هيلوباتس
<i>Helopeltis theobromae</i> Miller, 1939	بق الكاكاو، بقة المانجو
<i>Lindbergocapsus allii</i> Knight, 1923	بقة نبات البصل
<i>Lygocoris communis</i> Knight, 1923	بقة الاجاص، بقة الكمثرى
<i>Lygocoris pabulinus</i> Linnaeus, 1761	الكبسيد الاخضر الشائع
<i>Lygus disponi</i> Linnavuorni, 1961	بق النباتات الماطخ، بقة النباتات الماطخة اليابانية

<i>Lygus elisus</i> Van Duzee, 1914	بقة البقوليات الباهتة
<i>Lygus lineolaris</i> Palisot de Beauvois, 1818	بقة براعم النبات
<i>Lygus sp</i>	بقة براعم نبات زهرة الشمس
<i>Nesidocoris tenuis</i> Reuter, 1895	بقة البندورة، بقة الطماطة
<i>Orthops campestris</i> Linnaeus, 1758	بقة التكديس، بقة نبات الجرز
<i>Plesiocoris rugicollis</i> Fallen, 1807	كبيد التفاح
<i>Psallus seriatus</i> Reuter, 1876	برغش القطن، نطاط القطن، نطاط القطن البرغوثي
<i>Rhinacloa forticornis</i> Reuter, 1876	بق النبات الغربي
<i>Rhinocapsus vanduzeei</i> Ulher, 1890	بق نبات الاوالية الصحراوية
<i>Sahlbergella singularis</i> Haglund, 1895	بق الكاكاو

اضرار بق الميريد ومظاهر الاصابة

ان الاعراض الناتجة عن تغذية حشرات هذه العائلة هي الاكثر تنوعا واختلافا من بقية عوائل تحت رتبة مختلفة الاجنحة Heteroptera، اذ تتراوح هذه الاعراض ما بين البقع الموضعية Local lesions في اماكن تغذية هذه الحشرات الى تأثيرات جهازية تتمثل في النمو المشوه للأجزاء النباتية التي تهاجمها، ان واحدة من التأثيرات الشائعة الناتجة عن تغذية بق النبات هو الاصفرار chlorosis عن تغذية حشرات Bryocorines (وخاصة Eccrititarsini) وكذلك بعض الحشرات من mirines. ان اعراض الاصفرار التي يسببها بق الميريد مشابه سطحيا او خارجيا للاصفرار الذي تحدثه

حشرات Tingids والحلم العنكبوتي وبعض قفازات الاوراق التي تتغذى على خلايا الميزوفيل فضلا عن تكوين البقع الداكنة dark spots نتيجة تراكم الفضلات excrement الموجودة على السطح السفلي للأوراق. من الاعراض الاخرى الشائعة والناجمة عن تغذية حشرات الـ Mirid هو ذبول النموات الحديثة، تجعد الاوراق او المجموع الخضري، ثقب الاوراق والتمزيق tattering، تقرحات وبقع على السيقان، dimpling وجود نقر او حفر، الجرب Scabbing، تشوه الثمار وسقوطها كما في ثمار التفاح وثمار الجوافة والمانجو والكمثرى والتسبب في ظهور اعراض مكنسة الساحرة witches broom كذلك هناك الكثير من التأثيرات الدقيقة subtle effects لتغذية هذه الحشرات (بق النبات) وهي تلك الاعراض التي يساء تشخيصها في كثير من الاحيان مثل ذبول الاوراق، موت نهايات الافرع، تغلظ الاوراق والسيقان، وعدم تكون الازهار وانخفاض معدل نمو النبات المصاب. كذلك تعد حشرات الـ Mirid من الاسباب المهمة لما يعرف بالقمة الفضية للحشائش silvertop of grasses وهي حالة تلون القمم باللون الابيض الفضي التي تبدو بالغه او ناضجة ولكنها تحمل ازهارا عقيمه وتفتقر الى البذور القابلة للإنبات. ان تغذية الحشرات من بق اللايكس lygus bugs على بذور الجزر الى خلو البذور من الاجنة مع بقاء الاندوسبرم طبيعيا في شكله او مظهره لذلك فانه لا يمكن الكشف عن البذور المصابة من مظهرها الخارجي او حجمها او وزنها. بذور الجزر المصابة ببق *Lygus hesperus* تبقى حيه ولكنها تنمو ببطيء مقارنة مع تلك البذور غير المصابة. واخيرا ومهما يكن

فان النباتات الناتجة من البذور المصابة او المتضررة تبدي او تظهر نمو متسارعا وان هذه الظاهرة تعود او تعزى الى ما يسمى بالحث النباتي كذلك فان حبوب الحنطة المستخدمة لعمل الخبز تمتاز بنوعيتها الرديئة وذلك بسبب تغذية حشرات الـ Mirid عليها وغيرها من Heteroptera.

تاريخ الحياة

ان تاريخ حياه بق النبات قد درس بشكل واسع او شامل لتلك الانواع التي تعيش او تتواجد في المناطق الحرارية المعتدلة وكذلك للأنواع التي تعيش في المناطق الاستوائية والتي تعد مهمة في الزراعة، ففي المناطق المعتدلة تكون اكثرية الانواع من بق النبات احادية الجيل univoltine اي لها جيل واحد في السنة وتقضي الشتاء في طور البيضة كما ان معظم الانواع هي متغذيات نباتية phytophagous وترتبط بنمو وتطور الانسجة المرستيمية او الازهار ولذلك فأنها تلاحظ عندما تكون النباتات او عوائل هذه الحشرات في حالة النشاط من تكوين للمجموع الخضري او الازهار، العديد من انواع بق النبات تكون متخصصة على عوائل معينة حيث تتغذى على النباتات المعمرة الخشبية woody perennial في حين ان هناك مجاميع من الـ mirids مثل الحشرات التابعة لـ Deracarinae Isometopinae هي حشرات مفترسة وبالتالي فان دورة حياتها ترتبط بقوة وبشكل رئيسي بدورة حياه فريستها والذي يقابله من فترة نمو نشطه وفعاله للنباتات. وحتى الانواع المفترسة من هذه الحشرات في كثير من الاحيان تكون متخصصة على انواع معينة من النباتات وهو بشكل واضح انعكاس للتخصص العائلي لفريستها، ان اعداد قليلة من الانواع التابعة لـ mirid تبدي او تظهر تنوعا أكثر في تغذيتها حيث تتغذى

على المواد النباتية والحيوانية معا وان هذه الأخيرة وبعض الحشرات الاخرى تكون عادة متعددة الاجيال *multivoltine* حيث ان لها أكثر من جيل واحد في السنة. ان من اهم الحشرات الممثلة لهذه العائلة هي حشره بقه اللايكس *Lygus lineolaris*، تعد حياته بق اللايكس *lygus bugs* والتي تهاجم اكثر من 300 نوع نباتي والتي تشمل العديد من الادغال وتقريبا 50 محصول اقتصادي افضل مثال على تاريخ حياه هذه الحشرات حيث تعبر هذه الحشرات الشتاء على صورة بالغات تحت الاوراق المتساقطة وبقايا النباتات في الحقل او اي اماكن تكون بعيدة عن الاعداء ومحمية، في الربيع وعند ارتفاع درجات الحرارة تنشط البالغات وتحديدًا من منتصف نيسان الى نهاية ايار حيث تتزوج حال ظهورها بعدها تقوم الاناث بوضع البيض وذلك بإدخاله في البتلات *petioles* والسيقان للنباتات النامية والنشطة (والتي تشمل في معظمها الادغال في الربيع)، يفقس البيض عن حوريات صغيرة وذلك خلال 1-3 اسابيع تبعا لدرجات الحرارة السائدة وهذا يعد بداية الجيل الحقيقي الاول لهذه الحشرات خلال الموسم، تبقى هذه الحوريات عادة على هذه النباتات وتتغذى وتتمو عبر مرورها بخمسة اعمار حورية وذلك قبل انتقالها الى طور البالغة في شمال ولاية *Dakota* ومينسوتا فان هذه الحشرات تحتاج من 4-6 اسابيع لإكمال الجيل ولهذه الحشرات 2-3 جيل في السنة. البالغات سريعة الحركة وتطير فور ازعاجها وان حركتها تقع ضمن الحركات القصيرة المدى داخل الحقول والطيران من حقل لأخر وان حركه هذه البالغات تكون سريعة في بحثها عن العائل الاكثر ملاءمة للتغذية ولوضع البض وخاصة عندما يصبح العائل الاولي غير ملاءم بسبب الإصابة الشديدة او الجفاف او الانجماد او

جفاف هذه العوائل لوصولها مرحلة البلوغ الفسيولوجي. تهاجم بالغات الجيل الثالث حقول البنجر السكري في نهاية الموسم وتحديدًا من منتصف إلى نهاية آب وذلك بعد حصاد المحصول العائل السابق (مثل الجت alfalfa والكانولا canola) أو أي عائل آخر أصبح غير ملائم لتغذية هذه الحشرات.

وصف الاطوار

طول بالغات بق اللايكس lygus bugs حوالي 0.25 نج وعرضها نصف طولها، اجسامها المسطحة تتناقص تدريجياً وبشكل خفيف باتجاه الرأس وبشكل أكثر باتجاه نهاية الجسم، لها زوج من قرون الاستشعار طويله وذات نهاية مستدقة، اجزاء فمها ايضاً مستدقة تتألف من اربعة عقل، لون الجسم يختلف من الاسمر الضارب الى الصفرة او الاخضر الباهت الى البني المحمر المبرقش او البني الغامق، للبالغات صفيحة مثلثة الشكل واضحة وبارزة والتي توجد على الجهة الظهرية وبين قاعدتي الجناح، جانبي هذه الصفيحة ذات لون ابيض مصفر مما يعطي لهذه البالغات صفة تمييزية هي الشكل 7 الموجود على الجهة الظهرية. اما الحوريات فلونها من الشاحب الى الاخضر المصفر وصغيره جداً حيث يبلغ طولها فقط 0.04 نج وذلك خلال الايام القليلة الاولى من فقسها، الحوريات الاكبر يبلغ طولها من 0.06-0.20 نج وذات لون اخضر لمار لجميع حوريات اللايكس وعلى الجهة الظهرية للبطن وفي المركز او الوسط بقع هي عباره عن فتحات غدد الرائحة هذه الاخيرة والبقع تعد دليلاً قاطعاً على وجود بق اللايكس، تتحرك الحوريات سريعاً على النبات وتسقط احياناً على الارض وتحت رؤوس البنجر السكري

وذلك عند ازعاجها وعندها تصبح عملية التعريف وحساب اعداد هذه الحوريات عملية صعبة.

المكافحة

1- (المكافحة الكيميائية:- من الضروري وقبل اجراء المكافحة عمل مسح شامل للحقل لتحديد مدى الحاجة لاستخدام المبيدات وذلك بأخذ العينات العشوائية والتي لا تقل عن 50-100 نبات تفحص بالكامل لتحديد الإصابة فضلا عن سطح التربة وخاصة تحت canopy. ان مهاجمة او وجود هذه الحشرات (بق النباتات) على أكثر من 170 نوع من العوائل النباتية البرية او الادغال يجعل من الأخيرة اللاعب الرئيسي في تاريخ حياه هذه الحشرات وبالتالي فان الإدارة المؤثرة للأدغال من عريضة الاوراق والصغيرة من بداية الربيع وحتى منتصف الصيف ربما يساعد في خفض اعداد هذه الحشرات وان اجراء الحرق للأدغال المتواجدة عند حواف الحقل وعلى جوانب الطرق له أثر كبير في القضاء على مواقع تشتية هذه الحشرات. ان استخدام برنامج استئصال سوس الجوز ومكافحة ديدان الجوز جعل من *Lygus lineolaris* الالفه رقم 1 على القطن في ولاية Mississippi وان الحد الحرج لهذه الالفه وقبل التزهير بلغ 8 بالغات / 100sweeps على القطن و20 بالغه / 100 sweeps بعد التزهير.

ان وصول اعداد هذه الحشرات الحد الاقتصادي الحرج اعلان بموعد المكافحة الكيميائية وان استخدام المبيد الصحيح في الوقت المناسب مهم جدا لتأخير ظهور صفة المقاومة للمبيدات اضافة الى ضرورة استخدام مبيدات الحشرات المؤثرة على الحشرات وبطرق مختلفة وان مقاومة هذه الحشرات للمبيدات

البيرثروبيديه قد لوحظت لبعض الوقت وان الاعراض الأولية لمقاومة هذه الحشرات للمبيدات الفسفورية العضوية قد لوحظت مؤخرًا.

2-) **المكافحة الحيوية:** - في دراسة لمعرفة امكانية او قدرة الفطر *Beauveria bassiana* في مكافحة بق اللايكس Tarunished plant bug على الفراولة وجد ان الرش الاسبوعي للمستحضر التجاري لهذا الفطر لم يعطي مكافحة فعالة ولم يكن له تأثير في كمية الحاصل مقارنة مع النباتات غير المعاملة بالرغم من ان الفطر قد تم عزله من اكثر من 40% من على او داخل حوريات البق المعاملة في حين ان 7% فقط من الحوريات غير المعاملة كانت مصابه بهذا الفطر ويرجح ان السبب في عدم خفض الاضرار او زيادة الحاصل ربما يكون بسبب عدم اصابه البالغات او ان اصابه الحوريات لم تكن كافية للتأثير على سلوكيه التغذية او نسبه الموت. كما اشارت الدراسات الى مهاجمة حوريات هذا البق *Lygus lineolaris* في اوربا من قبل الزنبور الطفيلي *Peristenus digoneutis* والذي ادى الى موت هذه الحوريات وان لهذا الطفيل جيلين في السنة.

ثالثاً) بق البذور الحقيقي *Lygaeidae*

المقدمة: - تضم عائلة *Lygaeidae* او بق المخفيات 4045 نوعا تعود لـ 651 جنس لغايه عام 1964 وخلال الفترة التي تلت عام 1964 تم وصف 1397 نوعا جديدا بزيادة 47% عن عدد الانواع لغايه 1964، ان هذه الزيادة الكبيرة لا تشير فقط الى العمل المكثف للسنوات الأخيرة ولكنه يرجع ايضا الى عدم اكتمال المعلومات التصنيفية التي ادت الى عدم تمييز هذه الانواع في السابق فضلا عن الدراسات المتميزة والتي اجريت على سكان هذه

العائلة في الطبيعة خاصة للأنواع غير الضارة اقتصاديا وذات الالوان البراقة مثل الـ *Oncopeltus* ، *Lygaeus* وغيرها. تضم هذه العائلة حاليا 15 تحت عائله والجدول (4-5) يوضح اسماء تحت العوائل وعدد الانواع المعروفة في كل عائله. في الوطن العربي لا تتوفر احصائية عن عدد الانواع المسجلة التابعة لعائله Lygaeidae سوى تلك الانواع المسجلة كافات زراعية وبالغة 14 نوعا تعود لثمانية اجناس (الجدول 5-1).

الجدول (4-5) تحت عائلات Lygaeidae وعدد الانواع التابعة لها

أنواعها	تحت العائلة	انواعها	تحت العائلة
20	Henestarinae	640	Lygaeinae
26	Bledionotinae	255	Orsillinae
147	Oxycareninae	92	Cyminae
78	Pachygronthinae	77	Ischnorhynchinae
97	Heterogastrinae	435	Blissinae
1	Henicocorinae	18	Artheneinae
1927	Rhyparochrominae	229	Gceocorinae
		3	Psamminae

الاهمية الاقتصادية لعائله بق البذور

ان الاهمية الاقتصادية لأنواع هذه العائلة تختلف تبعا للنوع الحشري وللأهمية الاقتصادية للمحصول الذي تهاجمه فضلا عن المنطقة او الدولة التي ينتشر فيها ودرجة التطور العلمي لذلك البلد، وقد اظهرت الدراسات ان الانواع المهمة اقتصاديا تقع في تحت العائلات الأتية: *Oxycarinae* ، *Orsillinae*

Geocorinae و Lygaeinae، Blissinae، ومعظمها نباتية التغذية تهاجم المجاميع المختلفة من المحاصيل ماعدا تحت عائلة Geocorinae التي تضم انواعا مفترسة للحشرات. انواعها قد تتباين في الاجزاء النباتية التي تهاجمها فمثلا نجد ان انواع تحت عائلة Lygaeinae تتخصص في امتصاص عصارة البذور ولذلك سميت العائلة ببق البذور لان تحت العائلة Lygaeinae هي النمط الممثل للعائلة، فيما يطلق على الانواع التابعة لتحت عائلة Blissinae اسم بق الفراش Chinch bug لان حشراتهما تشبه بق الفراش وهي تتغذى على امتصاص عصارة الاوراق والاجزاء النباتية الاخرى، ويعتقد الكثير من الباحثين ان تحت العائلة Blissinae هي الاكثر اهمية من الناحية الاقتصادية في عائلة Lygaeidae وذلك لان معظم انواعها تخصصت في التغذية على نباتات ذات الفلقة الواحدة وخاصة نباتات العائلة النجيلية Poaceae ومنها الحنطة والشعير والذرة والرز والتي تمثل المصادر الرئيسية للغذاء العالمي. ان الاهمية الاقتصادية لعائلة بق البذور يمكن ان ترجع او تعزى للأسباب الآتية:

- 1- الانتشار العالمي للكثير من انواعها مما يجعلها افات خطيرة على مساحات واسعة من الاراضي الزراعية.
- 2- المدى العائلي الواسع لأنواعها حيث ان منها ما يهاجم محاصيل الحبوب المختلفة التي تمثل مصادر الغذاء الرئيسية للإنسان والحيوان ومنها ما يهاجم المحاصيل الصناعية كالقطن فيما اخرى تهاجم اشجار الفاكهة ونباتات الخضر والزينة.
- 3- ان امتصاص حشرات انواع هذه العائلة للعصارة النباتية تؤدي الى احداث خسائر كبيرة في المحاصيل التي تهاجمها وكما يأتي:

حشرات نصفية الأجنحة الضارة بالنباتات الاقتصادية

أ- انخفاض انتاجية محاصيل الحبوب نتيجة ضمور الحبوب وعدم انباتها وعدم صلاحيتها لعمل الخبز.

ب- انخفاض انتاجية اشجار الفاكهة وتشوه الثمار مما يخفض من قيمتها التسويقية.

ت- ان العديد من الاعراض التي تسببها انواع هذه العائلة تتشابه مع الاعراض التي تحدثها بعض المسببات المرضية خاصة الفايروسات مثل اعراض التبرقش ومكنسة الساحرة.

مما سبق تتضح الاهمية الاقتصادية لعائله بق البذور.

الانواع الضارة من عائلة Lygaeidae في الوطن العربي

ان الانواع الضارة من عائلة بق البذور المعروفة في الوطن العربي هي اعداد متواضعة عند مقارنتها بعدد الانواع الموصوفة ضمن عائله Lygaeidae والجدول (5-5) يوضح الاسماء العلمية والعربية الشائعة لتلك الانواع. الجدول (5-5) الاسماء العلمية والعربية الشائعة لحشرات عائله بق البذور

Lygaeidae في الوطن العربي

الاسماء العلمية	الاسماء العربية الشائعة
<i>Blissus leucopterus</i> Say, 1832	بقة الحنطة
<i>Blissus occiduus</i> Barber, 1918	بقة الحنطة الغربية
<i>Elasmolomus sordidus</i> Fabricius, 1787	بقة السمسم
<i>Leptodemus minutus</i> Jakovlev, 1876	البقة الصحراوية
<i>Nysius caledonia</i>	بقة بذور الكاليدونيا، بقة كاليفورنيا

Distant, 1920	
<i>Nysius clevelandensis</i> Evans, 1929	البقة العنقودية الرمادية
<i>Nysius cymoides</i> Spinola, 1837	بق الرقي
<i>Nysius ericae</i> Schilling, 1829	بقة البذور، بقة الحنطة المزيفة، بقة الفراش المزيفة
<i>Nysius spp</i>	بق الحنطة المزيف
<i>Oncopeltus fasciatus</i> Dallas, 1852	بقة دغل الحليب، بقة دغل الحليب الكبيرة
<i>Orsillus depressus</i> Dallas, 1852	بقة بذور السرو
<i>Orsillus maculatus</i> Fieber, 1843	بقة بذور السرو
<i>Oxycarenus hyalinipennis</i> Costa, 1843	بق بزر القطن، بق شعر القطن، بقة بذرة القطن، البقة الخضراء، بقة ورق القطن الخضراء
<i>Spilostethus pandurus</i> Scopoli, 1763	بق اللايجيد، بق اللايكس، بق ورق النبات

تاريخ الحياة لعائله بق البذور Lyaeidae

قبل التطرق لتاريخ حياه هذه العائلة نجد من الضرورة بمكان الاشارة الى ان الاحداث التي تمر على كل كائن حي ومنها الحشرات تتأثر بعوامل البيئة المحيطة وبنوع او سلاله ذلك الكائن.

مثال ذلك: فترة حضانه البيض للحشرة اكس (x) تتباين تبعا لدرجة الحرارة والرطوبة النسبية ونوع العائل الغذائي الذي تتغذى عليه الانثى الام والوقت من الموسم الذي وضع فيه البيض ومكان وضع البيض على العائل النباتي والجهة من النبات التي وضع عليها البيض وتسلسل الجيل (هل البيض للجيل

الاول او الرابع مثلا) ونوع البيض من حيث كمية المح وعدد الاجنة وحجم البيض وغيرها من العوامل وكذلك الحال مع بقية اطوار الحشرة. ان تاريخ حياة هذه العائلة يتمثل في مرورها بطور البيضة الذي يفقس عن حوريات Nymphs تتغذى بامتصاص العصارة النباتية، هذه الحوريات تمر بعدة اعمار قبل ان تتحول الى طور الحشرات البالغة، التي تتزوج لتضع البيض لتعيد دورة الحياة من جديد. ان حشرات معظم انواع هذه العائلة تقضي فترة الشتاء على شكل بالغات او حوريات بالغه تنشط خلال الاشهر الدافئة حيث تتزوج وتبدأ بوضع البيض على عائلها النباتي او تغرزه داخل النسيج النباتي وتستغرق فترة وضع البيض من 2-3 اسابيع، يفقس البيض خلال 1-2 اسبوع عن حوريات تقوم بامتصاص العصارة النباتية من عوائلها النباتية، تمر الحوريات بعدة اعمار وفي الغالب خمسة اعمار حورية ويستغرق فترة العمر الحوري 30-90 يوم قبل وصولها الى الطور البالغ، لحشرات هذه العائلة عدة اجيال في السنة. ان من أكثر الانواع الحشرية الممثلة لهذه العائلة في الوطن العربي والعراق هي حشرة بقعة بذور القطن والتي سيتم التطرق اليها في الصفحات الأتية:

Cotton Seed Bug

بقعة بذور القطن

واسمها العلمي *Oxycarinus hyalinipennis* وتعود لتحت عائله Oxycareninae التي تضم 25 جنسا اكبرها الجنس *Oxycarinus* الذي يضم 55 نوعا على الاقل تعد افات زراعية على نباتات العائلة الخبازية مثل القطن والباميا وان 36 نوعا من انواع الجنس *Oxycarenus* سجل وجودها في افريقيا مما يشير الى انها تفضل الاجواء الاستوائية الا ان ذلك لا يمنع

وجود انواع منها في المناطق المعتدلة مثل حشره بقعة بذور القطن المنتشرة في البلاد العربية ومنها العراق.

الاضرار ومظاهر الإصابة بالحشرة

ان الاسم الانكليزي الشائع لهذه الحشرة Dusky cotton stainer bugs اي صابغه القطن المعتمة يشير الى واحدة من الاضرار المهمة التي تسببها للقطن اذ ان وجود هذه الحشرات داخل الياف القطن في محالج القطن يؤدي الى اصطباج القطن باللون الاحمر الغامق وهو لون هيموليمف الحشرة. ان الانواع التالية للجنس *Oxycarenus* ومنها بقعة بذور القطن لا تهاجم الاجزاء الخضرية لنباتات القطن (الاوراق والسيقان) وغيرها من نباتات العائلة الخبازية Malvaceae ولكنها تتغذى على امتصاص عصارة بذور القطن كونها مصدر غني بالزيت، هذه التغذية تعمل على محتويات البذور من الزيت وانخفاض وزن البذور بحدود 15% فضلا عن تأثيرها في حيوية البذور وانخفاض نسبه انباتها. ان ضرر هذه الحشرة يزداد بشكل واضح على القطن عندما يكون القطن مصابه بديدان جوز القطن التي تصنع ثقوبا في الجوز وتسهل من عمليات دخول حشرات البق للتغذية على بذور القطن وفي فلسطين وجد ان بقعة بذور القطن تهاجم ايضا اشجار النخيل والتين والافوكادو والبرسيمون فضلا عن مهاجمتها لمحصول زهرة الشمس وغيرها من المحاصيل وان اصابه هذه المحاصيل ادى الى حدوث تشوهات فيها والى تشقق البذور وتغير لونها وتؤدي الإصابة الشديدة الى تعفن رؤوس زهره الشمس في الحقل.

وصف الاطوار: - الحشرة الكاملة لبقعة بذور القطن صغيرة بيضوية الشكل

طولها بحدود 4 ملم وعرضها 1.5 ملم والذكور اصغر من الاناث، جسم الحشرة لونه اسود واجنحة امامية بيضاء، للفخذ الامامي عدد من الاشواك في كلا الجنسين. البيض بيضاوي متطاوّل عرضه 0,39 ملم وطوله 0,97 ملم للبيضة 25 ضلع طولي ونهايته الأمامية تكون مستديرة، ان الشكل المميز للبيض جعل الكثير من الباحثين يطلقون عليه اسم Oxycareniod type egg يتغير لون البيضة من اللون الاصفر مع تقدم النمو الى البرتقالي.

الحوريات: ذات لون احمر عند الفقس ومع تقدم الحورية في العمر يصبح لونها احمر داكن ولها زوج من الغدد البطنية الواقعة بين ترجه الحلقات البطنية الرابعة والخامسة والسادسة، وقد وجد ان للطور الحوري خمسة اعمار حورية.

تاريخ الحياه:- تستغرق عملية التزاوج بين ذكور واناث الحشرة 1-4 ساعات وذلك بالتقاء مؤخرتي الجنسين وبقيادة الانثى الاكبر. كما قد تتزاوج الانثى مره اخرى مع ذكر اخر وذلك بعد مرور 1-3 ساعات من التزاوج الاول، تستغرق فترة ما قبل وضع البيض من 2-3 ايام وان البيض يوضع بشكل فردي او في مجاميع من 2-4 بيضات تلصقه الانثى على النسيج النباتي، وان متوسط عدد البيض الذي تضعه الانثى خلال فتره حياتها 20 بيضه وان متوسط فترة حياه البالغات استغرق خمسة ايام وان فترة فقس البيض تتراوح بين 15-30 دقيقة حيث يفقس عن حوريات تتجمع مع بعضها خلال 30 دقيقه وذلك قبل انتشارها ثانيه لغرض البحث عن الغذاء، دراسات عديدة اجريت حول تأثير درجات الحرارة والرطوبة النسبية في متوسط فتره حضانه البيض وتطور الحوريات، اظهرت انه لم يكن هناك تأثير واضح للرطوبة في هذا المجال، في

حين كان للحرارة تأثير واضح في هذا المجال حيث بلغت فترة حضانة البيض عند درجات الحرارة 25 و30 و35 م 6.5 و5.4 و4.1 يوم على التوالي فيما بلغت فترة الطور الحوري 25.9 و17.2 و14 يوم على التوالي. للطور الحوري خمسة اعمار حورية. لحشره بقه بذور القطن 3-4 اجيال في السنة وذلك تبعاً لنوع الغذاء وطول فترة السبات في حين كان للحشرة 7 اجيال في السنة تحت ظروف المختبر، ان دورة حياة الحشرة تستغرق 55 يوم في المتوسط. ان استراتيجيه تغذية هذه الحشرة خلال فترة حياتها تتمثل في عدم التغذية على اوراق وسيقان النبات العائل وذلك للحفاظ على حيوية النبات ونشاطه لإنتاج البذور للتغذية عليها من قبل الحشرة.

المكافحة Control: - مما لاشك فيه ان الجهود التي تبذل لمكافحة اي افه تعتمد على الاهمية الاقتصادية لتلك الافه ودرجة انتشارها، كما ان تنوع طرائق مكافحتها يعد هو الاخر مقياساً لأهمية تلك الآفات. ان بقعة بذور القطن تعد واحدة من الآفات الحشرية المهمة التي نالت اهتماماً كبيراً من العاملين في مجال مكافحة آفات القطن في الولايات المتحدة الامريكية كون الاخيرة هي المنتج الاول للقطن في العالم. ان من اهم الطرائق المستخدمة في مكافحه بقعة بذور القطن ما يأتي:

اولاً) الطرائق الزراعية Cultural method: - من اهم الطرائق الزراعية ما يأتي:

1-) تغيير موعد زراعه القطن سواء بالتبكير او التأخير لتجنب مهاجمة الحشرة جوز القطن، والمنتج للتغذية على البذور.

2-) زراعه اصناف القطن المقاومة للحشرة او المعدلة وراثيا من اجل خفض الاصابة بهذه الحشرة.

ثانياً) الطرائق الفيزيائية **Physical Methods**:- وتشمل

1- إزالة العوائل الثانوية: ان ازالة الادغال والعوائل الثانوية للحشرة خاصة تلك التي تعود للعائلة الخبازية *Malvaceae* بالعزق والتعشيب والحراثة تعد من الوسائل الفعالة في مكافحة الحشرة كونها من تلك العوائل التي تعد مخازن لسكان بقه بذور القطن.

2- تخزين بذور القطن في اماكن او مخازن يمكن السيطرة فيها على مستوى منخفض من الرطوبة وذلك لحاجة هذه الحشرات الى الرطوبة اثناء تغذيتها على البذور.

ثالثاً) المكافحة الحيوية **Biological control**:- ان استخدام المكافحة

الحيوية للسيطرة على بقه بذور القطن تعد من الامور الصعبة وذلك:

1- كثرة وتنوع عوائلها الثانوية التي تعد مخازن او مستودعات لهذه الحشرة.
2- قلة الاعداء الحيوية التي تهاجم هذه الحشرة، خاصة عدم وجود طفيليات على بيضها فضلا عن قلة مفترساتها الحشرية.

3- وجد ان المفترسات العامة لا تتغذى على هذه الحشرة ايضا ومنها ايضا السحلية المعروفة بالاسم *Agama agamal* وذلك لامتلاك بقه بذور القطن للغدد المفرزة للروائح الطاردة للمفترسات بشكل عام.

ان ما سبق لا يمنع وجود بعض المفترسات التي يمكن ان تتغذى على هذه الحشرة ومنها اسد النمل *Chrysopa vulgaris* الذي وجد متغذيا على حوريات العمر الخامس لبقه بذور القطن.

رابعاً) المكافحة الكيميائية **Chemical control**:- تعد المكافحة الكيميائية

الطريقة الاكثر فاعليه والمعول عليها في مكافحه بقه بذور القطن خاصة في

الحقول الكبيرة والتي تتجاوز مساحتها مئات الهكتارات، ان الاعتماد على المكافحة الكيميائية يتطلب في هذه الحالة ان تكون اقتصادية تتناسب واسعار القطر العالية ولكي يتحقق هذا الهدف ينبغي مراعاة ما يأتي:

1-) تقليل عدد مرات الرش خلال موسم القطن الطويل وذلك من خلال اتباع ما يلي:

أ-) تحديد قيمة الحد الاقتصادي الحرج للحشرة

ب-) التوقيت المناسب لعملية الرش لتحقيق اعلى نسبة قتل في سكان الحشرة
ت-) استخدام المبيدات بطيئة التحلل مثل مبيدات الحشرات التابعة لمجموعة الكلور العضوية مثل الاندوسلفان لان القطن من المحاصيل الصناعية.

2-) استخدام الطيران الزراعي في رش المبيدات لخفض كلفة عمليات المكافحة ان متابعة تاريخ مكافحه افات القطن الحشرية وخاصة ديدان ورق وجوز القطن وبقه بذور القطن نجد انه قد تم استخدام معظم مبيدات الحشرات المعروفة بدءا من المركبات غير العضوية وانتهاءً بأحدث المبيدات المعروفة اليوم وان الحصة الاكبر كان لتلك المبيدات التابعة لمجموعه الكلور العضوية مثل DDT و Endosulfan.

رابعاً) عائله البق المطرز Lace Bugs Tingidae

المقدمة:- ان الاسم الشائع لحشرات عائله Tingidae هو البق المطرز او المخرم Lace Bugs جاء من المظهر الخارجي لأجنحتها الامامية المزركشة او المرقطة فضلا عن ذلك فان لهذه العائلة اسماء شائعة اخرى منها Netzwanden او الـ Gitterwanzen في المانيا و Netwantsen او Netwerkwantsen في هولندا و Chinchas de encaja في اسبانيا

(الشكل 5-3). قديما كان اسم هذه العائلة يكتب Tingididae و Tingitidae وان التسمية الاخيريه Tingidae جاء بقرار من اللجنة المسؤولة للتسميه الحيوانية. انواع هذه العائلة واسعه الانتشار حيث توجد في المناطق الاستوائية والمعتدلة فضلا عن انتشارها في جزر المحيطات تضم هذه العائلة تقريبا 250 جنس و 2000 نوع موصوف.


اهم الصفات الحيوية لحشرات عائله البق المطرز

The Most Important Biological Characteristic of Tingidae

ان من اهم ما يميز هذه العائلة ما يأتي:

1- التغذية: حشرات هذه العائلة متغذيات نباتيه تهاجم السطح السفلي لأوراق عوائلها حيث تحصل على غذاءها بامتصاص عصارة النبات عن طريق غرز اجزاء فمها الثاقبة الماصة في الانسجة المرستيمية العمادية كبقية حشرات مختلفة الاجنحة Heteroptera.

2- المدى العائلي: ان معظم انواع هذه العائلة متخصصة على عوائلها الغذائية اي انها وحيدة العائل الغذائي اذ ان هذا لا يمنع وجود بعض الانواع متعددة العوائل الغذائية مثل بقعة الـ *Corythucha* (F) او محدود العوائل الغذائية *Oligophagous* مثل بقعة الكمثرى المطرز *Stephanitis pyri*.



الشكل (3-5) حشرة البق المطرز

(-a) منظر سفلي لمنطقة الرأس (-b) منظر علوي لمنطقة الرأس

(-c) منظر جانبي للحشرة (-d) منظر بطني لحشرة البق المطرز

3- السلوك الدفاعي: يعتقد الكثير من الباحثين ان قلة الاعداء الطبيعية التي تهاجم انواع هذه العائلة ربما يرجع الى امتلاكها لبعض السلوكيات الدفاعية المتمثلة بتجمع الحوريات والبالغات على السطح السفلي لأوراق العائل النباتي عند التغذية وعناية الام بصغارها فضلا عن امتلاك الحوريات لفيرمونات التحذير Alarm Phermone فضلا عن ان بعض انواعها تعيش داخل اورام تصنعها على النبات، كما ان المظهر الخارجي لحوريات بعض الانواع المتمثل بوجود اشواك صلبة على الجسم واخرى على قرون الاستشعار تعطي مظهرا عدوانيا يخيف الاعداء الحيوية ويعتقد اخرون ان هذه الاشواك تفرز قطرات من مركبات طاردة لأعدائها.

4- الطيران: تمتاز انواع عائلته الـ Tingidae بانها بطيئة الطيران لذا تسمى بالـ Slow –Flying Insects.

5- عدد الاجيال: ان عدد الاجيال خلال السنة لأنواع البق المطرز لازال غير واضح خاصة بالنسبة للأنواع التي لا تسبب خسارة اقتصادية او بسبب نقص الدراسات الخاصة بتلك الانواع وبشكل عام فان لأنواع البق المطرز من 1-2 جيل / سنة كما ان تعدد الاجيال Multivoltinism قد سجل في بعض انواع الاجناس Tingis و eleonemia و Stephanitis.

الأهمية الاقتصادية لحشرات البق المطرز

Economic Important of Tingidae

ان الاهمية الاقتصادية لكل نوع من انواع البق المطرز تحدده العديد من العوامل والتي من اهمها:

- 1- المساحة الجغرافية التي ينتشر فيها النوع الحشري اذ ان الانتشار الواسع يشير الى قدم النوع ومهاجمته لعوائل غذائية مختلفة.
- 2- العوائل الغذائية التي يهاجمها والقيمة الاقتصادية لتلك المحاصيل او العوائل ودرجة توفرها.
- 3- الظروف البيئية السائدة في منطقة وجود انواع البق المطرز ودرجة تكيف تلك الانواع للظروف البيئية السائدة.
- 4- الكفاءة الحيوية للنوع الحشري من حيث عدد مرات التزاوج والنسبة الجنسية نوع التكاثر وعدد الاجيال وغيرها وعلى ضوء العوامل السابقة نجد ان عدد ونوع او انواع البق المطرز التي تسبب خسارة اقتصاديه في الوطن العربي يختلف كثيرا عن اعداد وانواع البق المطرز ذو الأهمية الاقتصادية في الولايات المتحدة الأمريكية وهكذا في دول العالم الاخرى ان ما سبق يفسر كيف ان انواع معينه من البق المطرز تسبب اضرارا اقتصاديه لعوائلها في حين انواع اخرى لا تسبب مثل تلك الخسائر.

تاريخ الحياة العام لحشرات البق المطرز

Tingidae General life history

ان معظم انواع عائله البق المطرز التي تعيش في المناطق المعتدلة من العالم حيث يكون الشتاء باردا تقضي فترة التشتية Hibernation بشكل بالغات تحت قلف الاشجار وفي شقوق النبات وتحت الاوراق المتساقطة او بشكل بيض مغروس في نسيج الورقة النباتية. مع بدء موسم النشاط تبدء اناث التشتية بوضع البيض التي تغرزه في النسيج الميزوفيلي الاسفنجي كما في انواع الجنس *Stephanitis* او تضعه بشكل عامودي او مائل على حامل او

سويق Pedicle على السطح السفلي للورقة النباتية كما في انواع الجنس *Corythucha*. ان غطاء البيضة المغروز في النسيج النباتي يكون بالقرب من العرق الوسطي الطولي او العرق المستعرض حيث يغطي بإفرازات تشبه الشيلاك Shellac لون البيض وشكله وحجمه يختلف باختلاف النوع الحشري. ان عدد البيض الذي تضعه الانثى وفترة حضانة البيض ونسبه الفقس تعتمد على النوع الحشري ونوع العائل الغذائي والظروف البيئية السائدة. مثال ذلك حشرة الـ *Stephanitis pyrioides* يعتمد على امتصاص الماء من العائل لإكمال تطوره الجنيني وعليه فان التباين الموسمي في مستويات الرطوبة للعائل سيؤثر على نمو وتطور البيض. يفقس البيض عن حوريات تمر بأربعة انسلخات وخمسه اعمار حورية تتغذى خلالها على السطح السفلي لأوراق عائلها النباتي بامتصاص العصارة النباتية. بعد اكتمال الطور الحوري ينسلخ العمر الحوري الخامس الى حشرات كاملة (ذكور واناث) تتزاوج مرة اخرى لتعيد دورة الحياة. ان فترات الاعمار الحورية والبالغات وعدد الاجيال تعتمد ايضا على النوع الحشري ونوع العائل الغذائي والظروف البيئية السائدة في المنطقة التي يتواجد فيها النوع الحشري.

حشرات البق المطرز في الوطن العربي

Lace-Bugs in Arab World

ان الانواع الضارة من حشرات البق المطرز المسجل وجودها في الوطن العربي هي 10 انواع تعود لأربعة اجناس الجدول (5-6).

الجدول (5-6) الاسماء العلمية والعربية الشائعة لأنواع البق المطرز الضارة بالنباتات الاقتصادية في البلاد العربية

الاسماء العلمية	الاسماء العربية الشائعة
<i>Galeatus helianthe</i> onder & Lodos, 1977	بق عباد الشمس المطرز، بق نبات زهرة الشمس المطرز
<i>Galeatus scrophicus</i> Saunders, 1876	بق عباد الشمس المطرز، بق نبات زهرة الشمس المطرز
<i>Monosteira buccata</i> Horvath, 1899	بق القوغ المطرز
<i>Monosteira lobulifera</i> Reuter, 1888	بق الاجاص، نمر الاجاص، نمر اللوز
<i>Monosteira unicostata</i> Mulsant & Rey, 1852	بق القوغ المطرز، بق اللوز، نمر الحور
<i>Stephanitis pyri</i> Fabricius, 1775	بق التفاحيات المطرز، بق الكمثرى المطرز، البق المطرز، بئر الكمثرى، نمر الاجاص
<i>Urentius abutilinus</i> priesner & Alfieri, 1953	بق الخبازيات، بق نباتات الفصيلة الخبازية، بقة الباذنجان، بقة الخباز
<i>Urentius aegyptiacus</i> Bergevin, 1930	بقة الباذنجان، بقة الباذنجان المصرية
<i>Urentius echinus</i> Distanht, 1903	بقة الباذنجان
<i>Urentius hystricellus</i> Ritche, 1869	بقة الباذنجان

ان من اهم الأمثلة الشائعة لحشرات هذه العائلة ما يأتي:

1- حشرة بق الكمثرى المطرز Pear Lace Bug واسمها العلمي *Stephanitis pyri* (Fabr.).

العوائل الغذائية: اظهرت الدراسات الحديثة ان هذا النوع من البق المطرز يصيب اشجار التفاحيات فقط (الكمثرى والتفاح والسفرجل والزعرور) فقط.

الانتشار والضرر: تنتشر حشرة بق الكمثرى المطرز في معظم دول اوربا مثل البرتغال واسبانيا وفرنسا وبلجيكا وانكلترا والمانيا والنمسا وسويسرا وتشيكيا وسلوفاكيا وبلغاريا وهنغاريا وايطاليا وسردينيا واليونان ورومانيا والسويد وقبرص وتركيا والعراق وسوريا ومصر وفلسطين وإيران وبلاد المغرب العربي. ان الضرر الذي تحدثه هذه الحشرة يتمثل بتغذية حوريات وكاملات الحشرة على السطح السفلي لأوراق التفاحيات وخاصة الكمثرى عن طريق امتصاص عصارة النبات يمثل احد مظاهر الإصابة التي يمكن ملاحظته بسهولة على السطح السفلي لأوراق الكمثرى فضلا عن وجود براز الحشرة الذي يكون بشكل قطرات بنيه اللون ذات قوام لزج وقد تضع الانثى احيانا بيضه واحدة في بعض القطرات البرازية ان استمرار تغذية الحوريات والكاملات وبشكل متجمع على السطح السفلي للأوراق يؤدي الى ظهور بقع بيضاء على السطح العلوي للأوراق المسامية وذلك مقابل منظمة التغذية الجماعية للحشرة وذلك نتيجة استهلاك الكلوروفيل ومع تقدم واشتداد الإصابة يتحول لون تلك البقع الى اللون الاصفر ثم البني وتساقط الاوراق المصابة اخيرا.

تاريخ الحياه Life History :- تقضي هذه الحشرة فترة بياتها الشتوي على شكل حشرات بالغه تحت قلف الاشجار والاوراق المتساقطة او على شكل بيض مغروز في الاوراق المتساقطة في المناطق الباردة من العالم . مع بدأ موسم النشاط وتفتح اوراق التفاحيات تبدأ اناث التشتية بوضع البيض وذلك بغرزه في انسجة الورقة النباتية، البيضة تكون ذات شكل بيضوي متطاوول ولونها اصفر فاتح وتبدو متوسطة قليلا في مكان غرزها بالنسيج النباتي ولا يظهر من البيضة المغروزه سوى غطاءها الدائري ذي اللون الاسود يتراوح

طول البيضة بين 0,35 - 0,4 ملم بينما يتراوح عرضها 0,1 - 0,12 ملم تضع الانثى خلال فترة حياتها بحدود 100-160 بيضة/ انثى ويفقس البيض خلال 8-11 يوم، ان عدد البيض للأنثى وفترة حضانة البيض ونسبه الفقس تتباين تبعا لنوع العائل الغذائي والظروف البيئية السائدة من درجات الحرارة والرطوبة ورقم الجيل خلال موسم النشاط. يفقس البيض عن حوريات العمر الاول الصغيرة حيث يكون لونها شفافة بداية كل عمر حوري، وتمتاز الاعمار الحورية بوجود بقعه سوداء على الجهة الظهرية للبطن والعيون المركبة بارزة على جانبي الرأس احمر فاتح، شكل العمر الحوري الاول والثاني يكون أسطواني فيما تكون الاعمار الحورية اللاحقة بيضوية الشكل تماما.

للطور الحوري 29 شوكة تتوزع على مناطق الجسم حيث توجد خمسة منها على الجهة الظهرية للرأس و8 اشواك على الصدر (شوكتان على كل جانب واربعه على الجهة الظهرية للصدر) و16 شوكة على البطن (6 على كل جانب و4 على الجهة الظهرية للبطن) للطور الحوري اربعة نسلاخات و5 اعمار حورية وتتراوح فترة الطور الحوري 12-20 يوم وبلغ متوسط طول جسم الاعمار الحورية من الاول الى الخامس 0,53 و0,72 و0,95 و1,24 و1,7 ملم على التوالي. الحشرة الكاملة للبق المطرز تختلف كليا في المظهر الخارجي عن الطور الحوري حيث تبدو صغيرة ومسطحة في بداية بزوغها، العيون المركبة ذات لون احمر فاتح ولون الجسم اصفر فاتح، قرنا الاستشعار من النوع الصولجاني وقرن الاستشعار يتكون من أربع عقل والعقلة الثالثة هي الاطول واجزاء الفم من النوع الثاقب الماص وتشبه الخرطوم الطويل الذي يستقر بين حرقفتي الزوج الثاني والثالث من الارجل، تتميز الأجنحة الأمامية

وكذلك امتدادات الصدر الامامي بوجود خلايا كثيرة متباينة الاشكال والمساحات وبذلك تبدو الاجنحة مطرزة. ان متوسط طول الحشرة الكاملة 2،14 ملم ومتوسط عرضها 0،98 ملم. لحشرة بق الكمثرى المطرز 6 اجيال في السنة وان الجيل الرابع على الكمثرى والجيل الثاني على التفاح هما أكثر الاجيال ضرراً على التفاحيات.


2- بق زهرة الشمس المطرز Sun flower Lace Bugs

يصاب محصول زهره الشمس في العراق بنوعين من البق المطرز اللذان يعودان لعائله Tingidae هما:

أ- *Galeatus scrophicus saunders*

ب- *Galeatus helianthi Ond & Lod*

علما ان الشائع سابقا هو اصابه محصول زهره الشمس بالنوع *Stephanati* (Fab.) *pyri*، ان الاختلاف الوحيد بين النوعين السابقين هو عدد خلايا الامتداد الغشائي للصدر الـ *Paranota* حيث تكون اربعة خلايا في النوع *G.scrophicus* وخمسه خلايا في الـ *G.helianthi* وتتميز كاملات كلا النوعين بوجود انتفاخين على الخط الوسطي لترجه الصدر الامامي *Pronotum* والانتفاخ الخلفي اكبر من الامامي والرأس ذو خمسه اشواك طويله ومدببة (الشكل 5 - 4).



الشكل (4-5) التمييز بين نوعي البق المطرز من خلال عدد خلايا الامتداد الغشائي لجانبي الصدر

النشاط الموسمي لنوعي البق المطرز على زهرة الشمس

Seasonal activity of sunflower Lace bugs

بدأت بالغات الحشرة بالظهور على نباتات زهرة الشمس وبأعداد قليلة نسبياً في النصف الأول من نيسان عندما كان معدل درجة الحرارة والرطوبة النسبية

14.3 - 15.22 م و 61.26 - 69.74 % لموسمي 96 و 1997 على التوالي وقد وصلت اعداد الحشرات ذروتها في شهر تموز ومن الجدول (5-7) يتبين ان اعداد الحشرات بقيت مرتفعة نسبيا خلال حزيران واب وايلول مما يشير الى ان هذه الفترة تعتبر مناسبة جدا للتكاثر كذلك فان اعداد الحوريات والبالغات كانت متقاربة نسبيا خلال شهري تموز وايلول بعد ذلك بدأت اعداد الحشرات بالتناقص لتختفي نهائيا في الاسبوع الاخير من تشرين الثاني كما اظهرت نتائج دراسة الارتباط بين اعداد الحشرات ومعدل درجات الحرارة والرطوبة النسبية خلال فترة الدراسة وجود ارتباط موجب ومعنوي قيمته (0.77) و (0.84) مع الحرارة وارتباط وغير معنوي مع الرطوبة النسبية قيمته (63.0) و (0.59) فيما بلغت قيمة الارتباط المشترك لعاملي الحرارة والرطوبة النسبية (+0.71) و (+0.69) لموسمي 96 و 1997 على التوالي وهو ارتباط معنوي يدل على وجود علاقة محددة بين اعداد الحشرات والحرارة والرطوبة النسبية كما اظهرت نتائج التحليل الاحصائي وجود فروقات معنوية عند مستوى احتمال 1% في اعداد الحوريات والبالغات بالنسبة لجزء النبات وسطح الورقة حيث بلغ متوسط اعداد الحوريات والبالغات 226.7 و 106.5 على الجزء القاعدي والقمي للنبات على التوالي وان الحشرات كانت تفضل السطح السفلي للأوراق حيث بلغ متوسط اعداد الحشرات 198.94 و 184.27 لكل من السطح السفلي والعلوي على التوالي (جدول 5-8). كما اظهر التحليل الاحصائي عدم وجود فروقات معنوية في اعداد الحشرة بالنسبة لصنفي زهرة الشمس الا ان الحشرات كانت تفضل الصنف الوحيد الزهرة على الصنف متعدد الازهار، حيث بلغ متوسط اعداد الاطوار المتحركة 194.7

و188.5 على التوالي وربما يرجع ذلك الى اوراق الصنف وحيد الزهرة اكبر مساحة فضلا عن احتوائها على العديد من الطيات التي توفر حماية افضل لأطوار الحشرة، ومن الجدول (5-9) يتبين ان البالغات تشكل المجموع السكاني للحشرة في شهر نيسان مما يشير الى ان هذه الحشرة تقضي فترة الشتاء بشكل حشرات بالغه وفي شهر ايار يبدأ طورا البيضة والحورية بالظهور بشكل واضح فيما تناقصت اعداد البالغات نتيجة الموت، وخلال الفترة من حزيران ولغايه تشرين الاول لوحظ وجود تذبذب في اعداد الاطوار المختلفة مع وجود تقارب نسبي واضح في اعداد الحوريات والبالغات في شهري تموز وايلول ومع حلول شهر تشرين الثاني بدأت اعداد البالغات بالزيادة على حساب طورى البيضة والحورية نتيجة توقف البالغات عن وضع البيض، كما يتضح من الجدول السابق ان النوع *G.scrophicus* Saund يشكل 67.6% من مجموع السكان مقارنة بالنوع *G.helianth* O & L. الذي احتل 32.3%، كما يتبين ايضا ان هناك زيادة في نسبة الاناث من بداية ونهاية موسم النشاط حيث بلغت النسبة الجنسية 2.5 : 1 (انثى : ذكر) في النوع *G.scrophicus* Saund و 1:4 في النوع *G.helianthi* O&L. لتصبح بعد ذلك 1.17 : 1، 2.2 : 1 في نهاية الموسم ولكلا النوعين على التوالي فيما تقاربت النسبة الجنسية كثيرا خلال اشهر حزيران وتموز واب، وقد بلغت نسبه الاناث 58.7% من مجموع البالغات في النوع *G.scrophicus* Saund فيما بلغت هذه النسبة 60.1% من مجموع البالغات من النوع *G.helianth* O&L وهذا يتفق مع ما وجدته (Verma et al 1974) في

حشرات نصفية الأجنحة الضارة بالنباتات الاقتصادية

الهند من ان الاناث كانت تشكل 57.5% من بالغات النوع *G.scrophicus*.Saund

الجدول (5-7) المعدلات الشهرية لحوريات وبالغات البق المطرز على صنف زهرة الشمس خلال موسم 96 و1997

المجموع الكلي	الأصناف						الطور الحشري	الاشهر
	متعدد الازهار			وحيد الزهرة				
	المجموع	المعدل	المدى	المجموع	المعدل	المدى		
96	50	25	صفر-50	46	23	صفر-46	حورية	نيسان
262	132	66	75-57	130	65	75-55	بالغه	
368	216	108	111-105	152	76	96-56	حورية	أيار
71	31	15.5	صفر-31	40	20	38-2	بالغه	
373	179	89.5	110-69	194	97	124-70	حورية	حزيران
173	86	43	54-32	87	43.5	49-38	بالغه	
293	145	72.5	106-39	148	74	114-34	حورية	تموز
278	137	78.5	69-68	141	70.5	71-70	بالغه	
323	157	78.5	108-49	166	83	118-38	حورية	اب
160	72	36	46-26	88	44	58-30	بالغه	
263	129	43	57-26	134	44.6	55-31	حورية	ايلول
236	117	39	55-19	119	39.6	58-18	بالغه	
51	26	13	17-9	25	12.5	15-10	حورية	تشرين اول
175	113	56.5	60-53	62	31	38-24	بالغه	
2	صفر	صفر	صفر	2	1	صفر-2	حورية	تشرين الثاني
141	82	41	47-35	59	29.5	33-26	بالغه	

الجدول (5-8) تأثير الصنف وجزء النبات وسطح الورقة في اعداد الاطوار

المتحركة للبق المطرز

متوسط اعداد الاطوار المتحركة للبق المطرز							المعاملات وتداخلاتها	
للطور	للصنف	التداخل بين الطور والصنف	جزء النبات					
			قمة سطح الورقة		قاعه سطح الورقة			
			علوي	سفلي	علوي	سفلي		
أ226،7	أ194،7	أ230	204	243	232	241	وحيد الزهرة	حوريات
ب156،5		أ223،5	211	218	229،6	235،3	متعدد الازهار	
	أ188،5	ب159،5	152،6	160،3	148	177	وحيد	بالغات
		ب153،5	144	162	153	153،3	متعدد الازهار	
			أ177،9	أ195،8	أ190،6	أ202،8	التداخل بين جزء النبات وسطح الورقة	
			ب184،1	أ205،3	ب184،1	أ205،3	وحيد الزهرة	التداخل بين الصنف وسطح الورقة
			ب184،4	أ192،5	ب184،4	أ192،5	متعدد الازهار	
			ب184،2	أ198،9	ب184،2	أ198،9	المعدل لسطح الورقة	
					أ219	أ234،5	حورية	التداخل بين الطور وجزء النبات
					ب154،7	ب158،2	بالغه	
					أ190	أ199،5	وحيد الزهرة	التداخل بين الصنف وجزء النبات
					أ183،7	أ193،2	متعدد الازهار	
					ل186،8	أ196،3	المعدل لجزء النبات	

الجدول (5-9) التركيب السكاني لنوعي البق المطرز على نبات زهرة

الشمس خلال موسمي 96 و1997

التركيب السكاني لنوعي البق المطرز										الاشهر
التركيب النوعي والجنسي						عدد الحشرات المختبرة	التركيب العمري			
<i>G.helianthi</i>			<i>G.scrophicus</i>				بالغه	حورية	بيضه	
مجموع	انثى	ذكر	مجموع	انثى	ذكر					
10	8	2	15	11	4	25	46	0	0	نيسان
12	8	4	18	11	7	30	38	102	48	ايار
15	8	7	27	27	12	42	56	153	106	حزيران
12	7	5	25	25	13	37	95	107	93	تموز
21	10	11	32	32	15	53	72	91	134	اب
19	11	8	41	41	17	60	135	154	83	ايلول
13	8	5	32	32	13	45	82	163	64	تشرين الاول
16	11	5	57	57	21	73	101	53	13	تشرين الثاني

تاريخ الحياه Life History:- بدأت الاناث بوضع البيض بعد مرور 2-3 أيام بمعدل 2.4 يوم من التزاوج النوع *G.scrophicus* Saund فيما تراوحت فتره ما قبل وضع البيض في اناث النوع *G.helianth* O&L. بين 3-5 أيام بمعدل 3.8 يوم، تضع الاناث البيض مغروزا في نسيج الورقة النباتية ولا يظهر منها سوى غطائها الدائري ذي اللون الاسود والحافة المرتفعة قليلا والتي تحيط بالغطاء المذكور حيث وضعت اناث النوع *G.scrophicus* Saund عدد من البيض يتراوح بين 85 - 183 بيضه بمعدل 143.1 بيضه فيما بلغ عدد البيض لإناث النوع *G.helianthi* O&L. بين 57-121 بيضه بمعدل 101.7 بيضه وبلغ معدل فقس البيض 91.2، 87.6% في

حشرات نصفية الأجنحة الضارة بالنباتات الاقتصادية

الجدول (5-10) يتبين ان فترة حضانة البيض والاطوار المختلفة كانت بشكل عام اقصر في *G. scrophicus* مقارنة بالنوع *G. helianthi*، حيث تراوحت فترة الجيل بين 47-56 يوما بمعدل 51.1 ± 1.4 يوم ولعل هذا يفسر سبب تفوق اعداد النوع *G. scrophicus* على النوع الثاني، فيما بلغت نسبة الحوريات التي نجحت في الوصول الى الطور البالغ 61.3 و 52.9 % لكل من الـ *G. scrophicus* Saund والـ *G. helianthi* O&L. على التوالي وفي دراسة لـ Verma وجماعته (1974) للنوع *G. scrophicus* Saund تحت ظروف المختبر وجدوا ان للحشرة خمسة اعمار حورية وان نسبه نجاح الحوريات في الوصول الى الطور البالغ بلغت 56.8%.

الجدول (5-10) معدل فترات الاطوار المختلفة لنوعي البق المطرز تحت ظروف الحقل

مدة الطور / الأيام				الطور الحشري
<i>G. helianthi</i>		<i>G. scrophicus</i>		
المعدل + S . E	المدى	المعدل + S . E	المدى	
0,36 + 9,4	11-8	0,42+8,57	10-7	البيضة
0,3 + 3	4-2	0,1 + 2,27	3-2	حورية عمر اول
0,28 + 3,28	4-2	0,2 + 2,57	3-2	حورية عمر ثاني
0,14 + 2,14	3-2	0,2 + 1,57	2-1	حورية عمر ثالث
0,14 + 4,14	5-3	0,28 + 2,71	4-2	حورية عمر رابع
0,28 + 4,71	6-4	0,28 + 3,71	5-3	حورية عمر خامس
0,68 + 26,71	30-25	1,07 + 22,2	25-19	الطور الحوري
0,94 + 28,57	31-25	0,67 + 22,8	25-21	الذكر
0,64 + 33,71	35-30	0,66 + 29,3	32-27	الانثى

ادارة حشرات البق المطرز

Lace Bug Insect Management

لاحظنا مما سبق عدم وجود اعداء حيوية كفؤة تعمل على خفض اعداد سكان البق المطرز وذلك لما تمتلكه تلك الحشرات من دفاعات، فضلا عن ان الاعداء الحيوية التي تهاجمها هي في الغالب مفترسات عامة مثل الدعاسيق والبق السفاح والبق القرصات والعناكب القافزة وانواع من اللحم المفترس ويرقات اسد المن، لذلك فان ادارة حشرات البق المطرز لخفض اعدادها الى ما دون الحد الاقتصادي الحرج يمكن ان يتم من خلال اعتماد ما يأتي:

- 1- الحزمة الجيدة للمحصول: تهدف هذه العملية الى انتاج نباتات قوية ونشطة تستطيع تعويض العصارة النباتية التي تمتصها حشرات البق المطرز ويمكن تحقيق ذلك من خلال ما يأتي:
 - أ- الري المنتظم والتسميد الكيميائي المناسبين لكل نوع من المحاصيل التي قد يهاجمها البق المطرز
 - ب- حماية الجذور من درجات الحرارة المنخفضة خاصة جذور الاشجار وذلك بإضافة الاسمدة العضوية المناسبة.
 - ت- ازالة الادغال المنافسة والتي تعد عوائل ثانوية للبق المطرز
 - ث- التقليم الصحيح والمناسب لتنشيط وتحفيز النمو الجيد للأشجار
- 2- زراعه الاصناف المقاومة والمتحملة للإصابة بحشرات البق المطرز
- 3- حماية الاعداء الحيوية من خلال توفير الملاجئ المناسبة لها في الحقل فضلا عن استخدام المبيدات قليلة الضرر على الاعداء الحيوية.
- 4- المكافحة الكيميائية: يفضل استخدام المبيدات عند وصول اعداد الحشرة الى الحد الاقتصادي الحرج لمنعها من الوصول الى مستوى الضرر الاقتصادي من خلال استخدام المبيدات سريعة التدهور والمتخصصة.

خامسا) عائلة البق الناصع Scutellaridae

المقدمة :- سميت حشرات هذه العائلة بعائلة البق الناصع لان العديد من انواعها ذات الوان زاهيه براقه وان بعض انواعها تعد من بين اكثر الحشرات روعه بألوانها كما تسمى حشرات هذه الحشرة بالبِق المدرع Shield bugs وذلك اشاره الى اللوحة الظهرية Scutellum الواسعة والتي تغطي منطقة البطن بالكامل. حشرات هذه العائلة ذات احجام متوسطة حيث يتراوح طول حشرات البالغة ما بين 5-20 ملم هذه العائلة كانت قبل عام 1970 تحت عائلته تعود لعائلته Pentatomidae. تضم هذه العائلة ما يقرب من 450-500 نوع تعود لما يقرب من 80 جنس تنتشر في المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية وجميعها نباتيه التغذية Phytophagous الا ان عددا قليلا من انواعها سجل كافات زراعيه خاصة الانواع التي تعود للجنس *Eurygaster* spp. ان فهم الجوانب البيئية والحياتية لهذه العائلة يمكن استنتاجه من خلال الشرح التفصيلي لحشرة السونه.

حشرات عائلة البق الناصع في الوطن العربي

من الجدول (5-11) يتبين ان هناك 6 انواع من عائلة Scutellaridae تعد افات مهمة وتعود جميعها للجنس *Eurygaster* الجدول (5-11) الاسماء العلمية والعربية الشائعة لحشرات البق الناصع من عائلة Scutellaridae في الوطن العربي

الاسماء العلمية	الاسماء العربية الشائعة
<i>Eurygaster austriaca</i> Schrank, 177	السونة

<i>Eurygaster hottentota</i> Fabricius, 1775	السونة
<i>Eurygaster integriceps</i> puton, 1881	بقعة الزرع، بقعة السونة، السونة، فاسياء الحنطة
<i>Eurygaster maura</i> Linnaeus, 1758	السونة، سونة ماورس
<i>Eurygaster spp</i>	بقعة صن، بقعة القمح المدرعة
<i>Eurygaster testudinaria</i> Geoffroy, 1758	السونة

حشرة السونة Sunn insect

واسمها العلمي *Eurygaster integriceps* Puton

الانتشار والاهمية الاقتصادية

Distribution and Economic Importance

تعد السونة *Eurygaster integriceps* من اكثر الانواع اهمية حيث توجد ما بين خطي العرض 28 و 55 وخطي طول 10 غرباً الى 60 شرقاً كما تعد من الآفات الخطيرة على محصول الحنطة وبدرجة اقل على الشعير وذلك في بلغاريا، رومانيا، اليونان، تركيا، جنوب غرب اسيا، وبشكل خاص في الشرق الاوسط (سوريا، لبنان، الاردن، العراق، ايران) افغانستان وكذلك في العديد من الاقطار المستقلة في جنوب غرب الاتحاد السوفيتي السابق والتي يعد فيها محصولي الحنطة والشعير من المحاصيل الرئيسية ومن المصادر الرئيسية لغذائها، تهاجم السونة العديد من النباتات البرية للعائلة النجيلية Gramanaceae مثل *Agrostis bromous*، *Dactylis*، *festuca*، *Poa* و *lolium*، وفي حالة غياب هذه النباتات فان السونة قد تتغذى وتتكاثر

على نباتات الحبوب المزروعة وبشكل خاص على كلا الزراعتين الجافة والمروية من نباتات الحنطة. وقد وجد ان هناك أكثر من 15 نوع تعود لـ 8 الى 9 عوائل من غير نباتات العائلة النجيلية يمكن مهاجمتها من السنونة. كما ان هذه الحشرة قد تكيفت للمعيشة على أكثر من 15 نوع من اصناف الحنطة المختلفة هذا فضلاً على عدداً من الانواع البرية من النباتات النجيلية مثل *Heterantheium pliliferum* (banks and soland).

تاريخ الحياة Life history: - تعد حشرة السنونة من الحشرات وحيدة الجيل Univoltine فضلاً عن وجود فترة سبات اجبارية تمر بها الحشرة خلال حياتها تقسم دورة حياة هذه الحشرة الى فترتين فترة نشطة Active واخرى غير نشطة Passive، تبدأ الفترة النشطة في اوائل الربيع وعندما تكون درجات الحرارة بحدود 18 مئوية حيث تغادر السنونة مواقع سباتها الشتوي مهاجرة الى الحقول، تستغرق هذه الفترة عادة من 5،2 الى 3 اشهر. حيث تمارس الحشرة خلالها التزاوج ووضع البيض ثم نمو وتطور اطوارها غير البالغة على نباتات الحنطة والشعير او غيرها من العوائل التابعة لعائلته النجيليات، كما تختلف الفترة الزمنية اللازمة لإكمال كل طور من اطوارها وذلك استنادا الى العديد من العوامل وخاصة العوامل الجوية كما يعد العامل الغذائي مع العوامل الجوية مهمة ودرجة في تطور ونمو كل من البيضة والعمر الحوري الاول وبالتالي استمرار نموها للعمر الثاني وحتى البالغات، هذه الحشرة قد تأقلمت او تكيفت في مدى واسع من الظروف المناخية (ما بين خطي 28 و 55) تكون البالغات والحوريات في قمة نشاطهما في درجات الحرارة العالية حيث تتغذى وبكثافة على السيقان والاوراق وكذلك وبشكل خاص على سنابل Ears هذه

العوائل مما يؤدي الى موت النباتات المصابة ومع نهاية هذه الفترة النشطة فان البالغات الحديثة تقوم بالهجرة الى المناطق ذات خط العرض الاعلى حيث تهاجر الى الجبال حيث تقضي فترة من الراحة عند درجات الحرارة المنخفضة اما فترة السكون من حياه الحشرة فتبدأ من منتصف الصيف ولغايه اوائل الربيع المقبل والتي تستغرق حوالي 9 اشهر والتي تسمى او تعرف ب- Estivation – Hibernation او فترة عبور الشتاء Overwintering ففي الاشهر الحارة او الجافة من نهاية الصيف والخريف فان هذه الحشرة تدخل في صيف Estivates على النباتات او تحتها وعند درجات العالية من خط العرض at High Altitudes وقبل انخفاض درجات الحرارة تقوم هذه الحشرة بالهجرة والانتقال الى اماكن سباتها الشتوي وهذا غالبا ما يحدث في المنحدرات تحت الاعشاب والاوراق الميتة خلال اشهر الخريف والشتاء وان حشرات البق هذه تتحرك بشكل جزئي خلال سباتها الصيفي في حين تكون ساكنه وغير فعالة بشكل كامل خلال سباتها الشتوي وان هذه الحشرات تستخدم مخزونها من الدهون خلال فترتي سباتها الصيفي والشتوي. يمتاز السبات بتوقف التكاثر والانخفاض في الاجسام الدهنية ووزن الحشرة وبشكل تدريجي حيث يصل حده الادنى وذلك بعد نزول الحشرات الى الحقول في الربيع. ان محاولات كسر ظاهرة السبات قبل مجيء الشتاء او في بداية الشتاء لم تنجح او باءت بالفشل. ان افراد الجيل الجديد يبلغ جنسياً وذلك بعد خروجه من السبات في اوائل الشتاء وتظهر البالغات في حقول الحنطة والشعير بعد عبورها الشتاء حيث تتواجد في هذه الحقول من شباط ولغايه نيسان من كل سنة. حيث تتغذى خلال الساعات الدافئة من اليوم (تكون الحرارة فوق 10م

الى 12 م) بعد 1-4 اسبوع يحدث التزاوج ووضع البيض (حيث درجات الحرارة اكثر من 50م) هذه الحشرة تتزاوج ول 5-10 مرات خلال حياتها ولكن الاناث تنتج تقريبا نفس العدد من البيض سواء التقت الانثى بالذكر لمرة واحدة او عدة مرات، كما ان النسبة الجنسية عادة تبلغ 1:1، هناك العديد من البيانات التي تشير الى خصوبة هذه الحشرة والتي اشارت الى ارتباط هذه الخصوبة وبشكل كبير بالغذاء وبدرجات الحرارة والرطوبة النسبية، كذلك وجدت ان خصوبة وطول عمر هذه الحشرة كانت اعلى بكثير عند تغذيتها على الحبوب المروية او المجهزة بالماء من تلك التي تتغذى على النسيج الخضري Vegetative tissues، كذلك وجد ان الخصوبة كانت اعلى قليلا لهذه الحشرات عند تغذيتها على الحبوب والافرع الخضراء لنباتات الحنطة مقارنة مع نباتات الشعير وهذا يفسر سبب مهاجمة هذه الحشرات لنباتات الحنطة غالبا بالرغم من وجود نباتات الشعير قريبة منها. حيث بلغت خصوبة اناث هذه الحشرة على حبوب الحنطة وبوجود الماء 190-200 بيضة للأنثى الواحدة في حين بلغت 180-185 بيضة على حبوب الشعير وبوجود الماء وان هذه الخصوبة انخفضت الى النصف وذلك عند تغذيتها على الافرع الخضراء لنباتات الحنطة والشعير وذلك تحت نفس الدرجات الحرارية (27-28م). تضع هذه الحشرة بيضها على شكل دفعات او مجاميع كل مجموعة تتكون من 14 بيضة مرتبة في 2-3 صف تكون ملتصقة مع بعضها على الاوراق ونادرا على السيقان او على التربة وان سلوكية وضع البيض هذه تختلف في الانواع الاخرى من حشرات السونة، تستغرق فترة حضانة البيض من 10-20 يوم في الحقل، يفقس البيض خلال النهار حيث تتجمع الاعداد

الحورية الاولى حول او على البيض الفاقس (غلاف او قشرة البيض) وفي اليوم الاخير للعمر الحوري الثاني تتحرك هذه الحوريات لتنتقل الى السنابل Ears وان فترة الطور الحوري (بإعمارها الخمسة) بلغ 45-60 يوم وذلك استنادا الى درجات الحرارة السائدة وتوفر الغذاء وتظهر صغار الجيل من نهاية ايار ولغايه منتصف او نهاية تموز ويتم عادة التمييز بين الاعداد الحورية وذلك استنادا الى قاعدتي الحجم ومدى نمو وتطور الاجنحة ومن الطبيعي جدا ملاحظة الاعداد الحورية 2-5 وهي تتغذى على السنابل ears على الرغم من وجودها ايضا متغذية على الاوراق والسيقان وان التغذية الشديدة تحدث من العمر الثالث وبشكل خاص خلال العمر الخامس وبالغات الحديثة وتظهر بالغات الجيل الجديد في حزيران وتموز ولديها مخزون عال من الطاقة حيث يزداد وزن الاناث من 110 ملغم - 145 ملغم - 155 ملغم وان مخزونها من الدهون بحدود 36-42% من وزن جسم الاناث و 32 - 38 % في الذكور كما ان بإمكان هذه الحشرات ان تخزن ما يكفيها من الطاقة او الغذاء وذلك خلال عشرة ايام تقريبا وذلك عند توفر الغذاء في الظروف الجوية المفضلة بينما قد تستغرق هذه العملية 3 اسابيع في الاجواء الممطرة وعند انخفاض درجات الحرارة. تعيش وتتغذى هذه الحشرة في حقول الحنطة والشعير المتواجدة على ارتفاعات منخفضة نسبيا (1000-1200م) وذلك في الربيع وبداية الصيف وفي نهاية الصيف تغادر البالغات الحديثة هذه المناطق حيث تتراوح درجات الحرارة من 25-43 م لتهاجر قاطعه مسافة من 10-50 كم لتصل الى مناطق اكثر ارتفاعا (2000-2500م) حيث تكون درجات الحرارة اكثر برودة (15-30 م) وعلى هذه المرتفعات تقضي سباتها

الصيفي على او تحت اشجار الغابات Bushes وذلك للفترة من تموز الى تشرين الاول وقبل ان تتحرك (بالطيران او المشي لمسافات قصيره) الى المناطق الاقل ارتفاعا (1700-1900م) وذلك في تشرين الثاني حيث تقضي فتره سباتها الشتوي وخلال هذه الفترة (عبور الشتاء) فأنها تستهلك تقريبا 25% من مخزونها من الدهون فضلا عن موت ما يقرب 10-30 % من اعدادها وان نسبة الموت قد تصل الى اكثر من 50% عند انخفاض درجات الحرارة بشكل كبير وخاصة قبل هجرتها الى الحقول.

ان حركه هذه الانواع من الاناث صعودا ونزولا من مناطق تكاثرها الى الجبال ثم رجوعها الى الحقول تعرف بسلوك الهجرة الاجباري والذي يوصف على انه نوع من صمام الامان والمرتبب بالتغير في متطلبات او احتياجات هذه الحشرات. ولكن في بعض المواقع مثل مناطق وسط العراق ومنطقة ديار بكر في شرق تركيا وفي جنوب وسط إيران فان حدوث هذه الهجرة او الانتقال قد لا يحصل او يحصل بشكل قليل. كما وانه من الملاحظ ان هناك بعض الافراد التي تبقى في الجبال كمجاميع مستقرة بدل ان تتحرك نزولا الى المناطق السهليه في الربيع وان هذا الجزء من السكان غير المهاجر مفيد جدا للأنواع حيث يشكل حارسا وحاميا لهذه الانواع المهاجرة عند تعرضها للظروف الغير ملائمة ومنها تعرضها للضغط الانتخابي للمبيدات المستخدمة في الحقول ويعد صمام امان لاستمرار وجود هذه الانواع وكذلك تؤخر من ظهور السلالات المقاومة للمبيدات المستخدمة.

الضرر ومظهر الإصابة:- تعد الخسائر في المحاصيل الغذائية والنااتجة عن مهاجمة حشرة السونة *E.integriceps* وفي جميع الاقطار التي تتواجد فيها

كبيرة جدا وباستثناء تركيا فان هناك عجز ما بين الانتاج والاستهلاك وان هذه الحشرة قد تكيفت لمدى واسع في سلوكياتها مما ادى الى اختلافات في دورة حياتها وسلوكها في المناطق التي تتواجد فيها، (من 28 ولغاية 55 من درجات العرض Latitude). ويتركز معظم الضرر الحاصل لنباتات الحنطة في منطقة برعم البذرة Seed bud والذي يعمل على فشل تكوين وانبات هذه البذور وان البذور نفسها تصبح اكثر امتصاصا للماء كما تصبح الحبوب المتضررة من مهاجمة هذه الحشرة اكثر في محتواها من النيتروجين الذائب في الماء (وذلك بسبب النقص او الانخفاض في محتواها من glutenin، Gladin،) وان هذه النسبة العالية من النيتروجين تؤدي الى حدوث نشاط انزيمي عالي اكثر مما يحدث في الحبوب الاعتيادية.

control

المكافحة

1-) المكافحة الكيميائية:- هناك العديد من المركبات الكيميائية التي تم استخدامها ضد حشرة السونة Sunn pest وحاليا فان المركبات الفسفورية العضوية مثل الليباسيد Lebaycid وسوميثون 50% قد اعطيت لها الاولوية في هذا المجال حيث ان استخدام المركبات الكيميائية ذات الاثر المتبقي الطويل الامد يقودنا الى تطور للمقاومة خفيف وذلك في الاعمار الحورية الرابع والخامس لهذه الحشرة ومع ذلك فان هناك العديد من المركبات الكيميائية الحديثة التي هي الان قيد الدراسة والبحث. ان تحديد الوقت المناسب مهم جدا ويجب اخذه بنظر الاعتبار لأهميته في خفض تكاليف المكافحة وعدد مرات الرش فضلا عن حصولنا على نتائج أكثر تأثيرا وفعالية وان هذا القرار سوف يقودنا كذلك الى ان يكون استخدام المبيدات أكثر

عقلانية والحفاظ على الاعداء الحيوية لهذه الحشرة. وعلى هذا الاساس فان معاملة واحده يجب اجرائها وذلك ضد الحشرات الخارجة من التشتية وقبل وضعها للبيض واذا كان لابد فمعاملة اخرى عند ظهور الاعداد الحورية الثانية، ان ظهور بالغات الحشرة المتشتية في الحقل يكون خلال 1-4 اسابيع في حين ان تأثير المعاملة بالمبيدات سوف يكون فقط فعالا او مؤثرا لعشرة ايام تقريبا وعند وصول اعداد الحشرة الى الحد الاقتصادي الحرج يمكن اجراء معاملتين الاولى وذلك عند وصول اعداد البالغات الخارجة من التشتية اكثر من فرد واحد / م² والتي عادة تصادف نهاية المرحلة التيليه Tilleringstage (مرحلة التفرعات) لنباتات الحنطة والشعير اما المعاملة الثانية فعندما تكون الاعداد 3-5 حورية / م² (العمر الثاني وقليل من العمر الثالث) والتي تصادف تقريبا وقت التزهير وبداية امتلاء الحبه وهذا سوف يقلل من اعداد كل من الاعداد الحورية المبكرة ومن البالغات المهاجرة للتشتية. كما يمكن تأخير اجراء المعاملة الثانية وحتى وصول معظم الحوريات (50-60 %) للأعمار الثالثة او الرابعة وحتى الخامسة وعندما تكون نباتات الحنطة في المرحلة الحليبية Milky Stage، ان الفشل في السيطرة على اعداد هذه الحوريات عند هذه النقطة سوف يؤدي الى خسائر مهمه في الحاصل ومن الملاحظات الجديرة بالذكر انه وبسبب عدم تغذية العمر الحوري الاول وكذلك العمر الحوري الثاني في بدايته فان ايه معاملة بالمبيدات خلال هذه الفترة يعد غير ضروريا وان تأثيره يكون طفيفا في خفض اعداد الحشرة وبسبب الاستخدام المكثف للمبيدات فان حشرة السونه اصبحت مقاومه لمبيد Lebaycid ومنذ عام 1975 والمبيد سوميثون منذ العام 1987 حيث ازادت

المساحات المعاملة بالمبيدات ضد هذه الحشرات خلال العشرين سنة الماضية من 50 الف هكتار خلال الاعوام 1968-1970 في كل من ايران وتركيا لكي يصل الى مليون هكتار في ايران و 600 الف هكتار في تركيا وذلك خلال السنوات 1991-1998. في حين وصل في اغلب المناطق (افغانستان، العراق، إيران، الاردن، سوريا وتركيا) الى أكثر من 2 مليون هكتار تعامل موسميا والتي تصل كلفتها التقديرية 42 مليون دولار امريكي. تعد جميع المبيدات الحشرية المستخدمة في مكافحة هذه الحشرة ذات سمية عالية للأعداء الحيوية لهذه الحشرة وخاصة لطفيليات البيض من غشائية الاجنحة حيث انخفضت اعداد هذه الطفيليات وبشكل معنوي في المناطق المعاملة بالمبيدات في كل من إيران وتركيا وذلك خلال الاعوام 1987-1995.

- هناك العديد من **Biological control** (2-) المكافحة الحيوية

الطفيليات التي تعد مهمة في خفض الكثافة السكانية لحشرة السونة حيث تهاجم بالغات هذه الحشرة واحيانا العمر الحوري *E. integriceps* وكذلك Phasiinae من تحت عائله Tachinid الخامس من قبل ذباب (من Scelionidae الطفيليات من غشائية الاجنحة وبشكل رئيسي من عائله والتي Encyrtidae) وكذلك البعض من عائله Telenominae تحت عائله تتطفل على البيوض حيث تلعب طفيليات البيض دورا مهما ومعنويا في اقل اهمية Tachinid مكافحه افات الحبوب هذه، وتعد الطفيليات من ذباب في درجة التطفل من الطفيليات من غشائية الاجنحة وفيما يلي الانواع *Phasia subcoleoptera* المسجلة كطفيليات على بالغات السونة وهي

،*P.oblonga* F. ،*Ectophasia crassipennis* F. *Ectophasia rubra* Jarschner،*Heliozeta helluo* F. ،*Elomyia lateralis* Meigen *Clytiomyia helvola* meigen،*Gymnosoma desertorum* rohd. ،*Helomyia Lateralis* Meigen *Cylindromyia brassicaria* F.

هذه الطفيليات من الذباب تمضي فترة الشتاء على هيئة يرقات من العمر الثالث في اجسام عوائلها وبعد فترة قصيرة من عودة بالغات السونة الى حقول الحنطة تغادر هذه اليرقات (وقد اكتمل نموها) اجسام عوائلها ومن نهاية بطن العائل ثم تعذر في التربة. وتقريبا في جميع الانواع فان الظهور الرئيسي لبالغات هذه الطفيليات من الذباب يكون في الربيع وبعد هجرة العوائل المتطفل عليها الى الحقول ولكن يمكن ان نجد احيانا بعض من العذارى والبالغات الحرة في مناطق التشتية في الخريف والربيع، وتظهر بالغات الذباب المتطفل عادة في نيسان وايار حيث تضع البيض وعادة من 1-6 بيضة / عائل وعلى السطح الظهري للصفحة الامامية Pronotum وعلى الـ Connexivum للبطن وعلى العيون المركبة او على اي جانب من Scutellum ولكنها لا تضعه نهائيا على سطحه الظهري. يفقس البيض بعد 2-4 اسبوع حيث يقوم العمر الاول بالدخول في جسم العائل وان نمو وتطور هذه الاطوار غير البالغة يختلف باختلاف الانواع حيث تتراوح ما بين 26-46 يوماً وحال مغادرة هذه الطفيليات عائلها فان موت هذه العوائل (اي حشرات السونة) هي النتيجة الطبيعية لهذا التطفل. ان درجة التطفل من قبل الطفيليات من ثنائيه الأجنحة تختلف من عام لآخر وباختلاف الحقول، ومع ذلك فان معدل التطفل يتراوح ما بين 7-73%. ان معظم طفيليات البيض من غشائية الاجنحة تعود للأجناس *Haliday*، *Telenomus* و *Trissolcus* وتعد هذه النزنابير

الطفيلية العامل الاكثر اهمية في المكافحة الحيوية للحشرات من عائله Pentatomidae التي تهاجم الحنطة والشعير في الشرق الادنى، الشرق الاوسط، جنوب غرب اسيا و Mediterranean basin (مثل تركيا، اليونان، ايطاليا، المغرب، اسبانيا). وبعد النوع *Trissolcus grandis* الاكثر تأثيرا ونشاط من غيره من الانواع التابعة لهذا الجنس. ويتوفر حاليا كم هائل من المعلومات حول حياته وبيئته وسلوكيه وضع البيض والتكاثر والتطفل والطرق تربيته واكثر طفيليات البيض هذه. وتعد طفيليات Ophagous العامل الاكثر اهمية في المكافحة الطبيعية والت تحدث في مناطق تواجد حشرة السونة يوجد حوالي 15 نوعا من طفيليات البيض التي تم تسجيل مهاجمتها لحشرة السونه وبدرجات تأثير مختلفة وان التطفل تراوح ما بين 10-98 % وان المعلومات المتوفرة حول هذه الطفيليات ازدادت في العقود الخمسة الأخيرة وخاصة ما بين 1970، 1995. ان تربية اعداد وفيرة Mass rearing من طفيليات البيض لغرض اطلاقها في الحقل تم فقط في ايران و ذلك للفترة من 1953 ولغايه 1963 حيث تم اطلاقها وبمعدل 15000 الف زمبور / هكتار وذلك خلال فتره وضع البيض لحشرات السونه وذلك في شهر ايار وبداية حزيران في حقول الحنطة في اصفهان و Waramin وقد تم اطلاق ما يقرب 210 مليون من طفيليات البيض التي اشتملت على *Trissolcus grandis*، *T.vassilievi*، *T.semistriatus*. وذلك في عام 1959 وفي شرق تركيا وتحديدًا في Bingol تم تسجيل مستوى من التطفل على بالغات *E.austriaca* بلغت 73%. ان الدراسات العديدة طويلة الامد لكثافة السكانية لهذه الحشرة وطرق مكافحتها والتي تراوحت ما بين المكافحة الحيوية

والكيميائية تشير الى ان طرق المكافحة هذه لم تكن كافية بدرجة معقولة بسبب ان الانفجارات السكانية الخطرة الاله الحبوب هذه لازالت تحدث، لذلك كانت الحاجة الى طرق اخرى جديدة لاختبارها في مكافحة هذه الحشرة ومن هذه الطرق او البرامج الجديدة والتي تعد حاليا قيد الدراسة واستخدام الفطريات الممرضة للشراة حيث لوحظ موت اعداد من السونة نتيجة لأصابتها بهذه الفطريات وفي مواقع التشتية وذلك في شمال ايران ، شرق تركيا ، رومانيا، روسيا ، وفي الولايات التابعة ل U.S.S.R وان العدد الاكبر من هذه الحشرات الميته كان ناتجا عن الإصابة فقط بـ *Bassiana vuill* و *Beauveria* والذي تم ملاحظته تحت Bushes لنباتات *Artemisia*، *Astragalus* وذلك على ارتفاع 1700 - 2200 متر وبعد هجره البالغات الخارجة من التشتية الى الحقول الغربية.

الفصل السادس

البسلید او قمل النبات القافز

الموقع التقسیمی لفوق عائله Psylloidea

عائله البسلید او قمل النبات القافز Psyllidae

تاریخ الحیاة العام للبسلید

اهم الصفات المظهریة والحیاة لبسلید

انواع البسلید الضاره فی الوطن العربی

بسلید الزيتون

بسلید الفستق

بسلید الكمثری

ادارة حشرات البسلید

الموقع التقسيمي لفوق عائله البسيليد Psylloidea

تعود حشرات البسيليد الى رتبه نصفيه الاجنحة Hemiptera التي تضم

Order : Hemiptera

Sub Order : Sternorrhyncha

Super Fam. : Adelgoidea

Super Fam. : Aleyrodoidea

Super Fam. : Aphidoidea

Super Fam. :Coccoidea

Super Fam. : Psylloidea

Family : Psyllidae

مما سبق يتبين ان فوق عائله البسيليد تشترك مع حشرات المن والذباب الابيض والحشرات القشرية في الانتماء لتحت رتبة Sternorrhyncha التي تمتاز بما يأتي:

- 1- جميع حشرات نباتيه التغذيه.
- 2- اجزاء فمها من النوع الثاقب الماص.
- 3- الرسغ يتكون من عقله واحده او عقلتين والعقلة الطرفية تحمل مخلب واحد او مخلبين.
- 4- معظم حشراتنا تعد متغذيات على اللحاء لذلك فان غذائها يعد غنيا بالكاربوهيدرات (السكريات) وفقيرا بالأحماض الامينية والمركبات النايتروجينية الاخرى لذلك فهي تمتص كمية كبيرة من العصارة النباتية للحصول على احتياجاتها من الاحماض الامينية والسوائل الفائضة تخرجها بشكل ندوة عسلية.

عائلة البسيليد او قمل النبات القافز Psyllidae

حشرات هذه العائلة عالمية الانتشار وتحتوي على ما يقارب الـ 2500 نوع تتواجد في المناطق الاستوائية والمعتدلة ففي بريطانيا يوجد اقل من 100 نوع

وهناك ما يقرب من 300 نوع تم التعرف عليها في أمريكا الشمالية. كحاملات حشرات البسلويد صغيرة الحجم يتراوح طولها بين 2-8 ملم وهي تشبه كثيرا حشرات السيكاذا الصغيرة او قافزات الاوراق الصغيرة الا ان حشرات البسلويد تتميز بقرون استشعارها متعددة العقل وقدرتها على القفز نحو الخلف عند انزعاجها، تتغذى حورياتها وكاملاتها على نباتات ذات الفلقتين الخشبية بامتصاص العصارة من انسجة اللحاء والخشب وبذلك فهي لا تعد متخصصة على اللحاء كبقية حشرات Sternorrhyncha. حوريات البسلويد اما ان تكون حرة المعيشة او تعيش داخل الاورام التي تصنعها او تصنع لها غطاء من مادة عسلية lerp تعيش داخله.

الضرر ومظاهر الإصابة Symptoms and Damage

تهاجم حشرات البسلويد العديد من النباتات ذات الاهمية الاقتصادية مثل الجزر والبطاطا والحمضيات والفسق والكمثرى والافوكادو والتفاح والزيتون والاكاسيا واليوكاليبتوس والقوغ والعديد من شجيرات ونباتات الزينة. تعد حشرات البسلويد بشكل عام من الحشرات محدودة العوائل الغذائية من حيث تخصصها حيث تصيب وبشكل خاص تقريبا النباتات المعمرة من ذات الفلقتين كما تعد هذه الحشرات ناقلات للعديد من المسببات المرضية البكتيرية والفايروسية للنباتات كما تعمل افرازاتها اللعابية على احداث تشوهات على النبات كالأورام والنموات غير الطبيعية فضلا عن الموت الموضعي للانسجة النباتية، واذا اضفنا لذلك افرازاتها من الندوة العسلية وما تسببه للنباتات من اضرار فأننا سنجد انفسنا امام حشرات تشكل افات خطيرة على النباتات التي تهاجمها خاصة عند توفر الظروف المناسبة لنموها وتكاثرها.

تاريخ الحياة العام للبسليد Psyllids General Life History

تتكاثر حشرات البسليد جنسيا وتمر الحشرة بالأطوار الأتية:
بيضة - خمسة اعمار حورية - حشرات كاملة (ذكور واناث) والنسبة الجنسية فيها (1:1) وتضع الانثى البيض اما مغروزا بشكل كامل في النسيج النباتي او توضع البيضة على ساق مغروز في النسيج النباتي والذي يتم من خلاله امتصاص الماء اللازم لنمو الجنين وفقس البيض. تضع اناث حشرات هذه العائلة اعداد متباينة من البيض وذلك تبعا للنوع والعائل الغذائي والظروف البيئية وعليه فان اعداد البيض في انواع هذه العائلة تتراوح بين 15 او أكثر من بيضة/ انثى. لأنواع البسليد جيل واحد في السنة وذلك في المناطق المعتدلة والباردة من العالم فيما يكون لها عدة اجيال في السنة في المناطق الدافئة والاستوائية وعليه فان احتمال حدوث انفجار سكاني لأعداد الحشرات متعددة الاجيال أكثر من الانواع وحيدة او ثنائية الجيل.

اهم الصفات المظهرية والحياتية للبسليد

Some Morphological and Biological Characteristics of Psyllids


لأنواع عائله البسليد العديد من الخصائص المظهرية والحياتية التي يمكن تلخيصها فيما يأتي:

- 1-) ان تمييز انواع البسليد يعتمد بالدرجة الاساس على الذكور ونهاية بطن الانثى فضلا عن امكانية استخدام العمر الحوري الخامس في عملية التمييز.
- 2-) تتشابه الذكور والاناث في المظهر الخارجي الا ان الذكور أصغر حجما عن الاناث فضلا عن اختلافهما في الاعضاء التناسلية وفي شكل نهاية البطن.

3-) الانتشار: يمكن لحشرات البسليد ان تنتقل لمسافات متباينة بواسطة المشي او الطيران كما يمكن لبعضها ان تنتقل لمسافات بعيدة بواسطة التيارات الهوائية.

4-) تتباين سلوكيات التزاوج في الانواع المختلفة من البسليد حيث ان بعض انواعها تطلق اصوات تشبه الصرير لجلب الجنس الاخر فيما انواع اخرى تقوم بحركات استعراضية قبل التزاوج مثل تحريك الاجنحة او الاندفاع كالسهم باتجاه الجنس الاخر.


5-) حوريات بعض انواع البسليد: تكون عارية او مكشوفة في حين تكون حوريات انواع اخرى مغطاة بالإفرازات الشمعية مثل بسليد الزيتون فيما تعيش حوريات انواع اخرى داخل اورام تصنعها بنفسها على النبات العائل وتتباين اشكال الاورام ما بين تجاويف بسيطة على الاوراق الى تراكيب كروية او متطاولة مغلقة بشكل كامل على الحوريات التي تعيش داخلها فيما تعيش حوريات انواع اخرى محيطة نفسها بمادة عسلية Lerp تشبه الندوة العسلية الا انها أكثر لزوجة تفرزها من الصفيحة الشرجية Anal plate وذلك لامتلاكها غرفة ترشيح.



الشكل (1-6) دورة الحياة العامة للفسليد

Psyllid or Lerp - Psyllidae

Hemiptera



الشكل (2-6) اطوار الفسليد المختلفة

انواع البسليد الضارة في الوطن العربي

Injurious Psyllids in Arab World

ان عدد انواع البسليد الضارة المسجلة في الوطن العربي قليله جدا مقارنة بعدد الانواع التي تضمها هذه العائلة وقد يعزي ذلك بالدرجة الاساس الى قلة الباحثين والمختصين في علم الحشرات (الجدول 6-1).

الجدول (6-1) الاسماء العلمية والعربية الشائعة لأنواع البسليد الضارة في

الوطن العربي

الاسماء العلمية	الاسماء العربية الشائعة
<i>Agonoscena targionii</i> lichtenstein, 1874	البسليدا، بسليل الفستق، بسليل الفستق الحلبي، حشرة بسليل الفستق، نطاط الفستق
<i>Agonoscena viridis</i> Baeva, 1936	بسليل الفستق
<i>Cacopsylla bidens</i> Sulc, 1907	بسليل الاجاص
<i>Camarotoscena hoberlandti</i> vondracek, 1963	بسليل التفاف أوراق القوغ
<i>Camarotoscena speciosa</i> Flor, 1861	بسليل اوراق الحور، بسليل اوراق القوغ، بسليل تجعد اوراق القوغ
<i>Diaphorina citri</i> Kuwayama, 1908	بسليل الحمضيات
<i>Euphyllura olivine</i> Costa, 1849	بسليل الزيتون، بسليل الزيتون، حشرة الزيتون الدقيقة، حشرة الزيتون القطنية، قمل الزيتون القافر
<i>Euphyllura straminea</i> Loginova, 1973	بسليل الزيتون، بسليل الزيتون، حشرة الزيتون الدقيقة
<i>Homotoma ficus</i> Linnaeus, 1758	بسليل التين، بسليل التين الخضراء
<i>Psylla aurantiaca</i> Goureau, 1816	برغوث برتقالي
<i>Psylla costalis</i> Flor, 1861	البسيل الصيفي
<i>Psylla mali</i>	البسيل الربيعي، بسليل التفاح، حشرة التفاح الماصة،

Schmidberger, 1836	مصاص التفاح
<i>Psylla oleae</i> Costa, 1849	برغوث الزيتون، بسليد الزيتون
<i>Psylla pruni</i> Scopoli, 1763	بسيلا البرقوق، بسيلا الخوخ
<i>Psylla pyri</i> Linnaeus, 1758	بسيلا الاجاص، بسيلا الاجاص الشائعة، بسيلا الكمثرى الشائعة
<i>Psylla pyricola</i> Forster, 1848	برغوث الكمثرى، بسيلا الاجاص، بسيلا الكمثرى، قمل الكمثرى القافز، مصاص الاجاص، مصاص الكمثرى
<i>Psylla pyrisuga</i> Forster, 1848	بسيلا الكمثرى، بسيلا الكمثرى الكبيرة
<i>Psylla rosae</i> Linnaeus, 1758	ذبابة الجزر، ذبابة الجزر الصدئة اللون
<i>Psylla rubra</i> Blanchard, 1852	برغوث الكمثرى الأحمر

وفيما يأتي عرض لبعض الانواع الشائعة في العراق والبلاد العربية:

1- بسليد الزيتون Olive Psyllid

واسمه العلمي *Euphyllura Straminea* Log، من عائلة Psyllidae وفي تقسيمات اخرى يعود لعائلة Aphalaridae التابعة لفوق عائله Psylloidea.

الانتشار ومظهر الإصابة والضرر

Distribution Syptoms and Damage

سجلت الحشرة في جميع مناطق زراعه الزيتون في العالم حيث وجدت في ايطاليا وفلسطين واريتريا وجنوب افريقيا والمغرب وتونس وليبيا واسبانيا وجنوب تركيا وروسيا وايران وسوريا واليونان والباكستان وتنتشر في العراق في مناطق زراعه الزيتون خاصه في شمال ووسط العراق. يمتاز المظهر العام للإصابة بالحشرة بالإفرازات الشمعية الشبيهة بالكتل البيضاء الصغيرة التي

تظهر على الافرع في بداية شهر آذار وتنتشر حتى تعم جميع اجزاء الشجرة وتظهر الإصابة في أشدها في شهر حزيران وكأن الشجرة مغطاة بالثلج او القطن المندوف وتفرز الحوريات هذه المادة الشمعية في جميع اعمارها فيما عدا العمر الحوري الاول حيث يكون افرازها من الشمع والندوة العسلية قليلا جدا، وتؤدي تغذية الحوريات على عصارة البراعم والزهرة والاوراق الحديثة الى اعاقه نمو الاجزاء المتأثرة. فضلا عن الافرازات العسلية للحوريات التي تمنع حصول عمليه التلقيح للأزهار. حيث لوحظ في العراق ان نسبه عقد الثمار لأزهار لم تصب بالحشرة ولم تغطها الافرازات الشمعية تراوحت بين 25.39%-27.27% بمتوسط 26.33% بينما تراوحت نسبه عقد الثمار للأزهار التي غطتها الحشرة بالإفرازات الشمعية الى حدود اقل من ذلك بكثير اذ تراوحت بين 2.18% - 9.67% بمتوسط 6.34%.

Life Stages Description

وصف اطوار الحشرة

البيضة بيضاوية متطاولة تستدق قليلا عند نهايتها العليا وذات سويق قصير عند قاعدتها. لونها عند بداية وضعها هلامي يميل الى الشفافية تتحول الى لون ابيض مصفر قبل الفقس، يبلغ متوسط الطول 0،356 ملم ومتوسط العرض 0،134 ملم، اما الحورية فشكلها بيضاوي والجسم منضغط من الاعلى الى الاسفل وقرون الاستشعار طويله متقاربة في الطول وهناك شريطان بنيا اللون يمتدان طوليا على الرأس كما تمتد اربعة اشرطة من نفس اللون على الصدر، للحورية خمسة اعمار، الحشرة الكاملة ذات شكل مغزلي اللون اخضر يميل قليلا الى الاصفرار قرون الاستشعار خيطيه، الاجنحة كبيرة تغطي البطن وتزيد طولها لمسافة ربع طول البطن الاجنحة الامامية

الشفافة عليها بقع فاتحه اللون وفي الثلث الاخير للجناح توجد بقعتان كبيران بنيه اللون الاجنحة الخلفية شفافة والتعريق واضح، الذكر اصغر حجما من الانثى وتميل نهاية البطن الى الاستدارة .

Life History

تاريخ الحياة

تضع الانثى البيض في بداية الاسبوع الثاني من شهر تشرين الثاني حتى شهر مايس عند ظهور الاوراق الحديثة او قبل ظهورها بقليل على الاوراق البرعمية وهي بحالة تفتح جزئي بأعداد قليلة نسبيا (في الغالب 6 بيضات على سطح الورقة الواحدة) ويبلغ متوسط ما تضعه الانثى الواحدة من البيض حوالي 100 بيضة. يفقس البيض بعد حوالي اسبوع الى اسبوعين وتتجه الحوريات للتغذية على البراعم الزهرية ويسبب هذا الجيل اهم الضرر وتستمر طور الحورية حتى العمر الحوري الخامس الذي يوجد في الفترة من نهاية شهر اذار وحتى الاسبوع الاول من شهر تموز وتصل الحوريات الى الطور الكامل بعد حوالي 3-5 اسابيع ، وجدت الحشرات البالغة في جميع اشهر السنة وذلك بسبب فترة حياة الحشرة الكاملة الطويلة وكذلك تداخل اعداد الكاملات للجيلين الاول والثاني للحشرة من جيلين في السنة الجيل الاول يبدأ بوضع الاناث (الخارجة في بداية الربيع) بيضها في بداية نيسان والجيل الثاني بدأ الاناث (الخارجة في بداية الصيف) بوضع بيضها بعد قضاء فتره الصيف في الاسبوع الثاني من شهر تشرين الثاني.

2-) بسليد الفستق Pistachio Psyllid

والاسم العلمي لها (*Agonosceua targionii* (L.))

Distribution and Damage

الانتشار والضرر

تنتشر في فرنسا وإيران وتركيا وفي مقاطعة تركمانيا في روسيا وفي العراق وجد ان عددا قليلا من البسلويد تصيب أكثر من عائل اي ان غالبية البسلويد متخصص العائل اما بالنسبة الى بسلويد الفستق فأنها تصيب اوراق اشجار الفستق فقط، وتنتشر هذه الحشرة في العراق في مناطق زراعة الفستق في مركز محافظة نينوى وحميدات واسكي موصل. الضرر الرئيس والمباشر لهذه الحشرة ناتج عن امتصاص الحشرة الكاملة والحوريات لعصارة النبات بأجزاء فمها الثاقبة الماصة. حيث تمتص عصارة الاوراق ونتيجة للإصابة الشديدة تؤدي الى تساقط الاوراق وتصبح البراعم التمرية ضعيفة وتقل نسبة عقد الثمار في السنة التالية كما تصبح نموات الفروع رفيعة وضعيفة وبالتالي تؤدي الى الجفاف والسقوط. كما تؤدي افرازات الندوة العسلية الى تراكم الاتربة ونمو فطريات التعفن.

Insect Life Stage Description

وصف اطوار الحشرة

البيضة: صغيرة الحجم وذات شكل بيضوي متشابه الطرفين ذات لون ابيض شاحب في بداية الوضع ثم يتغير الى اللون الاصفر الشاحب فالأصفر فالبرتقالي يبلغ متوسط طول البيضة (223.3) ميكرونا وعرضها (117.6) ميكرونا.

الحورية: للحورية خمسة اعمار، الشكل العام لحورية العمر الاول بيضوي ذات لون اصفر باهت وشفاف عند بداية الفقس، اما العمر الحوري الثاني فبيضوي منضغط من السطحين وذو لون اصفر مائل للخضرة. اما العمر الحوري الثالث فبيضوي متطاوّل مضغوط من الاعلى والاسفل ذو لون اصفر

داكن مائل للبرتقالي. اما العمر الحوري الرابع فيشبهه في شكله العام شكل العمر الحوري الثالث الا انه أكبر حجما كما ان الاجنحة أكثر تطورا وظهورا. اما العمر الحوري الخامس فشكله بيضوي متطاوول ويظهر الفرق بين الجنسين في هذا العمر. الحشرة الكاملة الانثى متطاولة ومستدقة ذات لون اخضر مصفر، اما الذكر فنهاية البطن عريضة نسبيا وذات شكل تلسكوبي ولونه اصفر باهت ويكون أصغر نسبيا من حجم الانثى. يبلغ متوسط طول الانثى (1150) مكرونا وعرضها (457) مكرونا، اما متوسط طول الذكر (1122) مكرونا وعرضه (430) مكرونا.

Life History

تاريخ الحياة

تبدأ الاناث المشتية للموسم السابق بوضع البيض في بداية موسم الربيع ومع اكتمال تفتح المجموع الخضري لأشجار الفستق ويوضع البيض فوق وتحت سطح الورقة خلال شهر نيسان وحزيران بشكل فردي من 2-5 بيضات او على شكل كتل يتراوح عدد البيض فيها من 10-12 بيضة لكل كتله ويبلغ متوسط ما تضعه الانثى الواحدة من (30-80) بيضة. يفقس البيض بعد فتره الحضانة تستغرق من (4-7) ايام حسب درجات الحرارة عن حوريات تبدأ بالتغذي على عصارات الاوراق وتمر الحوريات بخمسة اعمار حورية وتستمر الحوريات بالتغذية حتى بعدها تتحول الى الطور الكامل وتبدأ بالتشتية في فصل الخريف عند بداية سقوط الامطار وانخفاض درجات الحرارة وسقوط الاوراق وتختفي الإصابة في الحقل في اواخر تشرين اول وتستغرق فتره التشتية فتره ستة أشهر وتستنقر الاناث تحت القلف في الشقوق العميقة حيث

تمضي فترة سباتها الشتوي على شكل بالغات وتعود ثانيه بالظهور في الموسم التالي. للحشرة (8) اجيال في السنة في العراق.

3- حشرة بسليد الكمثرى Pear Psyllid

واسمها العلمي *Cacopsylla pyricolla* (Foerster)

الانتشار ومظهر الإصابة والضرر

Discription Syptoms and Damage

ينتشر هذا النوع في اوربا وامريكا الشمالية وبعض دول قاره اسيا حيث تهاجم زراعات الكمثرى في تلك المناطق، اضافه الى سته انواع اخرى من البسليد التابعة للجنس *Cacopsylla* الا ان النوع *C.pyricolla* هو الاكثر شيوعا وضررا على الكمثرى وان الموطن الاصلي لها هو اوربا وقد دخلت الى امريكا الشمالية في بداية القرن الثامن عشر مع شتلات الكمثرى المصابة المستوردة من اوربا، وتعد هذه الحشرة اليوم من الآفات المهمة والرئيسية التي تهاجم اشجار الكمثرى في امريكا الشمالية. ان اصابه اشجار الكمثرى بهذا النوع من البسليد يؤدي الى ظهور انواع متعددة من الاعراض هي:

- تورد او احمرار الكمثرى Pear Russet وهي الاعراض الاكثر اهمية بالنسبة لمزارعي الكمثرى، اذ ان كل اجراءات اداره هذه الحشرة تهدف الى منع ظهور هذه الاعراض الناتجة عن تغذية حوريات الحشرة التي تمتص كميات كبيرة من عصارة النبات وتتخلص من الفائض منها بشكل ندوة عسلية تحيط بثمار واوراق الكمثرى مما يؤدي الى تدهور نوعيه الثمار وظهور اللون الوردي عليها ونمو فطريات العفن الاسود وتجمع الأتربة عليها.

- صدمة البسليد Psylla Shock: وهي النوع الثاني من الاعراض والناتجة

عن تغذية الحوريات عند وجودها بأعداد او كثافات عالية جدا حيث تؤدي الى تقزم الاشجار المصابة وتساقط الاوراق قبل اوانها مع صغر حجم الثمار الناتجة وتساقطها قبل تمام نضجها.

- تدهور اشجار الكمثرى Pear decline:- وهو مرض يصيب اشجار الكمثرى ويسببه نوع من الفايوتوبلازما *Phytoplasma* المنقولة بواسطة بسليد الكمثرى، حيث يسبب هذا المرض الموت الموضعي للأنايب المنخليه في اماكن التطعيم ومنع المواد الغذائية المصنعة من الوصول الى الجذور مما يؤدي الى حدوث تدهور بطيء في اشجار الكمثرى الى حين موتها تماما.

وصف اطوار الحشرة Insect Life Stage Description

بالغات الحشرة 2-2.5 ملم طولا وهي في مظهرها صورة مصغرة لحشرة السيكادا، لونها يتراوح ما بين الاخضر والبني الداكن اعتمادا على الوقت من السنة لها اجنحة تشبه الجملوك roof-like تغطي منطقة البطن البيض اصفر متطاوول يتصل به ومن احدى نهاياته خيط مقوس او مائل والبيض يكون مفروزا بشكل جزئي في نسيج العائل النباتي بواسطة حامل صغير Pedicel والذي على ما يبدو يلعب دورا على الاقل جزئيا في اخذ الماء من العائل النباتي. الحوريات صفراء عند الفقس ثم تغرق تدريجيا بتعاقب الانسلاخات العمر الحوري الاخير يكون منبسطا وبيضويا في الشكل يحتوي على براعم واضحة للأجنحة، الحوريات الجميع اعمارها تمتلك زوجا من العيون الحمراء الواضحة او الملفت للنظر في مقدمة الرأس.

تاريخ الحياه Life History

لحشرة بسليد الكمثرى دورة حياه غير اعتيادية الى حد ما ولبالغاتها اشكال

موسميه (ثنائيه المظهر) Seasonally dimorphic تتراوح ما بين البالغات الكبيرة والغامقة اللون (المظهر الشتوي) والتي تتميز وبشكل واضح مقارنة مع البالغات الصيفية والتي تمتاز بصغر حجمها ولونها الفاتح، ولظاهرة ال Dimorphism علاقة وثيقة بفترة الإضاءة Photoperiod التي تتحكم باللون هذه البالغات حيث تتطور الحوريات المعرضة للنهار القصير الى بالغات المظهر الشتوي في حين تطورت تلك الحوريات المعرضة لظروف النهار الطويل الى بالغات المظهر الصيفي. بالغات المظهر الشتوي والتي تعبر او تمتاز فترة الشتاء (السبات) تمتاز بمبايضها غير الناضجة والنقص في التزاوج Lzck of mating تبدأ الاناث بوضع البيض وذلك بعد انتهاء فترة السبات الشتوي وذلك في نهاية شهر شباط او بداية آذار وذلك في ولايتي Oregon وواشنطن. وان اول بيض يتم وضعه وبشكل مباشر في الخشب قريبا من قاعدة الثمرة وبراعم الاوراق ثم ينتقل وضع البيض ليكون على الاوراق او الثمرات الخضرية النامية حديثا تمتاز الاناث الخارجة من الشتاء Over winter بخصوبتها العالية وبما يزيد على 1000 بيضة للأنتى الواحدة. للحشرة 5 اعمار حورية والتي تحتاج 3-4 اسابيع لإكمال نموها وتطورها عند متوسط درجة حرارة 20-25 م، وان ذرية هذه البالغات (بالغات المظهر الشتوي) تتطور لتصل اخيرا او تعطي بالغات المظهر الصيفي. بسليد الكثرى 2-4 اجيال من المظهر الصيفي في السنة اعتمادا او استنادا الى منطقة تواجد الحشرة Latitude وتمتاز اناث المظهر الصيفي بخصوبتها الواطئة مقارنة ببالغات المظهر الشتوي.

Psyllid Insect Mangment

ادارة حشرات البسليد

ان نظام اداره حشرات البسليد يعتمد على التخطيط الجيد لإيجاد التكامل الدقيق بين طرائق مكافحة المختلفة ولكي يتم انجاز مثل هذا التكامل لابد من توفر ما يأتي:

1- تحديد الحد الاقتصادي الحرج Economic Threshold لكل نوع من انواع البسليد المهمة اقتصاديا وعلى كل نوع من المحاصيل الزراعية المهمة اذ ان القيمة العالية للحد الاقتصادي الحرج تعني وجود فسحة من الوقت لاستخدام طرائق مكافحة غير الكيمائية.

2- ايجاد المبيدات المتخصصة للبسليد والبحث عن الطرائق التي نتمكن من خلالها جعل المبيدات غير المتخصصة مبيدات متخصصة. مثل التحكم بالتركيز ومكان الاستخدام.

3- التخلي عن مبدأ الابداء للافه الحشرية لإدامة الاعداء الحيوية في الحقل. ان الالتزام بالمبادئ الثلاثة السابقة سيوفر لنا الاساس لتوفير الاساس لتحقيق التكامل بين الطرائق الأتية لتصميم نظام جيد لإدارة حشرات البسليد.

اولاً) الطرائق الزراعية **Cultural methods**:- تهدف الطرائق الزراعية الى محاولة انتاج نباتات قوية تتحمل الإصابة بحشرات البسليد وذلك من خلال ما يلي:

1- زراعة الاشجار على مسافات جيدة للسماح للأشجار لأخذ حصتها من الضوء والهواء والماء وذلك من خلال اعتماد نظام تربية وتقليم جيدين.

2- اعتماد نظام ري وتسميد يكفل تعويض ما يفقده النبات من عصارة نتيجة تغذية حوريات وكاملات البسليد.

3-) حماية جذور الأشجار والنباتات التي تصاب بالبسلويد خلال الشتاء عن طريق اضافة الاسمدة العضوية.

4-) زراعة الاصناف المقاومة والمتحملة من الأشجار والنباتات الاخرى المقاومة للبسلويد، ففي حالة الكمثرى مثلا وجد ان صنف الكمثرى Bose يعد اقل حساسية من الصنف Anjou.

ثانياً) يتم انجاز بعض اجراءات مكافحة الفيزيائية من خلال ما يأتي:

1-) النظافة Sanitation:- من الضروري جمع الاوراق المتساقطة والثمار المصابة الموجودة على الأشجار وذلك للتخلص من الحشرات الكاملة التي تقضي فترة الشتاء تحت الاوراق المتساقطة.

2-) حرق الاوراق المتساقطة لمنع الحشرات الكاملة من ايجاد ملاجئ للتشتية ثالثاً) مكافحة الحيوية Biological control:- لحشرات البسلويد العديد من الاعداء الطبيعية من طفيليات ومفترسات منها ما هو متخصص ومنها ما هو اعداء حيوية عامة ومن اهم طفيليات حشرات البسلويد ما يأتي:

1-) الطفيل *Marieta picta* (under) ومن عائلة Aphelinudae من غشائية الاجنحة.

2-) الطفيل *Pachyneuron* sp. من عائلة Pteromalidae من غشائية الاجنحة.

3-) الطفيل *Hamalotylus flaminus* (dal.) من عائلة Encyrtidae من غشائية الاجنحة.

4-) الطفيل *Discodes* sp. من عائلة Encyrtidae من غشائية الاجنحة.

5- الطفيل *Psyllaphagus badchysi* من عائلة Ceratopogonidae من رتبة ذات الجناحين.

6- الطفيل *Trechanites insidiosus* (Crawf.) من عائلة Encyrtidae من غشائية الاجنحة.

ويعتقد الكثير من الباحثين ان لهذا الطفيل مستقبل واعد في مكافحة البسليد حيويًا. ان اغلب الطفيليات السابقة تهاجم الحوريات، ويمكن تمييز الحوريات المتطفل عليها بسهولة حيث تكون أكبر حجماً من الحوريات السليمة وان المنطقة البطنية تكون منتفخة وهي بطيئة الحركة جداً.

اضافة الى ما سبق فان هناك العديد من المفترسات التي تلعب دورا في خفض اعداد البسليد خلال موسم النشاط، ومن هذه المفترسات المفترس:

1- *Campyloman vervasci* من عائلة Miridae من رتبة نصفية الاجنحة.

2- المفترس *Oeraeocoris previs* من عائلة Miridae ايضاً.

3- المفترس *Anthocoris sarothomini* Dyl من عائلة Anthocoridae من نصفية الاجنحة.

4- المفترس *Synharmonia conglobate* (L.) من عائلة Coccinellidae من غمدية الاجنحة.

ان الاعداء الحيوية السابقة وغيرها لم تستخدم لحد الان على المستوى التجاري في مكافحة البسليد الا انها بلا شك تلعب دورا مهما في خفض اعداد البسليد في الحقل.

رابعاً) **المكافحة الكيميائية Chemical Control**:- ان معظم مبيدات الحشرات المعروفة اليوم تعد مبيدات جيدة لمكافحة حشرات البسليد وذلك لأنها

تعد من الحشرات الرهيفة، ويفضل قراءه علامه المبيد بشكل جيد واتباع الارشادات اللازمة في عمليات الرش خاصه التغطية الجيدة للشجرة او النبات بمحلول الرش لان البسليد يعد من الحشرات بطيئة الحركة. ان استخدام المكافحة الكيميائية بالتكامل مع المكافحة الحيوية يتطلب مراعاة ما يأتي:

1- الرش الشتوي: من الضروري القيام بالرش الشتوي للنباتات المصابة بحشرة البسليد بالزيوت البترولية وبمبيدات الحشرات المناسبة للقضاء على الحشرات التي تقضي فترة الشتاء تحت قلف الاشجار او تحت الاوراق المتساقطة.

2- للحفاظ على الاعداء الحيوية ينبغي مراعاة ما يلي:

أ- استخدام المبيدات سريعة التحلل

ب- استخدام المبيدات بتركيز تقتل البسليد دون ان تؤثر في الاعداء الحيوية

ت- استخدام مبيدات الحشرات الجهازية

الفصل السابع

حشرات السيكاذا

افات زراعيه معمرة ومغردة

الموقع التسمي للسيكاذا

السيكاذا والقافزات في الوطن العربي

مجاميع السيكاذا

الاضرار ومظاهر الاصابه بالسيكاذا

التاريخ العام لحياه السيكاذا

وصف الاطوار المختلفه للسيكاذا

الغناء في السيكاذا

سيكاذا العنب

ادارة حشرات السيكاذا

الموقع التقسيمي للسيكادا

تنتمي حشرات السيكاذا بمجاميعها وأنواعها المختلفة إلى رتبة نصفية الأجنحة وتحت رتبة Auchenorrhyncha وكما يأتي:

Order : Hemiptera

Sub Order : Auchenorrhyncha

Infra Order : Cicadomorpha

Super Family : Cercopoidea

Family : Cercopidae

Super Family : Cicadelloidea

Family : Cicadellidae

Super Family : Cicadoidea

Family : Cicadidae

Super Family : Membracoidea

Family : Membracidae

مما سبق يتبين أن مجموع الأشكال السيكاوية Cicadomorpha تضم عائلة السيكاذا Cicadidae وعوائل القافزات الحشرية المشابهة للسيكاذا مظهرية وهي الـ Cercopidae و Cicadellidae والـ Membracidae السيكاذا والقافزات في الوطن العربي: في الوطن العربي تم تسجيل العديد من أنواع السيكاذا والقافزات المشابهة للسيكاذا التي تهاجم المحاصيل الزراعيه المختلفة، هذه الأنواع تعود لعوائل واجناس مختلفة، والجدول (1-7) يوضح ذلك.

الجدول (1-7) عدد الاجناس والانواع لحشرات السيكاذا والقافزات والنسبة

المئوية لأنواع كل عائله مسجله في الوطن العربي

النسبة المئوية	عدد الانواع	عدد الاجناس	العائلة	المجموعة الحشرية
9.25	5	4	Cicadidae	Cicadomorpha
50.00	27	12	Cicadellidae	الاشكال السيكاديه
37.03	20	16	Cercopidae	
3.70	2	1	Membracidae	
%100	54	33		المجموع

من الجدول السابق يتبين ان مجموعه الاشكال السيكاديه تضم 54 نوعا 27 منها تعود لعائلة Cicadellidae.

Cicadomorpha

مجموعه الاشكال السيكاديه

هذه المجموعة تضم العوائل الآتية:

أولاً) عائله السيكاذا او الزيزيات **Family : Cicadidae**

الانتشار والاهمية الاقتصادية Distribution and Economic

Importance: - تنتشر حشرات هذه العائلة في المناطق المعتدلة والاستوائية الحارة وهو شان اغلب الحشرات المعروفة في العالم مما يدل على انتشارها العالمي، حيث ان هناك اليوم ما يقرب من 2500 نوع من السيكاذا حول العالم، ففي استراليا وحدها هناك ما يقرب من 200 نوع تعود لـ 38 جنسا وما يقرب من 450 نوع في افريقيا وحوالي 100 نوع في شمال اوروبا و150 نوع في جنوب افريقيا وخمسة انواع في البلاد العربية (الجدول 7-2) وفي انكلترا هناك نوع واحد هو الـ *Melampsalta montana* الواسع الانتشار في اوروبا والمسمى بسيكاذا الغابة الجديدة New Forest Cicada. وفي الولايات المتحدة هنالك مجموعتان من السيكاذا والتي تتواجد

بأعداد كبيرة في أمريكا، المجموعة الأولى بالسيكادا الحولية Annual cicada او سيكادا ايام الشعري Dog day والتي تظهر سنويا او كل 2-5 سنوات اما المجموعة الثانية من السيكادا فهي السيكادا الدورية Periodical cicadas والتي تظهر او تكمل دورة حياتها كل 13 سنة في النصف الجنوبي من أمريكا وكل 17 سنة في النصف الشمالي منها. ان اغلب الانواع الموجودة في أمريكا تعود للسيكادا الحولية وتقع في الجنس *Tibicen* وان الجنس *Magicicada* يعد الاكثر شيوعا ومعرفة من بين الاجناس الموجودة في أمريكا والتي تقع ضمن السيكادا الدورية. تسمى حشرات السيكادا خطأ بالجراد Locust كما تسمى ايضا بالJarFlies ذباب الجرة او الزجاجة بسبب اجنحتها الشفافة الزجاجية المظهر، وفي المناطق الجبلية من أمريكا تسمى بالDryFlies الذباب الجاف وذلك بسبب تركها لجلد الانسلاخ والذي يعطي انطباع بانها حشرة جافة. ان الاهمية الاقتصادية للسيكادا تتمثل في انها تعد افة للعديد من المحاصيل الزراعية وهي لا تمثل مصدر خطر او ازعاج للإنسان حيث اعتاد الكثير من الاشخاص تناول هذه الحشرات وبشكل خاص الاناث منها حيث تعد وجبه شهيه من البروتين الحيواني خاصه لدى مواطني اليونان والصين وماليزيا وبورما وأمريكا اللاتينية والكونغو كما ان جلود انسلاخ السيكادا تدخل في تصنيع العديد من الادوية في الصين.

مجاميع السيكادا

سبق ان أشرنا الى ان انواع السيكادا المعروفة تقع في مجموعتين رئيسيتين هما:

1- (السيكادا الحولية **Annual Cicada** - وتسمى أيضا بسيكادا ايام الشعرى Dog days cicada وذلك لأنها تظهر في ايام الشعرى وهي الايام الواقعة ما بين اوائل شهر ايلول واولئ شهر تشرين الاول . ان انواع هذه المجموعة تكمل دورة حياتها خلال 1-5 سنوات وذلك تبعا لنوع السيكادا ونوع العائل الغذائي والظروف البيئية ومن انواع هذه المجموعة:

سيكادا العنب *Cicadatra alhageos*

سيكادا الاشجار *Melampsalta Fraseri*

2- (السيكادا الدورية **Periodical cicadas** - تعد حشرات انواع هذه المجموعة الاطول في فتره نموها من معظم انواع الحشرات المعروفة، هذه المجموعة تضم مجموعتين هما:

أ- (المجموعة ذات الـ 13 سنة: وذلك لأنها تكمل دورة حياتها في 13 سنة انواع هذه المجموعة تنتشر في الجزء الجنوبي من الولايات المتحدة الأمريكية ومن اهم انواعها:

Magicicada tredecim

Magicicada tredecula

Magicicada tredecassini

ب- (المجموعة ذات الـ 17 عام: وتضم الانواع التي تكمل دورة حياتها في 17 سنة، انواع هذه المجموعة تفضل الاجزاء الشمالية من الولايات المتحدة الامريكية، اي ان الحشرات التي ظهرت في عام 2008 ستظهر مرة ثانية في عام 2025 م ومن الانواع الممثلة لهذه المجموعة:

Magicicada septendecim

Magicicada septendecula

Magicicada cassini



الشكل (1-7) المظهر الخارجي لبالغات السيكاذا الدورية والحولية

تقسيميا تضم عائله السيكاذا اربعة تحت عوائل هي:

- 1-) SubFamily: Cicadettinae
- 2-) SubFamily: Cicadinae
- 3-) SubFamily: Tettigadinae
- 4-) SubFamily: Tebiceninae

الاضرار ومظاهر الاصابة بالسيكاذا

Cicada Damage and Syptoms

ان ظهور بالغات حشرات السيكاذا بأعداد كبيرة في بعض الاحيان يثير الخوف لدى المزارعين من تسببها في احداث خسائر كبيرة في المحاصيل الزراعية وذلك بالرغم من عدم تغذية تلك الحشرات على اوراق المجموع الخضري للنبات ولكنها تتغذى على امتصاص عصارة الافرع الغضة وبشكل محدود، الا ان الضرر المتبقي لهذه الحشرات يأتي من الجروح التي تحدثها اناث هذه الحشرات خلال عمليه وضع البيض حيث تقوم بعمل شقوق في

حشرات نصفية الأجنحة الضارة بالنباتات الاقتصادية

اغصان وافرع الاشجار بواسطة اله وضع بيضها الحاده لوضع بيضها في تلك الشقوق مما يؤدي الى ذبول او موت الجزء العلوي لتلك الافرع وتعد اشجار التفاح والخوخ والقرانيا Dog Wood والبلوط والجوزيه عوائل مفضله للسيكادا. اما حوريات هذه الحشرة فأنها تتغذى بامتصاص جذور العائل النباتي أسفل سطح التربة لفته طويله تتراوح بين 13-17 سنه، ان الجروح التي تحدثها بالغات وحوريات السيكادا تعد مدخلا للعديد من المسببات المرضية وملجأ جيد لحشرة من التفاح القطني التي تهاجم اشجار التفاح ولحشرات اخرى غيرها.

سيكادا المنطقة العربية

الجدول (2-7) يضم الاسماء العلمية والعربية الشائعة لخمسة انواع من السيكادا التي تم تسجيلها في البلاد العربية ولعل من اهمها سيكادا العنب.

الجدول (2-7) الاسماء العربية والعلمية الشائعة لأنواع السيكادا في

المنطقة العربية


الاسماء العلمية	الاسماء العربية الشائعة
<i>Cicadatra alhagoes</i> Kolendati, 1857	حشرة سيكادا العنب، السيكادا، سيكادا العنب، وزوار الكروم
<i>Cicadatra glycyrrhizae</i> Kolendati, 1857	سيكادا العنب، سيكادا الينكي دنيا
<i>Diceroprocta apache</i> Davis, 1921	حشرة الاباش، سيكادا الاباش
<i>Magicicada septendecim</i> Linnaeus, 1758	السيكادا، السيكادا الدورية الشائعة
<i>Melampsalta fraseri</i> Waltl, 1837	سيكادا الأشجار

التاريخ العام لحياه السيكاذا Cicada General Life History

بعد مرور 2-13 و 17 سنة على وجود حوريات السيكاذا تحت سطح الارض متغذية على جذور عوائلها من الاشجار تقوم الحوريات الناضجة او المكتملة النمو خلال شهر ايار وبداية حزيران بالحفر في التربة متجهة الى سطح التربة حيث تظهر الحشرات الكاملة بأعداد كبيرة عندما تكون درجة حرارة التربة على عمق 100سم 67 فهرنهايت وبعد مرور 4-5 ايام يكتمل نضوج الحشرات الكاملة وتصل الى مرحلة البلوغ حيث تبدأ الذكور بالغناء واصدار اصوات تشبه الازيز لذلك سميت حشرات السيكاذا بالزيزيات، هذه الاصوات تطلقها من اعضاء توجد على جانبي المنطقة البطنية للذكور تسمى النقارات Tymbals يحوي غشائيين (تشبه اغشيه الطبله) حيث تتجذب الاناث للذكور وتتم عملية التزاوج. بعد التزاوج تقوم اناث السيكاذا بوضع البيض مستخدمه اله وضع البيض الحادة حيث تقوم بعمل في الافرع الغضة وعادة تفضل الافرع التي لا يزيد قطرها عن قطر قلم الرصاص في عوائلها المفضلة من اشجار التفاح والكمثرى والبلوط والقرانيا Dogwood والجوزيات Hickory وتضع الانثى في الشق الواحد 24-28 بيضه ثم تتحرك الانثى الى الاعلى قليلا على الفرع لعمل شق اخر لوضع المزيد من البيض وتستمر الانثى بذلك حيث تعمل ما يقرب من 5-20 شق في الغصن الواحد ثم تقوم بالبحث عن غصن اخر حيث يصل مجموع ما تضعه الانثى الواحدة من 400-600 بيضه. يفقس البيض بعد مرور 6-7 اسابيع عن حوريات صغيرة بيضاء تشبه النمل في مظهرها وتكون محاطه بغشاء عند فقسها باستثناء الارجل الأمامية التي تكون حره الحركة حيث تستخدمها في تحرير نفسها من الغشاء

والخروج من البيضة ثم السقوط الى الارض حيث تقوم بالحفر تحت سطح التربة بحثا عن جذور عوائلها النباتية حيث تبدأ بالتغذية بامتصاص العصارة النباتية من الجذور واثاء التغذية تقوم الحوريات ببناء الخلايا التي تعيش داخلها وذلك عن طريق ربط جدران خلايا الجذور ببعضها البعض، لحوريات السيكادا خمسة اعمار حورية تمر خلالها بأربعة انسلاخات. بعد اكتمال نمو العمر الحوري الخامس يبدأ بالتحرك للأعلى ليصبح قريبا من سطح التربة حيث يعيش داخل حجرات او خلايا تسمى حجرات الانتظار Waiting Cells وفي شهر ايار تحفر الحوريات مغادرة حجرات الانتظار الى سطح التربة بأعداد كبيرة بعد الغروب عادة حيث تبدأ بتسلق الاشجار والحشائش المرتفعة لكي تتعلق بها حيث تتسلخ الى حشرات كاملة بعد عدة ساعات والحشرات الكاملة الحديثة تكون طرية بيضاء اللون الا انها وبعد فترة قصيرة تصبح اكثر صلابه وذات اللون مميزة حسب النوع وقد لوحظ ان الانواع الكبيرة من السيكادا تحتاج من 2-33 ساعات لبسط اجنحتها والطيران فيما تتم هذه العملية خلال 30 دقيقة في الانواع الصغيرة من السيكادا. بعد ذلك يتم التزاوج بين ذكور واناث الحشرة لإعادة دورة الحياة مره اخرى وهكذا، ان طول دورة حياه هذه الحشرات يسمح بتداخل اجيالها.

Life Cycle of a Cicada



paint the world
SUPER
COLORING

الشكل (7-2) دورة الحياة العامة للسيكادا

وصف الاطوار المختلفة للسيكادا

Cicada Life Stage Description

كبقية حشرات نصفية الاجنحة فان حشرات السيكاذا تمر بالاطوار الآتية:

1- البيضة: بيض السيكاذا بيضوي الشكل ومتطاول ومستدق من احدى نهايته.


2- الحورية: حوريات السيكاذا متشابهة الى حد كبير في الانواع المختلفة حيث يكون الرأس مخروطي الشكل أكثر مما في البالغات مما يساعد كثيرا في التقدم اثناء الحفر في التربة فضلا عن امتلاكها لما يعرف باليوز Rostrum الذي يحوي اجزاء الفم، الارجل الامامية قوية ومعدة للحفر فضلا عن نمو الصدر الامامي بشكل جيد لكي يقوم بأسناد الارجل الامامية اثناء قيامها بالحفر تحت سطح التربة. قرون الاستشعار اطول واغظ من تلك الموجودة في الحشرات الكاملة وخاصة في العمر الحوري الاول، العيون البسيطة غير عاملة. تمتاز الاعمار الحورية الأخيرة (الرابع والخامس) باحتوائها على براعم الاجنحة، فيما تكون الحلقات البطنية واضحة.

3- الكاملات: يتراوح طول حشرات السيكاذا الكاملة بين 2-5 سم، بالرغم من ان طول بعض الانواع الاستوائية قد يصل الى 15 سم كما في حشرة *Pomponia imperatorial* في ماليزيا، للحشرة الكاملة زوج من العيون المركبه، الواضحة والتميزة والتي تمثل جزءا كبيرا من جانبي الرأس ويوجد بينها ثلاثة عيون بسيطة، كما تملك الكاملات زوج من قرون استشعار قصيرة تقع بين او امام العيون مع اجنحة امامية غشائية

حشرات نصفية الأجنحة الضارة بالنباتات الاقتصادية

واضحة التعريق وشفافة والارجل الخلفية غير متحورة للقفز (الشكل 7-)

(2)



الشكل (7-3) الاطوار المختلفة لحشرات السيكادا

الغناء في السيكاذا

Cicada Singing

أشرنا سابقا الى ان ذكور السيكاذا هي مصدر الاشارات الصوتية وذلك باستخدام عضلات خاصه تعمل على شيك العضو المنتج للصوت Tymbals او النقار او الطبال وهو عباره عن اغشيه كايثينييه مضلعه تقع على الجهة العلوية للحلقة البطنية الاولى. ويبدو ان كل نوع من انواع السيكاذا بصمة صوت خاص هبه كبصمه صوت الانسان حيث يمكن تمييز هذه البصمة من خلال قياس تردد الصوت Frequency وشدته Intensity وعليه فان بصمة الصوت تعد صفة جيدة للتمييز بين انواع السيكاذا. ان ذكور السيكاذا تبدأ بأطلاق الاصوات او الغناء عندما تكون في وضع الراحة على المجموع الخضري للنبات ونادرا ما تغني وهي في وضع الطيران. وهي اي الذكور تفضل الغناء في الايام المشمسة وتتوقف عن الغناء في الايام الرطبة ويرجع ذلك الى ابتلال الأغشية المسؤولة عن انتاج الصوت والتوقف عن العمل. ان الاصوات او النغمات التي تطلقها ذكور السيكاذا تؤدي أكثر من وظيفة، ففي بيرو Peru وجد ان السيكاذا *Fidicina mannifera* تطلق اربعة اصوات او نغمات مختلفة هي:

* نغمه الارياك والازعاج Disturbance Sound وذلك عند شعورها بالخطر او الاحتجاز.

* صوت الغناء الهادئ والمنخفض لجذب الاناث للتزواج Courtship Song

* الغناء المعتاد والمميز لنوع السيكاذا

* صوت او اغنيه مناداة او تجمع افراد النوع الواحد وبالرغم من ان ذكور السيكاذا هي التي تنتج الاصوات فان كلا الجنسين يمتلكان اعضاء سمع جيدة

تسمى بالـ Tympana اي الأغشية الطبلية وهي تشبه الاذن في عملها، هذه التراكيب لا تعمل في الذكور اثناء قيامها بالغناء. ان من انواع السيكاذا الشائعة في المنطقة العربية النوع الذي يهاجم بساتين العنب والمعروف بحشرة سيكاذا العنب Grapevine Cicada.

Cicadatra alhageos (Kol.) (=C.viridissima) (Walk.)


الانتشار:- تنتشر في العراق وسوريا وفلسطين والاردن ولبنان ومنطقة البحر المتوسط وتوجد ايضا في تركيا والقسم الاوسط من اوروبا وتصيب العنب وتعد من الحشرات الماصة للعصارة ويوجد نوع اخر من السيكاذا في العراق يصيب ايضا اشجار العنب.

الوصف:- الحشرة الكاملة يتراوح طولها ما بين 2-5 سم اللون العام اخضر فاتح، الرأس والصدر عريضان، البطن مدببة وتنتهي في الانثى بالة وضع البيض قوية جدا، الاجنحة كبيرة تفوق البطن في الطول وهي نصف شفافة وتشاهد في حالة الراحة صانعة فوق جسمها ما يشبه الخيمة او الجمالون. كما تمتاز ذكور هذه الحشرة بالقدرة على احداث اصوات مميزة مألوفة جدا لسكان مناطق الغابات، كما تشاهد في شمال العراق حيث تسمع اصواتها خلال الصيف في مناطق سرسنك وعقرة وغيرها.

دورة الحياة:- تنشط الحشرات الكاملة وتزواج خلال ايار وحزيران، ثم تبدأ الاناث مباشرة في وضع البيض، يوضع البيض مغروسا في شقوق في الافرع الصغيرة في حزم تحتوي كل منها على 15 - 20 بيضة، تلاحظ مثبتة اسفل القلف ويصل عدد البيض للأنثى الواحدة الى 400-600 بيضة. يفقس البيض بعد 6-7 اسابيع ثم تسقط الحوريات الصغيرة الى سطح الارض ثم

حشرات نصفية الأجنحة الضارة بالنباتات الاقتصادية

تدخل الى التربة اما عن طريق الشقوق او مجاورة لسوق وجذور الاشجار وتسير متجهة الى الاسفل حتى تصل الى أحد الجذيرات الغضة وهناك ترتبط به وتغرس اجزاء فيها الثاقبة الماصة وتتغذى بامتصاص عصارة الجذر. وتظل الحوريات تنمو ببطئ شديد فتستغرق سنين عديدة تبقى تتغذى على جذور شجرة العنب. وعندما تتم الحورية نموها تصعد الى قرب سطح التربة وتتسلق الاغصان ثم تتحول الى الحشرة الكاملة تاركة جلد الانسلاخ للحورية ملتصقا بالأفرع. وتشاهد جلود الانسلاخ هذه بالآلاف حيث وجد ما بين 20-40 الفا من هذه الجلود حول شجرة واحدة. تنشط الحشرات في الربيع وتتغذى بامتصاص عصارة الاوراق والاغصان ثم تتزوج وتعيد دورة حياتها من جديد.



© 2009 Encyclopædia Britannica, Inc.

الشكل (4-7) منظر جانبي للحشرة الكاملة للسيكادا

الضرر:- يحدث الضرر نتيجة لتغذية الحوريات على امتصاص عصارة الجذور. الا ان الحشرات الكاملة علاوةً على امتصاصها لعصارة المجموع الخضري الا ان ضررها الكبير يحدث عند وضعها البيض في الافرع والاغصان حيث ينتج عن ذلك ضعف وجفاف الافرع والاغصان.

اداره حشرات السيكاذا Cicada Insect Management

يمكن خفض الاضرار التي تسببها السيكاذا لفساتين الفاكهة واشجار الغابات في الحقول والمشاتل من خلال اعتماد التكامل بين الطرائق الآتية:

أولاً) الطرائق الزراعية Cultural Methods :- ان حوريات وبالغات السيكاذا تتغذى على عوائلها النباتية وخاصة الحوريات لسنوات عديدة من خلال اختراقها للأوعية الخشبية في الجذور والاقرع وليس انسجة اللحاء مما يجعل غذائها غني جدا بالماء والاحماض الأمينية فيما ينخفض محتواه من السكر مما يؤدي الى استنزاف الكثير من المواد الغذائية مما يضعف الاشجار خاصة وانها تستمر بالتغذية لسنوات عديدة لذلك فان الطرائق الزراعية يجب ان تتركز على كيفية تقوية الاشجار وتعويض ما تفقده من عناصر غذائية وذلك من خلال ما يأتي:

- 1- التسميد والري المنتظم
- 2- التقليم الجيد لتحقيق التوازن بين المجموع الجذري والخضري لمنع موت نهايات أطراف الافرع وتدهور الأشجار.
- 3- التسميد العضوي خلال الشتاء لحماية الجذور من البرودة
- 4- في المناطق الموبوءة بالسيكاذا يفضل تأخير تقليم اشجار وشتلات الفاكهة الصغيرة الى ما بعد ظهور بالغات السيكاذا ووضعها للبيض حيث يتم ازاله الافرع المصابة بعد ذلك عن طريق تقليمها.

ثانياً) **المكافحة الفيزيائية Physical Control**:- ويتم من خلال انجاز ما يأتي:

- 1-) ازالة الافرع المصابة وقبل فقس بيض السيكاذا (خمسة اسابيع او اقل بعد وضع البيض) من الضروري حرق الافرع المصابة بعد تقليمها.
- 2-) الحواجز: ويقصد بها تغطيه الاشجار الصغيرة بقماش الململ او بشباك ناعمه تشكل حاجزا امام افات السيكاذا لوضع البيض على أفرع الاشجار الصغيرة.

ثالثاً) **المكافحة الحيوية Biological control**:- أن عدم وجود اعداء حيوية متخصصة على حشرات السيكاذا بسبب طول دورة حياتها التي تستغرق من 13-17 سنة، الا ان ذلك لا يمنع وجود العديد من المفترسات العامة التي تتغذى وبشراهة على حوريات العمر الخامس عند ظهورها فوق سطح التربة بكثافة ملحوظة. ان وجود اعداد كبيرة من حوريات السيكاذا خلال فترة زمنية محدودة يحتاج الى طريقة غير اعتيادية في التعامل مع الاعداد الكبيرة لحوريات السيكاذا، حيث ان المفترسات سرعان ما تصل الى حد الاشباع Saturation تاركة المجال للأعداد المتبقية من السيكاذا للتزاوج ووضع البيض، ان من اهم مفترسات السيكاذا ذباب مايو والنمل والنمل الابيض، اضافة الى وجود العديد من الزنابير الانفرادية التي وجدت في اعشاشها حشرات السيكاذا المخزنة لتغذية يرقاتها ومن اهم هذه الزنابير:

S.sphecius ، *Sphecius Sphectapilius*

Exeirus lateritus ، *S.freyi*

كما سجل وجود العديد من انواع الحلم المفترس لبيض السيكاذا وإذا اضفنا لذلك الطيور فأنا سنجد أنفسنا امام مجموعة جيدة من المفترسات. اما

الطفيليات التي تهاجم السيكاذا فقد سجل الطفيل *Massopora cicadina* وهو طفيل متخصص على حوريات السيكاذا. فضلا عن تسجيل ما لا يقل عن 11 نوع من الزنابير ومعظمها تعود لعائلة Chalcididae فيما تعود الانواع الاخرى لعائتي Eulophidae و Eurytomidae وجميعها تتطفل على بيض السيكاذا خاصة النوع *Cerambycibus cicadae* من عائلة Chalcidae الذي يضع بيضة واحدة في كل بيضة من بيض السيكاذا اما الطفيل *Centrodara cicadae* من عائلة Chalcidae ايضا فتضع اناته من 1-3 بيضة في بيضة السيكاذا.

رابعاً) **المكافحة الكيميائية Chemical Control**:- ان معظم مبيدات الحشرات المعروفة والمتداولة اليوم هي مبيدات فعالة في مكافحة السيكاذا بالتكامل مع الطرائق الاخرى وذلك باتباع ما يأتي:

1-) ان تغذية الحوريات لفترة طويلة بامتصاص العصارة النباتية من الأوعية الخشبية يتطلب استخدام المبيدات الجهازية التي يمكن اضافتها للتربة حيث تعمل على قتل جميع الحشرات الماصة للعصارة الموجودة على الجذور والمجموع الخضري من دون التأثير على الاعداء الحيوية.

2-) رش التربة المحيطة بالأشجار بخليط من الزيوت البترولية ومبيدات الحشرات بطيئة التحلل وقبل فقس البيض للقضاء على اليرقات حديثه الفقس قبل وصولها للجذور.

3-) توقيت عمليات الرش.

الفصل الثامن

قافزات الاوراق سيكادية المظهر

المقدمة

Cicadellidae عائلة قافزات الاوراق

Cicadellidae الصفات المميزة لعائلته

الاتشار والاهمية الاقتصادية

تغذية القافزات

الاضرار ومظاهر الاصابه بالقافزات السيكادية

Cicadellidae تاريخ الحياه العام لعائلته

Cicadellidae قافزات الاوراق من في الوطن العربي

Cercopidae عائلة القافزات الضفدعيه

القافزات الضفدعيه في البلاد العربية

الاضرار ومظاهر الاصابه

تاريخ الحياه العام

وصف الاطوار

Membracidae عائلة قافزات الاشجار

اداره الحشرات القافزة

المقدمة


في الفصل السابع لاحظنا من خلال الموقع التقسيمي للسيكادا انها تنتمي لتحت رتبة Auchenorrhyncha التي تقسم بدورها الى مجموعتين هما مجموعه الاشكال سيكادية المظهر التي تضم اضافة الى عائله السيكادا عوائل قافزات الاوراق Cicadellidae و Cercopidae و Membracidae، اما المجموعة الثانية فهي مجموعه القافزات المتألقة او مجموعه الاشكال الفلكورويدية، وسنحاول في هذا الفصل تسليط الضوء على المجموعة الاولى من القافزات التي اسميناها بالقافزات سيكادية المظهر وكما يأتي:

أولاً) عائله قافزات الاوراق Cicadellidae: - هذه العائلة تعود لفوق عائله Cicadelloidea وتعرف ايضا باسم الرامي الدقيق Sharpshooter وقد استخدم هذا الاسم لأول مرة من قبل الباحثان Riley و Howard (1893) لوصف الضرر الناتج عن تغذية قفاز الاوراق ذو الاجنحة الزجاجية Glassy winged المسمى *Homalodisca vitripennis* على القطن حيث تبدو الاوراق وكأنه قد تم اطلاق رصاصات دقيقة عليها. ذلك نتيجة غرس اجزاء فم القفاز في انسجة الورقة. اما التفسير الاخر لمصطلح الـ Sharpshooter فيرجع الى قذف القافزات بقطرات صغيرة وبشكل سريع على اوراق النبات باحثون اخرون يعتقدون ان هذا المصطلح جاء من قدرة القافزات على الاختباء عند تعرضها للخطر، حيث تنزلق سريعا على الافرع والاعصان لتجنب اعدائها الحيوية كما يفعل الرامي او الصياد عندما يختبئ خلف الاشجار لأطلاق النار على فريسته. تضم هذه العائلة أكثر من (20) الف نوع موصوف تنتمي لأكثر من (300) جنس.

الصفات المميزة لعائلة Cicadellidae

ان الانواع التابعة لهذه العائلة تشترك في الصفات المظهرية الآتية،

- 1- قرون استشعارها من النوع الارستي
 - 2- لها زوج من العيون البسيطة في مقدمة الرأس
 - 3- رسغ الارجل يتكون من 3 عقل او حلقات
 - 4- فخذ الرجل الامامية ذو اشواك ضعيفة
 - 5- ساق الرجل الخلفية ذات حافة او أكثر قوية او واضحة مع وجود صف من الاشواك المتحركة وأحيانا يكون للأشواك حافة متضخمة.
- ان معظم افراد هذه العائلة ذات ألوان تتراوح بين الاحضر والبني ويتراوح طولها بين 3-4 ملم، والحوريات بشكل عام ذات لون اخضر فاتح وهي تشبه البالغات في ما عدا فقدانها للأجنحة.



الشكل (1-8) مخطط يوضح الاجزاء المختلفة لحشرة من الـ

Cicadellidae

الانتشار والاهمية الاقتصادية لعائلة Cicadellidae

Cicadellidae Economic Importance and Distribution

ان عدد الانواع الكبير الذي تضمه هذه العائلة يشير بشكل واضح الى الانتشار العالمي الواسع لأنواع هذه العائلة والذي ساعد على هذا الانتشار الواسع هو المدى العائلي لها الذي يضم انواع نباتيه كثيرة جدا تتوزع بين النباتات الرفيعة وعريضة الاوراق والتي تتراوح بين الحشائش والاشجار والشجيرات. ان هذا التنوع في عوائلها الغذائية جاء لتلبية حوريات وبالغات الحشرة الى كميات كبيره من العصارة النباتية لإكمال نموها وتكاثرها.

ان الاهمية الاقتصادية لهذه المجموعة من القافزات تتمثل في ما يأتي:

1 - ان العديد من انواع هذه العائلة تهاجم العديد من المحاصيل ذات الاهمية الاقتصادية وبذلك فهي تعد افات زراعية خطيرة ومهمة منها قافز اوراق البطاطا *Empoasca fabae* وقافز اوراق البنجر *Circulifer tenellus* وقافز اوراق التفاح الابيض *Typhlocyba pomaria* وقافز الاوراق ذو البقعين *Sophonia rufofascia* وقافز اوراق العنب في العراق *Zygina hussaina* وغيرها كثير.

2- الاضرار الفيزيائية العديدة التي تسببها لأوراق عوائلها النباتية نتيجة غرزها لأجزاء فمها في انسجة النبات فضلا عن امتصاصها لكميات كبيرة من عصارة النبات تؤدي الى استنزاف النبات واعاقة نموه بشكل طبيعي مما ينعكس على انتاجية النبات.

3- للعديد من انواع هذه العائلة القدرة على نقل العديد من المسببات المرضية المهمة للعديد من المحاصيل المهمة مما يزيد من خطورة وضرر هذه

المجموعة من الحشرات، ومن أهم المسببات المرضية التي تقوم بنقلها ما يأتي:

أ- بكتريا *Xylella fastidiosa* وتنقلها عدة أنواع من قافزات الاوراق وتعد بكتريا الجنس *Xylella* المسبب للعديد من الامراض المهمة مثل

Phony Peach

Plum Leaf Scald

Almond Leaf Scorch

Citrus Variegated Chlorosis

Pierces Disease

حيث تعمل البكتريا على سد او غلق الاوعية الخشبية المسؤولة عن نقل الماء والعناصر الغذائية مما يؤدي الى ظهور اعراض الحروق على النباتات المصابة.

ب- الفايروسات: لقافز اوراق البنجر القدرة على نقل فايروس تجعد او التفاف قمة النبات Curly Top Virus

Hoppers Feeding

تغذية القافزات

تتغذى القافزات بمجاميعها وانواعها المختلفة عن طريق غرز اجزاء فمها الماصة في الأوعية الخشبية للنبات حيث تمتص السائل المنقول بالأوعية الخشبية والذي يكون فقيرا في محتواه من العناصر الغذائية اذ يحتوي على اكثر من 95% ماء مع كميات قليلة من المركبات العضوية وغير العضوية وبعض الاحماض الأمينية مثل Arginine و Glutamine و Asparagine بالإضافة الى الاحماض العضوية مثل الـ Citric والـ Malic والـ Oxalic ان وجود عصاره الأوعية الخشبية تحت ضغط سالب اي اقل من الضغط الجوي يتطلب من القافزات عند التغذية سحب هذا السائل بواسطة المضخة الفموية

Cibarian Pump والتي تعمل عن طريق انبساط وتقلص العضلات المرتبطة بها. ان نجاح نمو وتكاثر هذه الحشرات بالرغم من غذائها الفقير في محتواه من العناصر الغذائية يرجع الى قيام القافزات بامتصاص كميات كبيرة من عصارة الأوعية الخشبية للحصول على احتياجاتها من المواد الغذائية وذلك من خلال تركيزها بواسطة غرفة الترشيح Filter Chamber حيث تمثل وسيله فعالة لطرح ما يقرب 99% من الماء الممتص مع كميات صغيرة من الامونيا وهذا يعني قدرة عالية على تركيز المواد الغذائية من قبل الحشرة لتوفير ما تحتاجه من غذاء لنموها وتكاثرها.

الاضرار ومظاهر الإصابة بالقافزات السيكاديه

Cicadellidae Damage and Syptoms

تقوم حوريات وبالغات انواع هذه العائلة بإزاله محتويات الورقة النباتية تاركه هذه الخلايا الفارغة تبدو كبقع صفراء شاحبه وعند زيادة اعداد الحشرة فان الورقة بالكامل تبدو صفراء شاحبه او بيضاء ومن ثم سقوطها مما يؤدي بالنتيجة الى اصابه الثمار بسمطة الشمس Sunburn وتأخر نضج الثمار وخاصة في حاله الاشجار والشجيرات الصغيرة التي تؤدي تغذية القافزات الى اختزال نموها وصغر حجم ثمارها. وقد وجد ان نسبة السكريات في الاعناب المصابة بلغت 8-9% مقارنة بالاعناب السليمة التي بلغت فيها نسبة السكريات 24-25% كذلك فان وجود قطرات الندوة العسلية يؤدي الى تجمع الغبار ونمو فطريات العفن الاسود Sootymold على عناقيد العنب او الثمار مما يقلل من قيمتها التجارية. انواع اخرى من القافزات منها قافز اوراق البطاطا *Emboasca fabae* يقوم بحقن بعض التوكسينات في اوراق العائل

مسببا ظهور اعراض تسمى بحروق القافزات Hopperburn حيث تبدأ قمم الاوراق والحواف اولا بالاصفرار ثم تأخذ اللون البرونزي واخيرا تلتف الاوراق او حوافها بالاتجاه الاعلى ثم موت الاوراق المصابة وفي حال الإصابة الشديدة تموت نباتات البطاطا بالكامل وغيرها من نباتات العائلة البادنجانيه كالقفل والبادنجان حيث ان اعراض الإصابة على المحصول الاخير تشبه اعراض الذبول الفرتسليومي ما عدا ان حواف الاوراق في حاله الذبول تلتف باتجاه الاسفل بدل الاعلى.


تاريخ الحياة العام لعائلة Cicadellidae

Cicadellidae General Life History

ان التباين الموجود في تاريخ حياة الانواع التابعة لهذا العائلة يرجع الى تباين النوع والعائل الغذائي والمنطقة الجغرافية الا ان هذا لا يلغي تشابهها في الإطار العام لتاريخ الحياة، حيث تقضي حشرات هذه العائلة فترة البيات الشتوي بشكل حشرات كاملة تحت قلف الاشجار او تحت الاوراق المتساقطة او بشكل بيض مغروز في اوراق العائل النباتي وذلك تبعا للمنطقة الجغرافية ونوع الحشرة. في بداية موسم النشاط تبدأ الحشرات البالغة المشتية بوضع البيض عن طريق غرزها في عروق السطح السفلي لورقة العائل النباتي او في انسجة النبات الاخرى وتضع الانثى الواحدة يوميا ما بين 1-6 بيضات وبمتوسط 300 بيضة خلال فترة حياتها ، يفقس البيض بعد فترة حضانة تستغرق من 8-10 ايام، يفقس البيض عن حوريات صغيرة تتسلخ اربعة انسلاخات وتمر بخمسة اعمار حورية تتغذى خلالها على عصارة النبات وتستغرق فترة نمو الحشرة من طور البيضة ولغاية الوصول الى الطور البالغ

حشرات نصفية الأجنحة الضارة بالنباتات الاقتصادية

من 20-35 يوم كما في قافز اوراق البطاطا وقد تستغرق اكثر من ذلك في انواع اخرى للحشرة من 3-5 اجيال في السنة. في المناطق الباردة وجد ان البيض الذي يوضع في نهاية الموسم يمضي فترة الشتاء ليفقس مع بدء موسم النشاط بعد عدة أشهر. ان العديد من انواع هذه العائلة تنتج مادة طباشيرية بيضاء تسمى Brachosomes على الاجنحة حيث تقوم الاناث وبعد وضع البيض بقشط او حك هذه المادة لتصبح بشكل مسحوق يغطي منطقة او مكان وضع البيض حيث تقوم بحماية البيض والحضنة من مهاجمة الاعداء الطبيعية.



الشكل (8-2) دورة الحياة العامة للقافزات سيكادية المظهر

قافزات الاوراق من الـ Cicadellidae في الوطن العربي

هناك العديد من انواع قافزات الاوراق السيكايدلية التي تعود لعدة اجناس (جدول 1-8) الا ان الملاحظ ان اغلب هذه الانواع لم تدرس لحد الان وبشكل جيد في المنطقة العربية ماعدا بعض الانواع مثل قافز اوراق العنب.

الجدول (1-8) الاسماء العلمية والعربية الشائعة لقافزات الاوراق من عائلة

Cicadellidae المسجلة في الوطن العربي

الاسماء العلمية	الاسماء العربية الشائعة
<i>Balcultha hebe</i> Kirkaldy, 1906	قفاز العنب
<i>Balcultha hortensis</i> Lindbery, 1948	قفاز السمسم
<i>Cicadella aurata</i> Linnaeus, 1758	جندب ورق البطاطا
<i>Cicadella spectra</i> Distant, 1907	الجندب الابيض، جندب ورق الارز الابيض، نطاط اوراق الارز
<i>Cicadella viridis</i> Linnaeus, 1758	جاسيد الخضار، جندب ورق البندق الاخضر، الحشرة النطاطة، نطاط الاوراق الأخضر
<i>Cicadulina chinai</i> Ghuri, 1965	نطاط الأوراق
<i>Circulifer tenellus</i> Baker, 1896	حشرة الشمندر النطاطة، قفاز اوراق البنجر
<i>Dalbulus maidis</i> DeLong & Wolcott, 1923	جندب ورق الذرة
<i>Edwardsiana crataegi</i> Douglas, 1876	جندب التفاح الغربي
<i>Edwardsiana prunicola</i> Edwards, 1914	قفاز اشجار الفاكهة
<i>Edwardsiana rosae</i> Linnaeus, 1758	جندب الورد، جندب ورق الورد، نطاط اوراق التفاح، نطاط اوراق الورد
<i>Empoasca decedens</i> Paoli, 1932	القفاز الاخضر، قفاز الاوراق الاخضر، قفاز القطن، نطاط اوراق التفاح

<i>Empoasca decipiens</i> Paoli, 1930	جاسيد اوراق البطاطا، جاسيد اوراق البطاطس، جاسيد العنب، قافزة اوراق القطن والبطاطا، قفاز الاوراق الاخضر، قفاز اوراق البنجر، قفاز اوراق العنب
<i>Empoasca distinguenda</i> Paoli, 1932	جاسيد الخروع، نطاط الخروع
<i>Empoasca fabae</i> Harris, 1841	قافزات اوراق الفول، قافزة اوراق الفول، نطاط اوراق البطاطس، نطاط البطاطا، نطاط البطاطس، نطاط ورق البطاطا
<i>Empoasca facialis</i> Jacobi, 1912	جندب افريقيا وجنوبي الصحراء
<i>Empoasca flavescens</i> Fabricius, 1794	جذب ورق البطاطا
<i>Empoasca lybica</i> DeBerg, 1922	جاسيد القطن، جندب حوض المتوسط
<i>Empoasca maligna</i> Walsh, 1862	نطاط التفاح
<i>Empoasca sp</i>	القفاز، قفاز الأوراق
<i>Empoasca vitis</i> Goethe, 1875	نطاط اوراق العنب
<i>Nephotettix apicalis</i> Motschulsky, 1859	نطاط اوراق الأرز
<i>Nephotettix nigropicuts</i> Stal, 1870	قافزة اوراق الارز، نطاط اوراق الارز
<i>Nephotettix virescens</i> Distant, 1908	قفاز اوراق الارز، قفاز الرز الاخضر
<i>Opsius stactogalus</i> Fieber, 1866	نطاط اوراق التاماركس
<i>Platypedia minor</i> Uhler, 1888	النطاط الأصفر
<i>Xyphon flaviceps</i> Riley, 1880	النطاط ذو الرأس الاصفر
<i>Zygina flammigera</i> Fourcroy, 1758	نطاط أوراق التفاح

ان من اهم القافزات من عائلة Cicadellidae في العراق والبلاد العربية ما يأتي:

1- قافز اوراق العنب The Grapevine Leafhopper

Zygina hussaini Ghaure

الانتشار: - ينتشر في اوربا واسيا وأفريقيا ومنطقة حوض البحر المتوسط وفي الوطن العربي في كل من لبنان والعراق وسوريا وفلسطين ومصر وتونس وليبيا وتنتشر في العراق في مناطق زراعة العنب خصوصا في المحافظات الشمالية والوسطى.

الوصف: - البيض : بيضوي ابيض يصفر فيما بعد وطوله 0,52 ملم.

الحورية: مشابهه للكاملة في الشكل عدا ان الاجنحة غير كاملة التكوين لونها بعد الفقس ابيض يصفر في الطور الثالث.

الحشرات الكاملة: طولها حوالي 3 ملم رمادية وتوجد بقعتان بنينتان غامقتان بين العيون المركبة واخريان على الصدر.

تاريخ الحياه: - تقضي الحشرة سباتها الشتوي على شكل حشرات كاملة بين الاوراق والاعشاب وتنشط مع ظهور الاوراق الجديدة في الربيع حيث تنتقل اليها وتتغذى بامتصاص عصارتها لمدة 2-3 اسابيع ثم تبدأ الاناث في وضع البيض في انسجة الورقة خصوصا في العروق الرئيسية على السطح السفلي ويبلغ متوسط بيض الانثى 100 بيضة. يفقس البيض بعد 1-3 اسابيع وتخرج الحوريات للتغذي على امتصاص عصارة النبات. للحوريات خمسة اعمار تبقى على السطح السفلي للأوراق الى ان يكتمل نموها في مدة 2-5 اسابيع وللحشرة (8) اجيال في العراق.

الضرر: - ينتج من تغذية الحوريات والحشرات الكاملة تبقع الاوراق ببقع بيضاء فضيه صغيرة تتحول الى بنيه فيما بعد. وتتجدد حوافي الاوراق

وتصغر ويضعف النبات ويقل المحصول وتصبح نوعيته رديئة وتتساقط الأوراق وفي بعض البلدان مثل إيطاليا ويوغوسلافيا تنقل هذه الحشرة بعض الأمراض الفايروسية للعنب مثل مرض يسمى (Peairs disease)

2- قفاز الأوراق الأخضر (قفاز القطن) *The Green Leafhopper* *Empoasca lybicus* (Berg.)

سجل في العراق عدة انواع من القافزات للأوراق أكثر من (31) نوعا ولها اهمية اقتصادية. وتصيب انواعا عديدة من محاصيل الخضر وبعض المحاصيل الحقلية، ينتشر في شمال ووسط العراق وتصيب المحاصيل البقولية وخاصة الباقلاء والبزاليا واللوبياء.

الوصف:- الحشرة الكاملة: طولها من 2,5 - 3,5 ملم لونها اخضر والاجنحة الامامية خضراء والاجنحة الخلفية شفافة وعريضة. ساق الرجل الخلفية طويل ويحمل صفا من الاشواك.

الحورية: عند الفقس طولها 1ملم وتمر بخمسة ادوار حورية لون الحورية في الدورين الاول والثاني ابيض شفاف وفي الادوار الاخرى اخضر باهت. البيضة: بيضاء اللون مقوسه قليلا طولها حوالي 1 ملم.

تاريخ الحياه:- يوضع البيض داخل العرق الوسطي والعروق الجانبية للأوراق وكذلك في الانسجة التي بينها. وقد يوضع البيض في بعض الاحيان في اعناق الاوراق او في اطرافها وللعائل تأثير في عدد البيض الذي تضعه الانثى المخصبة. يفقس البيض عن حوريات تمر بخمسة اطوار وتتسلخ اربعة انسلاخات ويستغرق الطور الحوري حوالي 15 يوما. وتتغذى الحشرات الكاملة والحوريات على السطح السفلي للأوراق وتفضل الجانب الظليل من النبات.

وتعيش في مجموعات على عوائلها وتتزاوج الذكور والاناث وتعيد دوره الحياة التي تستغرق من 6-10 اجيال في السنة.

3- قافزات اوراق السمسم *Sesame Leafhoppers*

في السابق كان يعتقد ان انواع من قافزات الجنس *Empoasca* spp تصيب اوراق السمسم، الا ان دراسة حديثة اظهرت وجود اربعة انواع من القافزات تصيب السمسم في ابو غريب في بغداد، هذه الانواع الأربعة ثلاثة منها تعود لعائلة Cicadellidae هي

أ- *Orosius albicinctus*

ب- *Balclutha hortensis*

ت- *Neoalilurus haemaloceps*

اما النوع الرابع *Sagatella vibix* فيعود لعائلة Delphacidae. تتميز الانواع الثلاثة الاولى بوجود صفيين من الاشواك على كل ساق من الارجل الخلفية في حين ان النوع الرابع *S. vibix* يتميز بوجود مهماز متحرك Spur ذو اسنان دقيقة يقع عند قاعدة ساق الرجل الخلفية. يتميز النوع الاول *O. albicinctus* بجسمه البالغ 3 ملم ولونه البني اما النوع الثاني *B. hortensis* بحجمه كالسابق ولكن لونه اخضر اما النوع الثالث *N. haemaloceps* فأصغر قليلا من البقية ولونه اصفر. اما النوع الاخير *S. vibix* فبجانب وجود الشوكة او المهماز المتحرك فان حجمه مقارب للأنواع الاخرى ولونه بني فاتح. هذه القافزات لا زال ينقصها الكثير من الدراسات البيئية والحياتي والاقتصادية تحت ظروف العراق.

ثانياً) عائلة القافزات الضفدعية Cercopidae

وهي العائلة الثانية من مشابهات السيكاذا وتسمى أيضاً بعائلة بق البصاق او الرغوة Spittle bugs وذلك لان الطور الحوري فيها يكون محاطا بمادة لزجة بيضاء ذات رغوة تشبه البصاق تسمى بالرغوة Froth. ان عملية انتاج الرغوة يتم من قبل الحوريات التي تقوم بثقب الانسجة النباتية وامتصاص كميات كبيرة من العصارة النباتية حيث يتم ترشيحها في غرفة الترشيح حيث تستخدم السوائل الفائضة في انتاج المادة الرغوية Froth. هناك مجموعة اخرى من حشرات هذه العائلة تعود لتحت عائلة Machaerotinae تسمى بال Tube spittle bugs او بق الرغوة الانبوبي وذلك لان حوريات هذه المجموعة تعيش في انابيب كلسية (كاربونات الكالسيوم) فضلا عن انتاجها الرغوة كما في بقية انواع العائلة، ان الرغوة المحيطة بأجسام الحوريات تعمل على حماية الحوريات من مهاجمة الاعداء الطبيعية من طفيليات ومفترسات، فضلا عن حمايتها من الظروف البيئية غير المناسبة من حرارة وبرودة، وان عدم وجود الرغوة في الاجواء الحارة والجافة قد يعرض الحوريات الى الموت جفافا نتيجة فقدانها السريع لماء الجسم. بالغات هذه العائلة تسمى بالقافزات الضفدعية لان شكلها يشبه الضفدع. لبالغات هذه العائلة القدرة على القفز لارتفاع يزيد عن 70 سم. هذه العائلة تضم ما يقرب من 2500 نوع موصوف تعود لـ33 جنس، انواع هذه العائلة تنتشر في المناطق الاستوائية والمعتدلة. انواع قليلة منها تعد افات زراعية مهمة وخطيرة في بعض البلدان منها بق الرغوة ذو الخطين او الشريطين Too-lined spittle bugs المعروفة بالاسم العلمي *Prosapia bicincta* الذي يعد افة على الثيل في فلوريدا. في الوطن العربي

وبالرغم من وجود العديد من انواع هذه العائلة (الجدول 8-2) الا ان المعلومات المتوفرة عنها وعن اهميتها الاقتصادية لا زالت قليلة وتحتاج المزيد من الدراسة والبحث.

القافزات الضفدعية في البلاد العربية

Froghoppers in Arab World

من الجدول (8-2) يبين ان هناك أكثر من 15 نوعا من القافزات التابعة لعائلته Cercopidae التي تهاجم العديد من النباتات وبالرغم من ذلك فان الدراسات والمعلومات المتوفرة عن هذه الانواع لا زالت قليلة.

الجدول (8-2) الاسماء العلمية والعربية الشائعة لأنواع القافزات من عائلته

Cercopidae في البلاد العربية

الاسماء العلمية	الاسماء العربية الشائعة
<i>Cercopis vulnerata</i> Rossi, 1807	جندب الضفدع الاحمر والأسود
<i>Empoasca solani</i> Curtis, 1846	قافزة اوراق الحديقة الجنوبية، نطاط الحديقة الجنوبي
<i>Erythroneura elegantula</i> Osborn, 1928	جندب ورق التفاح المخطط، جندب ورق العنب، نطاط اوراق العنب
<i>Erythroneura mori</i> Matsumura, 1915	جندب بقعة الدم
<i>Eupteryx stellulata</i> Burmeister, 1841	جندب ورق الكرز
<i>Euscelis obsoletus</i> Kirschbaum, 1858	جندب ورق التفاح
<i>Euscelis</i> sp	جندب ورق الفريز
<i>Fascifrons fascifrons</i> Stal, 1859	الجندب ذو البقع الست، نطاط الاوراق ذو الست نقط
<i>minella</i> sp	جندب ورق الحبوب
<i>Idiocerus stali</i>	جاسيد اوراق الفستق الحلبي، سيكادا الفستق، نطاط

Fieber, 1868	اوراق الفستق الحلبي، نطاط الفستق
<i>Lepyronia quadrangularis</i> Say, 1825	البقة ذو البصاق ذات الظهر الماسي
<i>Neoliturus haematoceps</i> Mulsant &Rey, 1855	قفاز السمسم
<i>Nephotettix sp</i>	جندب الورق الأخضر
<i>Orosius albicinctus</i> distant, 1918	قفاز السمسم، نطاط السمسم
<i>Philaenus spumarius</i> Linnaeus, 1758	الباصوق، الباصوق العادي، بقعة المروج
<i>Prosapia bicincta</i> Say, 1830	البقة الباصقة ذو الخطين
<i>Typhlocyba pomaria</i> McAtee, 1926	جندب ورق التفاح الابيض، نطاط التفاح الابيض، نمر اللوز
<i>Typhlocyba quercus</i> Fabricius, 1777	جندب ورق الاشجار المثمرة
<i>Zygina hussaini</i> Ghauri, 1963	قفاز اوراق العنب، قفاز العنب، نطاط اوراق العنب
<i>Zygina lubiae</i> China, 1931	نطاط الورق
<i>Zygina pallidifrons</i> Edwards, 1924	جندب ورق البيوت الزجاجية

Syptoms and Damage

الاضرار ومظاهر الإصابة

ان افراد هذه العائلة وكما هو الحال في بقية حشرات نصفية الاجنحة تتغذى بامتصاص عصارة النبات بكميات كبيرة في اجزاء النبات المختلفة مما ينتج عنها موت نهايات الافرع Die back خاصة في الاجواء الجافة والحارة كما ان البعض من انواع هذه العائلة يتغذى على الجذور فيما انواع اخرى تتغذى على الاجزاء الخضرية فوق سطح التربة. ان من اهم مظاهر الإصابة المميزة لهذه الحشرات هو وجود الافرازات الرغوية حول الحوريات فضلا عن وجود الانابيب او الاكياس الكلسية في انواع تحت عائلته Machaerotinae فضلا

عن مظاهر ضعف النبات وموت الافرع وتساقط الاوراق. لحشرات هذه العائلة نوع من التفضيل الغذائي حيث وجد ان بعض انواع Cercopids تفضل النباتات المثبتة للنيتروجين كبعض مغطاة البذور وبعض الحشائش، وان بعض الانواع التابعة لتحت عائلة Clastopteridinae تفضل التغذية على النباتات التي ترتبط بعلاقة تعايشية مع البكتريا *Actinorhizal* فيما تفضل انواع اخرى النباتات البقولية. تعد حشرات هذه العائلة افات مهمة وخطيرة في العديد من بلدان العالم على نباتات المراعي والثيل والقصب السكري والذرة.

تاريخ الحياة العام

General Life History

في دراسة لحياتيه وسلوكية 9 انواع من الـ Cercopids (الجدول 8-3) حيث وجد ان طور البيضة. في كل نوع من الانواع التسعة يمر بأربعة مراحل مختلفة يمكن تمييزها مظهريا فضلا عن زيادة الحجم بين مرحلة واخرى وان فتره حضانة البيض تراوحت بين 1،14-18 يوم في الانواع التسعة الجدول (8-3) وان الاناث كانت تفضل وضع البيض في التربة، يفقس البيض عن حوريات صغيرة تتسلخ اربعة انسلاخات ولها خمسة اعمار ويمكن تمييز الانواع الحورية من خلال اعتماد عدد من الصفات منها عرض كبسولة الرأس، طول الجسم، طول الرمح وطول برعم الجناح الامامي، وتعد صفة عرض كبسولة الرأس هي الاكثر استخداما في تمييز هذه الاعمار. تتباين فتره الطور الحوري حسب النوع الحشري حيث يتضح من الجدول (8-3) ان فتره هذا الطور تتراوح بين 1،26-5،64 يوم في الانواع التسعة ويعد هذا الطور هو اطول الاطوار واستغرقت دورة الحياة بالكامل للأنواع المدروسة ما بين 3،45-9،74 يوما.

الجدول (3-8) دورة الحياة وفتراتها واماكن وضع البيض لتسعة انواع

كولومبية من بق الرغوة

% تفضيل موقع وضع البيض		فترة الطور بالأيام					النوع
سطح النبات	الاوراق المساقطة	التربة	المجموع	بالغة	حورية	بيض	
14.6	5.7	79.7	52.6	6.2	35.4	14.1	<i>Aeneolamia lepidior</i>
1.4	8.2	90.4	45.3	6.8	26.1	15.8	<i>Aeneolamia reducta</i>
0.7	1.70	97.6	51.6	7.2	30.8	17.2	<i>Aeneolamia Varia</i>
3.3	22.7	74	64.6	6.8	44.2	17	<i>Mahanarva sp</i>
32.4	صفر	67.6	74.9	24	46.5	16.4	<i>Mahanarva andigens</i>
82.6	صفر	17.4	72.5	17.8	45.6	18	<i>Prosapia simulans</i>
صفر	0.6	99.4	69.6	19.6	42.4	17.4	<i>Zulia carbonaria</i>
59.2	0.4	40.4	61.5	18.4	38	14.3	<i>Zulia pubescens</i>
صفر	صفر	100	64.4	14.2	42.7	14.6	<i>Zulia sp</i>

تقضي الحشرة فترة الشتاء بطور البيض داخل السيقان المجوفة وتحت اغماد الاوراق او بين مخلفات الاوراق، وفي الربيع يفقس البيض عن حوريات صغيرة تبدأ بالبحث عن اماكن محمية ورطبه حيث تبدأ بالتغذية وافراز كتل الرغوة البيضاء وتستمر الحورية بالتغذية والانسلاخ 4 مرات قبل التحول الى حشرات كاملة تكون الذكور أصغر من الاناث اللذان يتزاوجان حيث تبدأ الاناث بعدها بوضع البيض، للحشرة جيلين في السنة. ان فترة حضانة البيض وفترات

الاعمار الحورية وبالغات وعدد الاجيال تعتمد على النوع الحشري والعائل الغذائي والظروف البيئية للمنطقة الجغرافية التي توجد فيها الحشرة.

Stages Description

وصف الاطوار


الحشرات الكاملة لهذه العائلة تشبه قافزات الاوراق يتراوح طولها بين 3-27 ملم حتى نهاية الجناح ذات ألوان براقه تتراوح بين الاحمر والاحمر البرتقالي والاصفر والاسود هي ألوان تحذيرية غالبا مايرافقها حدوث نرف انعكاسي Reflex Bleeding. ان ما يميز حشرات هذه العائلة عن بقية القافزات هو وجود 1-2 شوكة قوية جانبية على ساق الرجل الخلفية اضافة الى صفوف من الاشواك المتضخمة كذلك فان ساق الرجل الخلفية تكون أقصر من تلك الموجودة في قافزات الاوراق فضلا عن لقمة ساق الرجل الخلفية تاج من اشواك شعاعيه متضخمه. (الشكل 8-3). لحوريات هذه العائلة ترجات بطنية تمتد للأسفل مكونة لوحة عريضة متدلّية على جانبي البلورا حيث تسهم بشكل جزئي في تكوين الانبوب التنفسي الذي يسهم في انتاج الرغوة اضافة الى وظيفته التنفسية.

For comparison . . .

Cicadellidae

vs

Cercopidae



الشكل (3-8) للمقارنة بين الحشرات سيكادية المظهر من Cicadellidae

Cercopidae،

ثالثاً عائلة قافزات الأشجار Membracidae

Family Membracidae (Treehoppers)

وهي العائلة الثالثة من عوائل القافزات الشبيهة بالسيكادا Cicadomorpha

وان تسميتها بقافزات الأشجار ربما يرجع الى تخصصها في مهاجمة الأشجار

والشجيرات. في الوطن العربي لم يسجل سوى نوعين ينتميان لهذه العائلة هما:

Stictocephala bisonia

نطاط الأشجار الاصفر البرتقالي

Stictocephala bufalus

نطاط الأشجار الجاموسي

ان المعلومات المتوفرة عن النوعين السابقين محدودة جدا بالمنطقة العربية

وتحتاج هذه العائلة المزيد من الدراسة والبحث.

ادارة الحشرات القافزه Hopper Insect Management

ان فلسفه اداره الحشرات القافزة تعتمد على استراتيجيتين الاولى تقوم على انتاج نباتات قوية تستطيع ان تعوض ما تمتصه حوريات وكاملات القافزات من عصارة نباتيه اما الثانية فتقوم على حماية الاعداء الطبيعة للقافزات من خلال الاستخدام العقلاني للمبيدات، هذه الاستراتيجيات يمكن تحقيقها من خلال التكامل بين الطرائق الأتية:

أولاً) الطرائق الزراعيه:- وتشمل

1- الري والتسميد : ان تنظيم عمليات الري والتسميد يساعد على انتاج نباتات سليمة وقوية تتحمل الإصابة.

2- التقليل: ان تربية الاشجار بشكل يسمح بدخول الضوء واشعه الشمس من خلال عملية التقليل يقلل من الإصابة بالقافزات التي تفضل الاماكن المحمية.

3- ازالة الادغال والاعشاب التي تعد عوائل ثانوية للقافزات.

4- زراعه الاصناف المقاومة والمتحملة من المحاصيل للقافزات.

ثانياً) الطرائق الفيزيائية:

1- ازالة الاوراق المتساقطة وحرقتها او دفنها للتخلص من البيض واطوار التشتية لخفض الإصابة في الموسم التالي.

2- استخدام الحواجز والاعطية في المشاتل لمنع وصول الحشرات الى الشتلات والنباتات الصغيرة.

3- الرش بتيار ماء قوي لإزالة الحوريات الموجودة على النبات.

ثالثاً) **المكافحة الحيوية:** لقد سجل وجود العديد من الاعداء الطبيعية على الكثير من القافزات ذات الاهمية الاقتصادية اذ نجد ان القافزات من عائلة السيكاذيلىديا تهاجم من قبل العديد من المفترسات الحشرية مثل البق السفاح **Assassin bugs** والزنابير والذباب السارق والرعاشات وفرس النبي والعناكب كما تشكل مصدر غذائي مهم للعديد من الفقريات مثل الطيور والزواحف، فضلا عن مهاجمتها من قبل العديد من الطفيليات مثل زنابير عائلة **Dryinidae** والـ **Mymaridae** وذباب عائلة **Pipunculidae** و **Strepsiptera** اما القافزات من عائلة **Cercopidae** فقد سجل اصابتها ايضا بالعديد من الطفيليات منها الحلم المتطفل من عائلة **Erythraeidae** والديدان الثعبانية المتطفلة من عائلة **Mermethidae** فضلا عن مفترسات مثل يرقات الذباب من عائلة **Syrphidae** وبالغات ذباب عائلة **Asilidae** وغيرها من المفترسات العامة. ان الطفيل **Anagrus atomus** يكاد يكون هو الطفيل الوحيد التابع لعائلة **Mymaridae** من رتبة غشائية الاجنحة التي تم انتاجها تجاريا لمكافحة بعض انواع عائلة **Cicadellidae** وبالأخص النوعين:

Empoasca decipiens paoli

Hauptidia marrcana melicher

هذا الطفيل يتم انتاجه تحت ظروف مسيطر عليها على بيض قافزات الاوراق ويستخدم لمكافحة قافزات الاوراق في الزراعة المغطاة على الطماطه والفلفل ونباتات الزينة، حيث تقوم اناث الطفيل بوضع بيضها داخل بيض القافزات حيث يفسد عن يرقات تتغذى على محتويات بيض القافزات، ثم تعذر داخلها وبعد تحولها الى حشرات كاملة تخرج من البيضة لتتزاوج ثانية وتعيد دورة

الحياة. يتوفر هذا الطفيل بشكل عذاري داخل بيض متطفل عليه حيث يمكن نشرها في اي وقت من الموسم داخل البيوت البلاستيكية.

رابعاً) **المكافحة الكيميائية:** - اظهرت معظم مبيدات الحشرات فاعليه جيدة في مكافحة القافزات وخاصة مبيدات البايروثرويد المصنعة وان المحافظة على الاعداء الطبيعية يتطلب ما يأتي:

- 1- استخدام مبيدات حشرات جهازية
- 2- استخدام المبيدات بتركيز منخفضه تعمل على قتل القافزات من دون التأثير في الاعداء الطبيعية للقافزات
- 3- توقيت عمليات الرش بما يحقق اقل ضرر ممكن في الاعداء الطبيعية للقافزات.

الفصل التاسع

قافزات النبات المتألقة او الفلكوريدية المظهر

المقدمة

مميزات فوق عائلة **Fulgoroidea** وعائلاتها

القافزات المتألقة في البلاد العربية

القافزات المتألقة، انتشارها واهميتها الاقتصادية

القافزات المتألقة، الاضرار ومظاهر الاصابة

وصف اطوار القافزات المتألقة

عائلات القافزات المتألقة في الوطن العربي

عائلة **Delphacidae**

عائلة **Fulgoridae**

عائلة **Tripiduchidae**

ادارة القافزات المتألقة

المقدمة

لاحظنا في الفصل السابع ان تحت رتبة Auchenorrhyncha انها تنقسم الى مجموعتين هي مجموعة مشابهات السيكاذا Cicadomorpha والتي تضم حشرات السيكاذا والقافزات المشابهة مظهريا للسيكاذا، اما المجموعة الثانية فتضم ما يعرف بقافزات النبات المتألقة او الشبيهة بحشرات الفلوريديا الـ Fulgoromorpha. هذه المجموعة تضم فوق عائلة واحدة هي الـ Fulgoroidea المعروفة باسم قافزات النبات Planthoppers حيث تضم مجموعة كبيرة من الحشرات نباتية التغذية والتي تنتشر في جميع انحاء العالم، ان فوق عائلة Fulgoroidea تضم لحد الان أكثر من (12) ألف نوع موصوف. ان تسمية هذه الحشرات بقافزات النبات يشير الى مهاجمتها اوراق معظم النباتات بشكل عام سواء كانت اشجارا او شجيرات او محاصيل حقلية ومحاصيل خضر وغيرها من النباتات. ان مهمة هذا الفصل هو تسليط الضوء على اهم الجوانب البيئية والحياتية والاقتصادية لهذه المجموعة من الآفات الحشرية.

مميزات فوق عائلة Fulgoroidea وعائلاتها

Fulgoroidea Characteristics and Their Families

أشرنا سابقا الى ان الـ Fulgoroidea تضم مجموعة كبيرة من الانواع المميزة عن بقية حشرات رتبة نصفية الاجنحة، اذ ان ما يميز مجموعة الـ Fulgoroidea او قافزات النبات المتألقة هو:

1-) تفرع العرق الشرجي Anal vein للأجنحة الامامية ليصبح بشكل حرف

Y.

2-) تتضخم عقل قرن الاستشعار الثلاثة، والعقلة الثانية ذات شكل بيضوي والتي تحمل شوكة اريستية خيطية دقيقة.

القافزات المتألقة في البلاد العربية

Fulgoromorpha In Arab World Countries

لقد سميت هذه الحشرات بالقافزات المتألقة او الفلکوريدية وذلك لقدرة حورياتها على انتاج مادة شمعية من غدد خاصة توجد على ترجات البطن وعلى اجزاء اخرى من الجسم حيث تحيط هذه المادة الشمعية اجسام الحشرة فضلا عن وجود بقع على اجسامها تومض ليلا يعطيها المظهر الذي يخيف الاعداء الطبيعية، هذه المادة الشمعية تستخدم ايضا في تغطية البيض وحمايته.

تضم القافزات المتألقة احدى عشر عائلة تعود جميعها لفوق عائلة Fulgoroidea او المتألقات وهي:

- 1) Fam: Acanaloniidae
- 2) Fam: Achilidae
- 3) Fam: Cixidae
- 4) Fam: Delphacidae
- 5) Fam: Derbidae
- 6) Fam: Dictyopharidae
- 7) Fam: Flatidae
- 8) Fam: Fulgoridae
- 9) Fam: Issidae
- 10) Fam: Kinnaridae
- 11) Fam: Tropiduchidae

ان مجموع الانواع من القافزات المتألقة في البلاد العربية يصل الى 11 نوع تتوزع على ثلاث عائلات وكما يأتي:

- 1) Family : Delphacidae تضم سبعة انواع

2) Family : Fulgoridea تضم نوعان فقط

3) Family : Tropiduchidae تضم نوعان فقط

ان الانواع الموجودة في البلاد العربية لم تدرس بشكل جيد وان النوع الوحيد الذي تم دراسته بشكل جيد هو حشرة دوباس النخيل *Ommatissus binotatus* التي تهاجم النخيل في مناطق زراعته، ان الجدول (9-1) يوضح عائلات القافزات المتألقة وانواعها في البلاد العربية.

الجدول (9-1) عائلات القافزات المتألقة وانواعها واسماؤها العلمية والعربية الشائعة في البلاد العربية

العائلة	الاسماء العلمية	الاسماء العربية الشائعة
Delphacidae	<i>-Laodelphax striatellus</i> Fallen, 1826 <i>Nilaparvata lugens</i> stal, 1854 <i>Peregrines maidis</i> Ashmed, 1890 <i>Perkinsiella saccharicidia</i> Kirkaldy, 1903 <i>Pyrilla</i> sp <i>Sogatella frucifera</i> Horvath, 1899 <i>sogatella vibix</i> Haupt, 1927	جندب النباتات الصغيرة البني اللون جندب الارز البني، قافزة اوراق الارز البنية، نطاط الارز البني، نطاط النبات البني جندب الذرة، جندب الشعير نطاط اوراق القصب الصيني نطاط اوراق القصب الجندب الابيض الظهر، نطاط اوراق الأرز قفاز السمسم
Fulgoridae	<i>Asarcopus palmarum</i> Horvath, 1921 <i>Hysteropterum flavescens</i> Olivier, 1971	بقة النخيل، حشرة النخيل الامريكية، دوباس النخيل، نطاط اوراق نخيل التمر نطاط البرسيم الحجري، مطاط الزيتون، نطاط الفصاة
Tropiduchidae	<i>Ommatissus binotatus</i> Fieber, 1876	بقة تمر العالم القديم، حشرة الدوباس، حشرة دوباس النخيل، حشرة عسلية النخيل، دوباس النخيل، عسلية النخيل،

	<p><i>Ommatissus lybicus</i> Bergevin</p>	<p>عسيلة النخيل دوباس النخيل</p>
--	---	--------------------------------------

القافزات المتألقة، انتشارها وأهميتها الاقتصادية

Fulgoroidea ، Distribution and Economic Importance

تنتشر القافزات المتألقة في جميع انحاء العالم الا انها تفضل بشكل رئيس المناطق الاستوائية الا ان هذا لا يعني عدم وجود بعض الانواع التي تكيفت للعيش في المناطق الصحراوية والجافة فضلا عن العيش في المناطق الباردة. ان الانتشار الجغرافي الواسع لهذه المجموعة هو توزيع غير متساوي حيث تختص بعض العائلات بمناطق جغرافية معينة فيما عائلات اخرى تفضل مناطق اخرى مثال ذلك نجد ان العائلات مثل Acanaloniidae و Achilidae غير موجودة في الـ Palearctic. ان الكثير من انواع القافزات المتألقة تعد افات مهمة على العديد من المحاصيل الزراعية المهمة حول العالم. ان الاهمية الاقتصادية لهذه المجموعة من الحشرات يمكن تلخيصها في النقاط الآتية:

1- تغذية حوريات وبالغات انواع هذه المجموعة من الحشرات بامتصاص الغذاء من انسجة اللحاء يجعل منها متطفلات أكثر ضررا من تلك التي تتغذى على امتصاص العصارة من الاوعية الخشبية وذلك لأنها تتغذى على الغذاء المجهز من قبل النبات.

2- ان العديد من انواع القافزات المتألقة ذات قدرة على نقل العديد من مسببات المرضية فبعض انواع عائلة Cixidae تعد ناقلات جيدة للفايتوبلازما Phytoplasma كما تعد بعض انواع عائلة

Delphacidae ناقلات رئيسية لبعض الفيروسات، هذه المسببات المرضية تسبب اضرار مهمة وخطيرة لكثير من المحاصيل المهمة اقتصاديا.

(3-) تعد القافزات واحدة من المعوقات المهمة لنجاح الثورة الخضراء في المناطق الاستوائية.

(4-) في جنوب شرق اسيا قدرت الخسائر التي سببتها القافزات بمئات الملايين من الدولارات، اذ ان محصول الرز في اسيا والذي يقوم بإطعام 60% من سكان العالم يتعرض الى الضرر وبشكل خاص من مهاجمة افراد عائلة Delphacidae خاصة قافز الرز البني *Nilaparvata lugens* الذي يعد الافة الاكثر اهمية على الرز في اسيا، وفي الصيف بلغت اضرار القافزات على محصول الرز في عام 2005 2,8 مليون طن.

(5-) الظهور السريع لمقاومة المبيدات في هذه القافزات للمبيدات الجهازية خاصة المبيد Imidacloprid وذلك نتيجة الاستخدام المكثف للمبيدات مما زاد من الاهمية الاقتصادية لهذه الحشرات.

القافزات المتألقة، الاضرار ومظاهر الاصابة

Fulgoroidea ، Symptoms and Damages

ان من اهم الاضرار ومظاهر الاصابة الناتجة على النباتات المصابة بهذه المجموعة من القافزات هي ما يأتي:

(1-) الاصفرار Yellowing: اذ تؤدي تغذية حوريات وناقلات القافزات على انسجة لحاء عوائلها النباتية الى اصفرار الاوراق وتساقطها فضلا عن اعراض حروق الاوراق المسماة hopperburn.

- 2-) التقرم Stunting: ويحصل ايضا نتيجة تغذية حوريات وكاملات القافزات، كما قد تكون بسبب عوامل مرضية خاصة الفايروسات.
- 3-) وضع اناث الحشرة للبيض في سيقان النبات العائل حيث تشكل اماكن يمكن ان تدخل من خلالها بعض المسببات المرضية.
- 4-) تعد القافزات ناقلات للعديد من المسببات المرضية وخاصة الفيروسات.

وصف اطوار القافزات المتألقة

Fulgoroidea Stages Description

الحشرات البالغة صغيرة الحجم وتتراوح اطوالها ما بين 3-15 ملم، ماعدا بعض انواع عائلة Fulgoridae حيث يصل طولها الى 10 سم، ويبلغ مع امتداد الأجنحة الى 14,5 سم ومن السهولة بمكان تمييز هذه الحشرات بوجود الصليبه القاعدية العلوية للجناح الامامي Telgula على الصدر الاوسط، فضلا عن تضخم العقلة الثانية لقرن الاستشعار وهي عقلة ساق قرن الاستشعار Pedicel، هذه العقلة تتضخم احيانا لتصبح بشكل البصلة كما تحمل هذه العقلة عضو حسي صفائحي او لوجي Placoid sensilla.

تختلف ألوان بالغات القافزات من اللون البني الى الرمادي وهذا يعتمد بشكل رئيس على وجود او غياب المواد الشمعية كما تمتاز البالغات بوجود بقع او مساحات داكنة على النصف القاعدي للجناح الامامي. اما الحوريات فتختلف احجامها باختلاف العمر الحوري ونوع العائل الغذائي وان الحوريات البالغة يصل طولها الى 4 ملم تقريبا.

عائلات القافزات المتألقة في الوطن العربي

Fulgoroidea Families In Arab Countries

لاحظنا من الجدول (9-1) ان هناك ثلاثة عائلات من أصل احد عشر عائلة

سجل وجود انواع لها في البلاد العربية Fulgoroidea تعود لفوق عائلة عائلة وهي كما يأتي:

Family: Delphacidae عائلة ديلفاسيدي

انواع هذه العائلة من المتغذيات على اللحاء وتتميز بوجود مهماز كبير وواضح يتمفصل مع نهاية ساق الرجل الخلفية، وفي بعض الانواع يكون هذا المهماز Spur بطول رسغ الرجل (الشكل 1-9) كما تتميز ايضا بطول العقلة القاعدية لقرن الاستشعار مقارنة ببقية حشرات تحت رتبة Auchenorrhyncha وان هذه العقلة تحمل اشواك قصيره. تضم هذه العائلة عدد من الانواع التي تحدث اضرار متباينة في عوائلها النباتية (الجدول 1-9) ومن هذه الانواع ما يأتي:



الشكل (1-9) نهاية ساق الرجل الخلفية لحشرات Delphacidae ومكان

اتصال المهماز Spur

(-1) قافز الرز البني (BPH) Brown Paddy Hopper

واسمه العلمي *Nilaparvata lugens*





Fig. 45. *Nilaparvata lugens* (Adult).

تاريخ الحياة: - هذا القافز يعد افة رئيسية على الرز في مناطق زراعته، والذي يعد غذاء رئيسا لأكثر من 60% من سكان العالم، تضع اناث هذه الحشرة بيضها بشكل مجاميع داخل اغماد الاوراق وعلى العرق الوسطي للورقة، وان كل انثى تضع ما يقرب من 200 بيضة، وان فترة الجيل فيها يستغرق من 2-3 اسابيع. تتغذى حوريات وبالغات الحشرة عند قواعد سيقان الرز بشكل مستعمرات كثيفة فوق مستوى الماء مباشرة بامتصاص العصارة النباتية حيث تؤدي تغذيتها الى اضعاف النبات كما تقوم هذه الحشرة بنقل فايروس Tungro الذي يتسبب في ظهور اعراض الاصفرار على الاوراق في مناطق تكاثره وانتشاره، وقبل ستينات القرن العشرين لم يكن هذا القافز يشكل خطرا على زراعات الرز مقارنة بقافز اوراق الرز الاخضر من عائلة Cicadellidae وسبب ذلك يرجع الى الثورة الخضراء التي تبنت نشر زراعة اصناف الرز ذات الانتاج العالي والحساسة جدا لقافز الرز البني مما جعله فيما بعد افة رئيسة على الرز.



الشكل (2-9) A5، A4 منظر علوي وامامي للعمر الحوري الخامس لقافز

الرز البني

2- قافز قصب السكر Sugar cane Planthopper

اسمه العلمي *Perkinsiella saccharicida* هذا النوع يصيب قصب السكر في امريكا الجنوبية وجنوب افريقيا والمناطق الاستوائية من اسيا وسجل وجوده في استراليا وهاواي. ان الضرر الذي يسببه هذا النوع يتمثل في امتصاص عصارة النبات فضلا عن الجروح التي تسببها آله وضع البيض للنبات، كما تقوم الحشرة بنقل مرض Fiji لقصب السكر.

تاريخ الحياه:- تبدأ الاناث بوضع البيض ليلا عن طريق غرز اله وضع البيض في النسيج النباتي وبواقع 10-15 بيضه لكل غرزة او شق ليصل

عدد البيض الذي تضعه الانثى الواحدة لما يقرب من 200 بيضه وذلك خلال فترة حياه الانثى التي تستغرق ثمانية اسابيع، ان افراز الندوة العسلية قد يعمل على نمو فطريات العفن الاسود Sootymoulds على نباتات القصب، البيض يفقس خلال 2-6 اسابيع ويستغرق نمو الاعمار الحورية الخمسة من 20-40 يوما ، للحشرة من 5-6 اجيال في السنه.

ثانياً) عائله فلكوريدي Family : Fulgoridae

هذه العائلة تسمى بذباب المصباح Lanteenflies وتمتاز انواع هذه العائلة بحجم رأسها الكبير وبوجود بقع او مساحات على جسمها تطلق وميضاً في الظلام ومن هنا جاءت التسمية بقافزات النبات المتألقة. ان الانواع الضارة بالنبات في هذه العائلة قليلة لذلك لم تتل حظها من الدراسة والبحث.

ثالثاً) عائله تروبيديوشيدي Family : Tropiduchidae

هذه العائلة هي الاخرى لم تتل حظها من الدراسة لولا انتماء حشرة دوباس النخيل الى هذه العائلة حيث يعد دوباس النخيل افه مهمه على زراعات النخيل في الوطن العربي وخاصة في العراق. وفيما يأتي عرض لاهم الجوانب البيئية والحياتية لهذه الافه:

حشرة دوباس النخيل

The Dubas or The Old World Date Bugs

(بقة تمر العالم القديم) *Ommatissus binotatus* Berg

تعد حشرة دوباس النخيل من اهم الحشرات الضارة بالنخيل في العراق اذ تنتشر في كل من محافظات بغداد وديالى والانبار وكربلاء وبابل وميسان وذي قار والبصرة والقادسية كما تنتشر في مصر وليبيا والجزائر وتونس

والمغرب والبحرين والسعودية وقطر والولايات العربية المتحدة والسودان وايران واسبانيا والاتحاد السوفيتي والعائل الوحيد لهذه الحشرة في العراق هو نخل التمر بأصنافه العديدة ذكرا كان ام انثى وكذلك بعض انواع نخيل الزينة.

الوصف:

البيضة: مستطيلة الشكل خضراء فاتحة اللون عند اول وضعها وتتحول الى اللون الابيض المشوب بصفرة ثم الى الاصفرار اللماع قبيل موعد الفقس طولها 0,5-، 0,8 ملم وتوجد على مقدمة البيض تعرجات عديدة.

الحورية: اللون العام ابيض تغطيه بعض البقع والخطوط البنية تختلف باختلاف العمر ويوجد في مؤخرة الجسم حزمة من شعيرات عددها 16، يبلغ طول الحورية التامة النمو 2,5-3 ملم، للحورية خمسة اعمار.

الحشرة الكاملة: اللون اخضر مشوب بصفرة. لكل من الانثى والذكر العيون المركبة قهوائية اللون، طول الانثى الكاملة 5-6 ملم ويوجد على حلقتيها البطنيتين الخامسة والسادسة بقعتان سوداوا اللون ونهاية بطنه اقل عرضا من الانثى ويوجد على الجسم ست بقع سوداء موزعة على الراس والصدر.

تاريخ الحياة :- بعد التزاوج تضع الاناث بيضها في داخل نفق مائل في نسيج الخوصة ويبلغ متوسط عدد البيض الذي تضعه الانثى الواحدة 100 بيضة، ويوضع البيض على سطحي الخوصة وكذلك على الجريد. وفي حالة الإصابة الشديدة قد يصل عدد البيض الموضوع على الخوصة الواحدة الى 800 بيضة. يوضع البيض في الجيل الشتوي خلال الاسبوع الثاني من شهر تشرين الثاني ويبدأ هذا البيض بالفقس خلال الاسبوع الاول من شهر نيسان اي يبقى في حالة سكون حوالي 140 يوم. يفقس عن حوريات تستغرق حوالي

(47-50) يوما بعدها تتحول الى حشرات كاملة وتستغرق مدة الجيل الشتوي (203-233) يوما، اما الجيل الصيفي فتبدا الاناث بوضع البيض خلال الاسبوع الثاني من شهر حزيران ويبدأ البيض بالفقس خلال الاسبوع الاول من شهر اب حيث تستغرق دور البيض حوالي 50 يوم والحورية (54-60) يوما والحشرة الكاملة (13-40) يوما ويستغرق مدة الجيل الصيفي من (113-150) يوما. بعد الفقس تتغذى الحوريات بإعمارها الخمسة على امتصاص العصارة وتفضل في تغذيتها الاماكن المظلمة الغضة ويبدأ ظهور مادة الدبس بعد حوالي اسبوع من ظهور الحوريات وبعد ثلاث اسابيع اخرى تصبح قطرات الدبس كروية الشكل داكنة اللون لزجة القوام. بعدها تتحول الحوريات الى حشرات كاملة تفضل الوجود في الاماكن الظليلة من النخلة وتمارس تغذيتها هناك.

الضرر: - تمتص الحوريات والحشرات الكاملة العصارة النباتية مسببة ضعف النخلة وقلة انتاجها. كما ان النفق الذي تصنعه الانثى لوضع البيض في انسجة الخوصة تسبب موت الانسجة النباتية للنفق والمنطقة المحيطة به. وتساعد المادة الدبسية التي تفرزها الحوريات على اصابة الخوص بفطريات العفن الاسود كما ان تراكم الاتربة على هذه المادة يعمل على سد ثغور الورقة ويعطل عملية التمثيل للنخلة، وعند الاصابة الشديدة تسيل المادة الدبسية من النخيل المصاب الى اشجار الفاكهة والخضراوات المزروعة تحت اشجار النخيل، كما ان تراكم الاتربة على الثمار المصابة يؤدي الى تأخر نضج التمر ويكون التمر صغير الحجم ومغطى بمادة لزجة مع تراكم الاتربة والافساخ عليها ولا يصلح التمر المصاب للاستهلاك البشري ويكون سعره

واطنًا. وتؤدي الإصابة الشديدة والمتعاقبة سنة بعد أخرى الى ضعف في نمو النخلة وقلة في انتاجها وقد تؤدي الإصابة الشديدة والمتكررة لعدة سنوات الى موت النخلة.

ادارة القافزات المتألقة Fulgoroidea Management

ان النتيجة الحتمية لاستمرار استخدام مبيدات الحشرات في مكافحة الانواع الاكثر ضررا من القافزات المتألقة مثل قافزات الرز البني ودوباس النخيل وغيرها ادى الى ظهور السلالات المقاومة من الحشرات للمبيدات وان تأخير هذه العملية يتطلب وضع انظمة جيدة لإدارة هذه الحشرات. ان نظام ادارة هذه القافزات يتطلب محاولة التكامل بين طرائق المكافحة المختلفة وذلك بعد تحديد الحد الاقتصادي الحرج لأنواع ذات الاهمية الاقتصادية. ان طرائق المكافحة المتاحة للسيطرة على القافزات هي:

أولاً) الطرائق الزراعية مثل:

- 1- انتاج نباتات قوية تتحمل الإصابة من خلال عمليات خدمة المحصول الجيدة مثل الري او التسميد وكثافة الزراعة
 - 2- تغيير موعد الزراعة تبكيرا او تأخيرا لتجنب الإصابة بالقافزات
 - 3- استخدام الدورات الزراعية ان أمكن
 - 4- زراعة الاصناف المقاومة او المتحملة
- ثانياً) الطرائق الفيزيائية: وتشمل:

1- ازالة الادغال بالحرق او بالحراثة لأنها تشكل عوائل ثانوية او ملاجئ للقافزات.

2- تستخدم الحواجز لمنع الاناث من وضع البيض على سيقان العائل النباتي.

3-) استخدام المصائد الضوئية ليلا وعندما يكون المحصول عرضة لمهاجمة القافزات كما يمكن استخدام المصائد اللاصقة.

4-) في حالة محصول الرز بفضل غمر مراقد البذور ولمدة يوم لمنع إصابة البذور.

ثالثاً) **المكافحة الحيوية:** تتوفر في الطبيعة العديد من الاعداء الطبيعية التي تعمل على خفض اعداد القافزات من هذه الاعداء:

1-) المفترسات: هنالك مجموعة جيدة من المفترسات الحشرية العامة التي تعود للعائلات Nabida و Miridae و Velliidae و Mesovellidae ومن رتبة غمدية الاجنحة الدعاسيق من عائلة Coccinellidae و Staphylinidae اضافة الى المفترسات من العناكب Spiders من مجموعة Phalangids.

2-) الطفيليات: تم تسجيل عدد من طفيليات البيض التابعة لرتبة غشائية الاجنحة من عائلة Trichogrammatidae وطفيليات الحورية وبالغات من عائلة Dryinidae من غشائية الاجنحة وعائلة Pipunculidae من ذات الجناحين والطفيليات من رتبة Strepsiptera.

3-) المسببات المرضية: تم تسجيل الفطرين *Conidiobolus cornatus*، *Beauveria bassiana* على العديد من انواع القافزات المتألقة.

رابعاً) **المكافحة الكيميائية:** يفضل في المكافحة الكيميائية للقافزات ما يأتي:

1-) استخدام المبيدات عند وصول الإصابة بالقافزات الى مستوى الحد الاقتصادي الحرج.

2-) عندما تكون اعداد الاعداء الطبيعية منخفضة

- 3- استخدام مبيدات الحشرات الجهازية لحماية الاعداء الحيوية.
- 4- استخدام المبيدات بتركيز منخفض لحماية الاعداء الحيوية وتأخير ظهور السلالات المقاومة.
- ان قيمة الحد الاقتصادي الحرج المنخفض للقافزات المهمة والتي قد تصل الى حشرة واحدة /ساق يجعل من عملية التكامل عملية صعبة لذلك لا بد من محاولة رفع هذه القيمة لتحقيق التكامل.



المصادر

المصادر العربية

- العزاوي، عبدالله فليح و ابراهيم قدوري و حيدر صالح الحيدري (1990) الحشرات الاقتصادية، جامعة بغداد، دار الحكمة للطباعة والنشر، العراق.
- الملاح، نزار مصطفى (1988) دراسة بيئية لأنواع جديدة من حشرات المن في منطقة الموصل، نشرة فنية، قسم وقاية النبات، كلية الزراعة والغابات، جامعة الموصل.
- الملاح، نزار مصطفى (1990) ملاحظات حقلية اولية عن بيئية وحياتية حشرة من اوراق المشمش في منطقة الموصل، العراق مجلة وقاية النبات العربية 8(1) 1-5.
- الملاح، نزار مصطفى (1998) الاعداء الحيوية وحشرات المن، مجلة صوت الفلاح، العدد 701.
- الملاح، نزار مصطفى (1999) اول تسجيل ودراسة حيوية لنوعين من البق المطرز على محصول زهرة الشمس في العراق، مجلة اتحاد الجامعات العربية والدراسات والبحوث الزراعية، جامعة عين شمس 7(2) 673 - (688)
- الملاح، نزار مصطفى (2006) من السما، صناعة حشرية، مجلة مناهل جامعية، العدد 13: 26.
- الملاح، نزار مصطفى (2010) معجم الملاح في الاسماء العلمية والعربية الشائعة للحشرات الضارة في الوطن العربي، اليازوري للنشر العلمي، عمان، الأردن.

الملاح، نزار مصطفى (2012) اسس وطرائق مكافحة الآفات الزراعية، العلا للطباعة والنشر، موصل -العراق.

الملاح، نزار مصطفى (2012) الغريب في علاقات النمل الحشرية، مجلة مناهل جامعية، العدد 43 : 14-15.

الملاح، نزار مصطفى (2013) معجم الملاح في مصطلحات علم الحشرات، دار ابن الاثير للطباعة والنشر، جامعة الموصل.

الملاح، نزار مصطفى وسعاد ارديني عبدالله (1994) دراسة مقارنة لبعض الجوانب البيئية والمظهرية لحشرتي النمل والمطاط القشريتين، مجلة زراعة الرافدين، 16(1) 187-194.

الملاح، نزار مصطفى وصلاح الدين عبدالقادر (2000) تأثير بعض اصناف التفاح في كفاءة الطفيل *Aphelinus mali* في خفض اعداد حشرة من التفاح القطني - مجلة زراعة الرافدين، 32(4) 155-161

الملاح، نزار مصطفى وصلاح الدين عبد القادر (2014) حشرة لألى الارض، الاهمية والحياتية والمكافحة - الهيئة العامة لوقاية المزروعات، بغداد، العراق.

الملاح، نزار مصطفى وعبد الجبار خليل العبادي (2007) تأثير صنف الكمثرى واعداد البق المطرز وبعض عوامل البيئة في مساحة ونسبه الضرر الناتج عن الاصابة بحشرة البق المطرز بمدينة الموصل، العراق. مجلة زراعة الرافدين 35(4) 116-123.

الملاح، نزار مصطفى وعبد الجبار خليل العبادي (2008) تأثير صنف الكمثرى والاتجاه وبعض العوامل البيئية في النشاط الموسمي لبق

الكمثرى المطرز. كتاب المؤتمر العلمي الزراعي الرابع لكلية الزراعة،
جامعة تكريت 335-342.

الملاح، نزار مصطفى وعبد الرحيم مصطفى (2007) لألى الارض عدو
جديد يشاطرنا رغيف الخبز. مجلة مناهل جامعية، العدد 21 :17-
18.

الملاح، نزار مصطفى ومحمد عبد الكريم محمد (1988) الانتشار الموسمي
لحشرة من التفاف اوراق الكمثرى على اشجار التفاح والكمثرى في
بساتين كلية الزراعة والغابات، حمام العليل. مجلة وقاية النبات
العربية، 6(2)71-75.

الملاح، نزار مصطفى ومحمد عبدالكريم محمد (1999) اول تسجيل لإصابة
بعض اصناف الكمثرى بحشرة من التفاف اوراق الكمثرى الاخضر
Dysaphis reaumuri مجلة التربية والعلم، 38 :13-22.

الملاح، نزار مصطفى، (1999) اول تسجيل ودراسة حيوية لنوعين من البق
المطرز على محصول زهرة الشمس، مجلة اتحاد الجامعات العربية
والدراسات والبحوث الزراعية، جامعة عين شمس، 7(2)673-688.

المصادر الأجنبية

- Abdollahi, G. A. (1988). Influences of the food plants on reproduction of cereal Sunn pest *Eurygaster integriceps* Put.(Het. Scutelleridae) in Karaj. M.Sc. thesis, Tehran University, Tehran, Iran
- Abdollahi, G. A. (1995). Morphological and physiological approaches to the control of Heteroptera of economic importance in Iran. Ph.D. thesis. University of Wales, Cardiff, U.K.
- Adenuga, A.O. & K. Adeboyeke. (1987). Notes on distribution of ant-Homoptera interaction on selected crop plants. Insect Sci. Applic. 8: 239-243.
- Adenuga, A.O. (1975). Mutualistic association between ants and some Homoptera – its significance in cocoa production. Psyche 82: 24-29.
- Afzal, M., S. S. Shaukat, and I. Ahmad. (1982). Taxometric study of the family Scutelleridae Leach (Hemiptera: Pentatomodea) from Pakistan. Orient. Insects 16: 373–383.
- Agarwal, S. B., and H. N. Baijal. (1984). Morphology of male genitalia of Scutellerinae and Pentatominae (Heteroptera) with remarks on inter-relationship within the family Pentatomidae. J. Entomol. Res. 8: 52–60. A
- Ahmad, I., M. Moizuddin, and A. A. Khan. (1979). Generic and supergeneric keys with reference to check list of lower pentatomoid fauna of Pakistan (Heteroptera: Pentatomomorpha) with notes on their distribution and food plants. Suppl. Entomol. Soc. Karachi, Pakistan 4, Part 4: 50 pp.

- Ahmad, I., S. Kamaluddin, and M. Moizuddin. (1980). New status of *Parapoecilocoris* Schouteden 1904 (Pentatomoidea: Scutelleridae: Scutellerinae) with redescription of type species *P. interruptus* (Westwood). Proc. 1st Pakistan Congr. Zool. (B): 203–207.
- Aldrich, J. R., J. E. Oliver, W. R. Lusby, J. P. Kochansky, and J. A. Lockwood. (1987). Pheromone strains of the cosmopolitan pest, *Nezara viridula* (Heteroptera: Pentatomidae). J. Exp. Zool. 244: 171–175.
- Alexandrov, N. (1947–1949). *Eurygaster integriceps* Put. et ses parasites à Varamine. Entomol. Phytopath. Appl. 5: 11–14, 29–41; 6–7; 8–17, 28–47; 8: 13–20, 16–52 [in Persian with French summary].
- Amir-Maafi, M. (1991). An investigation for identifying and efficiency of parasitoid flies of cereal Sunn pest (*Eurygaster integriceps* Put.) in Karaj, Iran. M.Sc. thesis, Tehran University, Tehran, Iran [in Persian with English summary]
- Ammar, E.-D. (1985). Internal morphology of leafhoppers and planthoppers, 127-162. In L.R. Nault & J.G. Rodriguez (eds.), The leafhoppers and planthoppers, John Wiley & Sons, New York, 500p.
- Anderson, D. B., and C. Solbreck. (1991). Seed bugs in trophic webs; interactions with resources, competitors and enemies. IV. Who eats whom? Complex interactions between an egg parasitoid and its cannibalistic host. Vaxtskyddsrapporter. Avhandlingar. 22: 16–22.

- Annan, I. B., and M. K. Bergman. (1988). Effects of the onespotted stink bug (Hemiptera: Pentatomidae) on growth and yield of corn. J. Econ. Entomol. 81: 649–653.
- Anonymous. (1963). The Senn pest. U.S. Dept. Agric. PA-582. 4 pp.
- Apriyanto, D., J. D. Sedlacek, and L. H. Townsend. (1989a). Feeding activity of *Euschistus servus* and *E. variolarius* (Heteroptera: Pentatomidae) and damage to an early growth stage of corn. J. Kansas Entomol. Soc. 62: 392–399.
- Apriyanto, D., L. H. Townsend, and J. D. Sedlacek. (1989b). Yield reduction from feeding by *Euschistus servus* and *E. variolarius* (Heteroptera: Pentatomidae) on stage V2 field corn. J. Econ. Entomol. 82: 445–448
- Arnoldi, K. V. (1955). Hibernation of *Eurygaster integriceps* in the mountains of Kuban in the light of investigations in 1949–53. Pp. 171–237 in D. M. Fedotov [ed.], *Eurygaster integriceps* 3 [in Russian].
- Asgari, S. (1995). A study of possibility of mass rearing of Sunn bug egg parasitoids on its alternative host, *Graphosoma lineatum* L. (Het. Pentatomidae). M.Sc. thesis, Tehran University, Tehran, Iran [in Persian, with English summary].
- Ashlock, P. D., and A. Slater. (1988). Family Lygaeidae. The seed bugs and chinch bugs. Pp. 167–245 in T. J. Henry and R. C. Froeschner [eds.] Catalog of the Heteroptera, or True Bugs, of Canada and

- the Continental United States. E. J. Brill, New York, New York, U.S.A
- Atkinson, E. T.(1887–1889). Indian Hemiptera. Family Pentatomidae. Privately publ., Calcutta, India. 205, 184, 109 pp.
- Auclair, J. (1963). Aphid feeding and nutrition. Annu. Rev. Entomol. 8: 439-490.
- Awan, M. S., and M. B. Qureshi. (1996). Study of biological parameters of dusky cotton bug, *Oxycarenus loetus* [sic] Kirby (Lygaeidae: Heteroptera) in Sindh. Proc. Pakistan Congr. Zool. 16: 265–268
- Backus, E. A. (1988). Sensory systems and behaviors which mediate hemipteran plant-feeding: a taxonomic overview. J. Insect Physiol. 34: 151–165.
- Backus, E. A., W. B. Hunter, and C. N. Arne. (1988). Technique for staining leafhopper salivary sheaths and eggs within unsectioned plant tissue. J. Econ. Entomol. 81: 1819–1823
- Barbour, K. S., J. R. Bradley, Jr., and J. S. Bachelier. (1988). Phytophagous stink bugs in North Carolina cotton: an evaluation of damage potential. Beltwide Cotton Prod. Res. Conf. Proc.: 280–282.
- Barbour, K. S., J. R. Bradley, Jr., and J. S. Bachelier. (1990). Reduction in yield and quality of cotton damaged by green stink bug (Hemiptera: Pentatomidae). J. Econ. Entomol. 83: 842–845.
- Beattie, A.J. (1985). The evolutionary ecology of ant-plant mutualisms. Cambridge, University Press, 182p.

- Ben-Dov, Y. & D. Matile-Ferreo. (1983). On the association of ants, genus *Melissotarsus* (Formicidae), with armoured scale insects (Diaspididae) in Africa. Verh. SIEEC X. Budapest, 378-380.
- Ben-Dov, Y. (1978). *Andaspis formicarum* n.sp. (Homoptera, Diaspididae) associated with a species of *Melissotarsus* (Hymenoptera, Formicidae) in South Africa. Insectes Soc. 25: 315-321.
- Ben-Dov, Y. (1990). Relationships with ants, p. 339-343, In D. Rosen (ed.). Armored scale insects – their biology, natural enemies and control, vol. A, Elsevier, Amsterdam, 384p.
- Beshear, R. J., H. H. Tippins, and J. O. Howell. (1976). The lace bugs (Tingidae) of Georgia. Georgia Agric. Exp. Stn. Bull 188. 29 pp.
- Bhatnagar, P. L. (1962). Certain factors influencing the establishment of *Oxycarenus hyalinipennis* Costa (Heteroptera: Lygaeidae) on various plants. Part 1. Ingestion of food. Indian J. Entomol. 25: 48–62.
- Bhattacharjee, N. S. (1959). Studies on *Lygaeus pandurus* Scopoli (Heteroptera: Lygaeidae). 1. Bionomics, descriptions of the various stages, biology and control. Indian J. Entomol. 21: 259–272
- Bigger, M. (1993). Ant-homopteran interactions in a tropical ecosystem. Description of an experiment on cocoa in Ghana. Bull. Entomol. Res. 83: 474-505..

- Blackman RL (1974) Aphids. Ginn and Company, London, UK, 175 pp
- Blackman RL, Eastop VF (2000) Aphids on the world's crops: an identification and information guide, 2nd edn. Wiley, Chichester, UK, 466 pp
- Blüthgen, N., M. Verhaagh, W. Goitia, K. Jaffé, W. Morawetz & W. Barthlott. (2000). How plants shape the ant community in the Amazonian rainforest canopy: the key role of extrafloral nectarines and homopteran honeydew. *Oecologia* 125: 229-240.
- Borges, M., P. C. Jepson, and P. E. Howse. (1987). Long range mate location and close range courtship behaviour of the green stink bug, *Nezara viridula* and its mediation by sex pheromones. *Entomol. Exp. Appl.* 44: 205–212
- Borror DJ, Triplehorn CA, Johnson NF (1989) An introduction to the study of insects, 6th edn. Saunders College Publishers, New York, NY, 875 pp
- Bosik, J. J. (chairman) (1997). Common Names of Insects and Related Organisms. Committee on Common Names of Insects. Entomological Society of America, Lanham, Maryland, U.S.A. 232 pp.
- Bostanian NJ (1994) The tarnished plant bug and strawberry production. Technical Bulletin 1994-1E. Agriculture and Agri-Food Canada, St. Jean-sur-Richelieu, Canada
- Box, H. E. (1953). List of Sugar-Cane Insects. Commonwealth Institute of Entomology, London, U.K

- Brewer, F. D., and W. A. Jones, Jr. (1985). Comparison of meridic and natural diets on the biology of *Nezara viridula* (Heteroptera: Pentatomidae) and eight other phytophagous Heteroptera. Ann. Entomol. Soc. Amer. 78: 620–625
- Broodryk, S. W., and G. A. Matthews (1994). *Dysdercus* and other Heteroptera. Pp. 267–284 in G. A. Matthews and J. P. Turnstall [eds.], Insect Pests on Cotton. CAB International, Oxon, U.K.
- Brooks, H. L., and R. A. Higgins. (1985). Sorghum insect management for 1984. Kansas State University MF-742. 8 pp
- Brown, E. S. (1962). Notes on the systematics and distribution of some species of *Aelia* Fabr. (Hemiptera, Pentatomidae) in the middle East, with special reference to the rostrata group. Ann. Mag. Nat. Hist. 5: 129–145.
- Brown, E. S. (1962a). Researches on the ecology and biology of *Eurygaster integriceps* Put. (Hemiptera, Scutelleridae) in Middle East countries, with special reference to the overwintering period. Bull. Entomol. Res. 53: 445–514.
- Brown, E. S. (1962b). Notes on parasites of Pentatomidae and Scutelleridae (Hemiptera–Heteroptera) in Middle East countries, with observations on biological control. Bull. Entomol. Res. 53: 241–256
- Brown, E. S., and M. Eralp. (1962). The distribution of the species of *Eurygaster* Lap. (Hem., Scutelleridae)

- in Middle East countries. Ann. Mag. Nat. Hist. (13) 5: 65–81.
- Buckley, R. & P. Gullan. (1991). More aggressive ant species (Hymenoptera: Formicidae) provide better protection for soft scales and mealybugs (Homoptera: Coccidae, Pseudococcidae). Biotropica 23: 282-286.
- Burks, B. D. (1934). Food plants of the chinch bug. J. Econ. Entomol. 28: 1100–1101.
- Burton, B. D., J. A. Reinert, and R. W. Toler. (1979). Effects of the southern chinch bug (*Blissus insularis*) the St. Augustine decline strain of Panicum mosaic virus on seventeen accessions and two cultivars of St. Augustine grass. Phytopathology 69: 525–526
- Busey, P., and E. I. Zaenker. (1992). Resistance bioassay from southern chinch bug (Heteroptera: Lygaeidae) excreta. J. Econ. Entomol. 85: 2032–2038.
- Campbell, C.A.M. (1974). The distribution of mealybug vectors of CSSV within trees. Proc. 4th Conf. Western African Cocoa Entomologists. Legon, Ghana, 1974, 67- 71.
- Capinera JL (2001) Handbook of vegetable pests. Academic Press, San Diego, CA, 729 pp
- Capinera. JL.(2008). Encyclopedia of Entomology .University of Florida Gainesville FL Springer Press 4346p .
- Carayon, J. (1971). Notes et documents sur l'appareil odorant métathoracique des Hémiptères. Ann. Soc. Entomol. France (N.S.) 7: 737–770.

- Carter, W. (1962). Insects in relation to plant disease (2nd edition). John Wiley & Sons, New York, 705p.
- Carvalho GS, Webb M (2005) Cercopid Spittle Bugs of the New World: Hemiptera, Auchenorrhyncha, Cercopidae. Pensoft Publishers, Sofia-Moscow. 280 pp
- Chadwick, C. E., and M. I. Nikitin. (1985). Records of parasitism by members of the family Tachinidae (Diptera: Tachinidae). Austral. Zool. 21: 587–598.
- Chambliss, C. E. (1895). The chinch bug, *Blissus leucopterus* (Say) (Hemiptera: Lygaeidae). Tennessee Agric. Exp. Stn. Bull. 8: 41–55. C
- Ciampolini, H., and P. Trematerra. (1986–1987). Biological studies on *Oxycarenus lavaterae* (F.) (Rhynchota Heteroptera Lygaeidae). Boll. Zool. Agric. Bachic. 19: 187–197 [in Italian]
- Clancy, C. A., and H. D. Pierce. (1966). Natural enemies of some Lygus bugs. J. Econ. Entomol. 59: 853–858
- Cobben, R. H. (1978). Evolutionary Trends in Heteroptera. Part II. Mouthpart-Structures and Feeding Strategies. H. Veenman & B.V. Zonen, Wageningen, the Netherlands. 407 pp.
- Coffelt, M. A., and P. B. Schultz. (1988). Influence of plant growth regulators on the development of the azalea lace bug (Hemiptera: Tingidae). J. Econ. Entomol. 81: 290–292
- Conradi-Larsen, E., and L. Somme (1973). Notes on the biology of *Dolycoris baccarum* L. (Het.,

- Pentatomidae). Nor. Entomol. Tidsskr. 20: 245–247.
- Copping L.G(1998) The Biopesticides Manual British Crop Protection Council , UK.
- Corrêa-Ferreira, B. S., and F. Moscardi. (1995). Seasonal occurrence and host spectrum of egg parasitoids associated with soybean stink bugs. Biol. Control 5: 196–202.
- Corrie AM, Crozier RH, Van Heeswijck R, Hoffmann AA (2002) Clonal reproduction and population genetic structure of grape phylloxera, *Daktulosphaira vitifoliae* in Australia. Heredity 88:203–211
- Critchley, B.R. (1998). Literature review of sunn pest *Eurygaster integriceps* Put. (Hemiptera: Scutelleridae). Crop Prot. 17: 271–287.
- Dahms, R. G., and F. A. Fenton. (1940). The effect of fertilizers on chinch bug (Hemiptera: Lygaeidae) resistance in sorghum. J. Econ. Entomol. 33: 688–692.
- Dahms, R. G., and T. H. Johnson. (1954). Reaction of barley varieties to chinch bug (Hemiptera: Lygaeidae). Oklahoma Agric. Exp. Stn. Manuscript Rep. Abstr. 10. 4 pp.
- David, B. C., T. J. Riley, and M. S. Smith. (1991). Chinch bug control in sorghum with liquid and granular soil insecticides, 1989. Ins. Acar. Tests 16: 216.
- Davis, C. J.(1967). Progress in the biological control of the southern green stink bug, *Nezara viridula* variety smaragdula (Fabricius) in Hawaii (Heteroptera: Pentatomidae). Mushi 39: 9– 16

- Davis, F. M., W. P. Williams, and J. Van den Berg. (1996). Screening maize for resistance to chinch bug (Heteroptera: Lygaeidae) under greenhouse conditions. *J. Econ. Entomol.* 89: 1318–1324.
- Day WH (1987) Biological control efforts against *Lygus* and *Anthocoris* spp. infesting alfalfa, in the United States, with notes on other associated mirid species. In: Hedlund RC, Graham HM (eds) Economic importance and biological control of *Lygus* and *Adelphocoris* in North America. U.S. Department of Agriculture, Washington, DC, ARS-64, pp 20–39
- Deitz, L. L., J. W. Van Duyn, J. R. Bradley, Jr., R. L. Rabb, W. M. Brooks, and R. E. Stinner. (1976). A guide to the identification and biology of soybean arthropods in North Carolina. North Carolina Agric. Exp. Stn. Tech. Bull. 238: 1–264.
- DeWitt, N. B., and G. L. Godfrey. (1972). The literature of arthropods associated with soybeans. II. A bibliography of the southern green stink bug *Nezara viridula* (Linneaus) [sic] (Hemiptera: Pentatomidae). *Illinois Nat. Hist. Surv. Biol. Notes* 78: 1–23
- Dhaliwal, H. S., and B. D. Goma. (1979). Seasonal abundance of various pests on cauliflower seed crop lower hills at Solan. *Indian J. Ecol.* 6: 101–109
- Dhiman, S. C., and K. S. Krishna. (1989). Occurrence of *Oxycarenus laetus* Kirby in the western districts

- of U.P. (India) and records of its new host plants. Bull. Entomol. 30: 126–129.
- Dhingra, S., and S. Verma. (1984). Relative toxicity of insecticides to the adults of *Oxycarenus laetus* Kiraby, a pest of okra. J. Entomol. Res. 8: 111–113.
- Dimetry, N. (1971). Studies on the host preference of the cotton seed bug, *Oxycarenus hyalinipennis* (Costa) (Hemiptera: Lygaeidae). Z. Angew. Entomol. 68: 63–67.
- Dixon AFG (1998) Aphid ecology - an optimization approach, 2nd edn. Chapman and Hall, London, UK, 300 pp
- Djavadzadeh, M., and M. Esmaili (1991). An investigation on susceptibility of different populations of Sunn pest (*Eurygaster integriceps* put.) to fenitrothion. Proc. Tenth. Plant Prot. Congr. Iran. Kerman, Iran. 9 [in Persian, with English abstract].
- Dolling, W. R. (1991). The Hemiptera. Oxford University Press, Oxford, U.K. 274 pp.
- Dolling, W. R. (1991). The Hemiptera. Oxford. Natural History Museum, Oxford University Press, London, U.K. 274 pp.
- Dolling, W.R. (1991). The Hemiptera. Oxford University Press, Oxford, 274p
- Donskoff, M. (1996). Prospects for international cooperation on Sunn pest research and control. Pp. 17–21 in R. H. Miller and J. G. Morse [eds.], Sunn Pests and Their Control in the Near East. FAO Publ. No. 138. Rome, Italy. 165 pp

- Downie DA (2002) Locating the sources of an invasive pest using a mtDNA gene genealogy. *Mol Ecol* 11:2013–2026
- Downie DA, Granett J, Fisher JR (2000) Distribution and abundance of leaf galling grape phylloxera and *Vitis* species in the central and eastern United States. *Environ Entomol* 29:979–986
- Drake, C. J., and E. J. Hambleton. (1944). Concerning Neotropical Tingitidae (Hemiptera). *J. Washington Acad. Sci.* 34: 120–129.
- Drake, C. J., and F. A. Ruhoff .(1965). Lacebugs of the World, a Catalog (Hemiptera: Tingidae). U.S. Nat. Mus. Bull. 243., Smithsonian Institution, Washington, D.C., U.S.A. 634 pp.
- Ebert TA, Cartwright B (1997) Biology and ecology of *Aphis gossypii*. Glover (Homoptera: Aphididae). *Southwest Entomol* 22:116–153
- Entomol.* 90: 1508–1513
- Eritja, R., C. Aranda, M. Goula, and M. Espinosa. (1997). Laboratory tests of pyrethroid and organophosphate insecticides on *Oxycarenus lavaterae* (Heteroptera: Lygaeidae). *J. Econ.*
- Esmaili, M., and A. Dehghan. (1991). Study on two-stage harvesting of wheat in relation to *Eurygaster integriceps* Put. *Proc. Sunn Pests Conf. Tehran.* Pp. 96–115 [in Persian].
- Esselbaugh, C. O. (1946). A study of the eggs of the Pentatomidae (Hemiptera). *Ann. Entomol. Soc. Amer.* 39: 667–691.

- FAO. (1993). Sunn pest problem and its control in the Near East region. FAO Publ. Aleppo, Syria. 28 pp
- Forbes, S. A. (1883). Studies on the chinch bug (*Blissus leucopterus* Say). Illinois State Entomol. Rep. No. 16: 57 pp. Entomol. Rep. No. 16: 57 pp. 1
- Foster, R. E., R. H. Cherry, and D. B. Jones. (1989). Spatial distribution of the rice stink bug (Heteroptera: Pentatomidae) in Florida rice. J. Econ. Entomol. 82: 507–509.
- Fourar, R., and F. Fleurat-Lessard. (1997). Effects of damage by wheat bug, *Aelia germari* [Hemiptera: Pentatomidae], on grain quality and on reproductive performance of the rice weevil, *Sitophilus oryzae* [Coleoptera: Curculionidae], on harvested grain. Phytoprotection 78: 105–116.
- Froeschner, R. C. (1988). Family Pentatomidae Leach, 1815. The stink bugs. Pp. 544–597 in T. J. Henry and R. C. Froeschner [eds.], Catalog of the Heteroptera, or True Bugs, of Canada and the Continental United States. E. J. Brill, New York, New York, U.S.A. 958 pp
- Froeschner, R. C. (1988). Family Scutelleridae Leach, 1815. The shield bugs. Pp. 684–693 in T. J. Henry and R. C. Froeschner [eds.], Catalog of the Heteroptera, or True Bugs, of Canada and the Continental United States. E. J. Brill, Leiden, the Netherlands. 958 pp.
- Gallun, R. L., K. J. Starks, and W. D. Guthrie. (1975). Plant resistance to insects attacking cereals. Annu. Rev. Entomol. 20: 337–357

- Gandhi, J. R. (1975). Nutritive value, absorbability, and assimilation of food ingested by *Oxycarenus hyalinipennis* (Hemiptera: Lygaeidae). Indian J. Entomol. 37: 415–417
- Granett J, Walker MA, Kocsis L, Omer AD (2001) Biology and management of grape phylloxera. Annu Rev Entomol 46:387–412
- Gregorio, De. R. (1981). *Stephanitis pyri*, cycle biologique en forêt de Bouconne. Bull. Soc. Entomol. France 86: 227–235.
- Gross, G. F. (1975). Plant-Feeding and Other Bugs (Hemiptera) of South Australia. Heteroptera — Part I. South Australian Government [no city], Australia. 250 pp.
- Gullan, P.J. & M. Kosztarab. (1997). Adaptations in scale insects. Annu. Rev. Entomol. 42: 23-50.
- Heckroth, H.-P., B. Fiala, P.J. Gulan, A.H.J. Idris & U. Maschwitz. 1998. The soft scale (Coccidae) associates of Malaysian ant-plants. J. Trop. Ecol. 14: 427-443.
- Gurr, L. (1957). Observations on the distribution, life history, and economic importance of *Nysius huttoni* (Lygaeidae: Hemiptera). New Zealand J. Sci. Tech. 38 A: 710–714
- Guthrie, F. E., and G. C. Decker. (1954). The effect of humidity and other factors on the upper thermal death point of the chinch bug (Hemiptera: Lygaeidae). J. Econ. Entomol. 47: 882–887.
- Haghshenas, A. R. (1993). The effect of five insecticides compounds with granule and emulsion formulation on Sunn pest *Eurygaster integriceps*

- Put. M.Sc. thesis, Tehran University, Tehran, Iran [in Persian, with English summary]
- Hamid, A., and J. A. Slater. (1978-1980). The Blissinae of West Africa (Hemiptera: Lygaeidae). Bull. Inst. Fond. Afr. Noire. Ser A. 40: 852–892.
- Hamilton KGA (1982) The spittlebugs of Canada (Homoptera: Cercopidae). The insects and arachnids of Canada, Part 10, 102 pp
- Hammad, S. M., N. Armanius, and A. A. El-Deeb. (1972). Some biological aspects of *Oxycarenus hyalinipennis* Costa (Hemiptera: Lygaeidae). Bull. Soc. Entomol. Egypt. 56: 33–38
- Harakly, F. A., and M. A. H Assem. (1978). Ecological studies on the truly pests of leguminous plants in Egypt. II. Piercing and sucking pests. Pp. 237–242 in Proceedings, Fourth Conference of Pest Control, Sept. 30 to Oct. 3, 1978. (Part I). Academy of Scientific Research and Technology and National Research Centre, Cairo, Egypt
- Harris, V. E., and J. W. Todd. (1980a). Duration of immature stages of the southern green stink bug, *Nezara viridula* (L.), with a comparative review of previous studies. J. Georgia Entomol. Soc. 15: 114–124.
- Harris, V. E., and J. W. Todd. (1980b). Male-mediated aggregation of male, female and 5th instar southern green stink bug and concomitant attraction of a tachinid parasite, *Trichopoda pennipes*. Entomol. Exp. Appl. 27: 117–126.

- Hassan, E. (1977). Major Insect and Mite Pests of Australian Crops. Ento Press, Gatton, Queensland, Australia. 238 pp
- Henry, T. J. (1997). Phylogenetic analysis of family groups within the infraorder Pentatomomorpha (Hemiptera: Heteroptera), with emphasis on the Lygaeoidea. Ann. Entomol. Soc. Amer. 90: 275–301.
- Henry, T. J., J. W. Neal, Jr., and K. M. Gott. (1986). *Stethoconus japonicus* (Heteroptera: Miridae): a predator of Stephanitis lace bugs newly discovered in the United States, promising in the biocontrol of azalea lace-bug (Heteroptera: Tingidae). Proc. Entomol. Soc. Washington 88: 722–730.
- Hill, D. S. (1975). Agricultural Insect Pests of the Tropics and Their Control. Cambridge University Press, Cambridge, U.K. 516 pp.
- Hoffman, W. E. (1932). The economic status of lygaeids and notes on the life-history of *Lygaeus hospes* Fab. and *Aphanus sordidus* Fabr. Lingnan Sci. J. 11: 119–135.
- Hoffmann, M. P., L. T. Wilson, and F. G. Zalom. (1987). Control of stink bugs in tomatoes. California Agric. 41 (5–6): 4–6.
- Houk, E.J. & G.W. Griffiths. (1980). Intracellular symbiotes of the Homoptera. Ann. Rev. Entomol. 25: 161-187.
- Ishihara, R., and S. Kawai. (1981). Feeding habits of the azalea lace bug *Stephanitis pyrioides*

- (Hemiptera: Tingidae). Jpn. J. Appl. Entomol. Zool. 25: 200–202
- Janes, M. J. (1935). Oviposition studies on the chinch bug *Blissus leucopterus* Say (Hemiptera: Lygaeidae). Ann. Entomol. Soc. Amer. 25: 109–142.
- Javahery, M. (1967). The biology of some Pentatomoidea and their egg parasites. Ph.D. dissertation, University of London, London, U.K. 475 pp
- Javahery, M. (1968). The egg parasite complex of British Pentatomoidea (Hemiptera): taxonomy of Telenominae (Hymenoptera: Scelionidae). Trans. R. Entomol. Soc. London. 120: 417–436.
- Javahery, M. (1972). Annual Technical Report on Sunn Pests to the Plant Pests Research Institute. Tehran, Iran. 72 pp. [in Persian].
- Javahery, M. (1973a). Population dynamics of *Aelia* and *Eurygaster* spp. in some regions in Iran. CENTO Publication, pp. 20–21. Tehran, Iran.
- Javahery, M. (1973b). Chemical controlling applications that are used against *Aelia* and *Eurygaster* in Iran. CENTO Publication, pp. 55–56. Tehran, Iran.
- Javahery, M. (1978a). Management of economically important Pentatomoidea in Iran. Antenna (Bull. Entomol. Soc. London) 2: 74.
- Javahery, M. (1978b). Importance and methods of control of Sunn pest in Iran. Bull. 27. Plant Protection Organization, Tehran, Iran [in Persian].
- Javahery, M. (1992). Economic importance and application of IPM for controlling Sunn pests. Proc. Sunn Pests Conf. Tehran. Pp. 43–48 [in Persian].

- Javahery, M. (1993). Sunn pests (Pentatomoidea) of cereal crops in Iran: chemical and cultural method of control. FAO/ICARDA. Expert Consultation on Sunn Pest. FAO Pub. Aleppo, Syria. 16 pp.
- Javahery, M. (1994). Development of eggs in some true bugs (Hemiptera:Heteroptera). Part I. Pentatomoidea. Canad. Entomol. 126: 401–433. 0695_frame_C14 Page 497 Wednesday, June 14, 2000 8:16 AM 498 HETEROPTERA OF ECONOMIC IMPORTANCE
- Javahery, M. (1995). A technical review of Sunn pests (Heteroptera: Pentatomoidea) with special reference to *Eurygaster integriceps* Puton. FAO/RNE Publ. Priv. 80 pp.
- Javahery, M. (1996). Sunn pest of wheat and barley in the I. R. of Iran; chemical and cultural methods of control. Pp. 61–74 in R. H. Miller and J. G. Morse [eds.], Sunn Pest and Their Control in the Near East. FAO Pub. No. 138. Rome, Italy. 165 pp
- Javahery, M.(1967). The biology of some Pentatomoidea and their egg parasites. Ph.D. thesis , University of London, London, U.K. 475 pp.
- Jensen, R. L., and L. D. Newsom. (1972). Effect of stink bug-damaged soybean seeds on germination, emergence, and yield. J. Econ. Entomol. 65: 261–264.
- Johnson, W. T., and H. H. Lyon. (1988). Insects that Feed on Trees and Shrubs, second edition. Comstock Publ. Assoc., Cornell University Press, Ithaca, New York., U.S.A. 556 pp

- Jones WA (1988) World review of the parasitoids of the southern green stink bug, *Nezara viridula* (L.) (Heteroptera: Pentatomidae). Ann Entomol Soc Am 81:262–273
- Kawakami, Y. (1983). Sexual dimorphism in the nymphal stages of some Japanese Tingidae. Jpn. J. Appl. Entomol. Zool. 27: 197–202
- Kennedy, M. K. (1981). Chinch bugs: biology and control. Amer. Lawn Appl. July/Aug.: 12–15
- Kindler, S. D., and R. Staples. (1982). Foliar applications of insecticides for control of chinch bugs on grain sorghum, 1981. Ins. Acar. Tests 7: 176.
- Kirkpatrick, T. W. (1923). The Egyptian cotton seed bug (*Oxycarenus hyaliniipennis* Costa) (Hemiptera: Lygaeidae). Bull. Minist. Agric. Egypt, Tech. Sci. Serv. 35: 1–107
- Klein, R.W., D. Kovac, A. Schellerich & U. Machwitz. (1992). Mealybug-carrying by swarming queens of a Southeast Asian bamboo-inhabiting ant. Naturwissenschaften 79: 422-423
- Kogan, M., and S. G. Turnipseed. (1987). Ecology and management of soybean arthropods. Annu. Rev. Entomol. 32: 507–538.
- Kosztarab M (1996) Scale insects of northeastern North America: identification, biology, and distribution (Special Publication No 3). Virginia Museum of Natural History, Martinsville, VA, 650 pp
- Kosztarab, M. (1987). Everything unique or unusual about scale insects (Homoptera : Coccoidae). Bull. Entomol. Soc. Am. 33: 215-220.

- Krispyn, J. W., and J. W. Todd. (1982). The red imported fire ant as a predator of the southern green stink bug on soybean in Georgia. *J. Georgia Entomol. Soc.* 17: 19–26
- Kumari, S. J. L., C. Janaiah, and N. Chari. (1984). Structure and volatile constituents of metathoracic scent glands of a pentatomid bug, *Chrysocoris purpureus* (Westw.). *Uttar Pradesh J. Zool.* 4: 156–161
- Lee, F. N., N. P. Tugwell, S. J. Fannah, and G. J. Weidemann. (1993). Role of fungi vectored by rice stink bug (Heteroptera: Pentatomidae) in discoloration of rice kernels. *J. Econ. Entomol.* 86: 549–556
- Leferink, J. H. M., and G. H. Gerber. (1997). Development of adult and nymphal populations of *Lygus lineolaris* (Palisot de Beauvois), *L. elisus* Van Duzee, and *L. borealis* (Kelton) (Heteroptera: Miridae) in relation to seeding date and stage of plant development on canola (Brassicaceae) in southern Manitoba. *Canad. Entomol.* 129: 777–787.
- Leigh, T. F. (1963). Life history of *Lygus hesperus* (Hemiptera: Miridae) in the laboratory. *Ann. Entomol. Soc. Amer.* 56: 865–867.
- Leigh, T. F., and G. A. Matthews. (1994). *Lygus* (Hemiptera: Miridae) and other Hemiptera. Pp. 367–379 in G. A. Matthews and J. P. Tunstall [eds.], *Insect Pests of Cotton*. CAB International, Wallingford, U.K. 593 pp.

- Leigh, T. F., C. E. Jackson, P. F. Wynholds, and J. A. Cota. (1977). Toxicity of selected insecticides applied topically to *Lygus hesperus*. J. Econ. Entomol. 70: 42–44.
- Leonard, M. D. 1915. Further experiments in the control of the tarnished plant-bug. J. Econ. Entomol. 8: 361–367.
- Leston, D. (1952). On certain subgenera of *Lygus* Hahn 1833 (Hem., Miridae), with a review of the British species. Entomol. Gaz. 3: 213–230.
- Liepert, C. & K. Dettner. (1993). Recognition of aphid parasitoids by honeydew-collecting ants: the role of cuticular lipids in a chemical mimicry system. J. Chem. Ecol. 19: 2143-2153
- Lin H, Walker MA, Hu R, Granett J (2006) New simple sequence repeat loci for the study of grape phylloxera (*Daktulosphaira vitifoliae*) genetics and host adaptation. Am J Enol Vitic 57:33–40
- Linnavuori, R. E. (1989). Heteroptera of Yemen and South Yemen. Act. Entomol. Fenn. 54: 1–40.
- Lye, B.-H., and R. N. Story. 1988. (Feeding) preference of the southern green stink bug (Hemiptera: Pentatomidae) on tomato fruit. J. Econ. Entomol. 81: 522–526
- Lye, B.-H., R. N. Story, and V. L. Wright. (1988a). Damage threshold of the southern green stink bug, *Nezara viridula* (Hemiptera: Pentatomidae) on fresh market tomatoes. J. Entomol. Sci. 23: 366–373.
- Mailloux, G., and H. T. Streu. (1979). A sampling technique for estimating hairy chinch bug

- (*Blissus leucopterus hirtus* Montandon, Hemiptera: Lygaeidae) populations and other arthropods from turf grass. Ann. Soc. Entomol. Québec 24: 139–143
- Malipatil, M. B. (1979). The biology of some Lygaeidae (Hemiptera: Heteroptera) of south-east Queensland. Austral. J. Zool. 27: 231–249.
- McKenzie HL (1967) Mealybugs of California, with taxonomy, biology and control of North American species (Homoptera: Coccoidea: Pseudococcidae). University of California Press, Berkeley, CA, 526 pp
- McPherson JE, McPherson RM (2000) Stink bugs of economic importance in America North of Mexico. CRC Press, Boca Raton, FL, 253 pp
- McPherson, R. M., and L. D. Newsom. (1984). Trap crops for control of stink bugs in soybean. J. Georgia Entomol. Soc. 19: 470–480.
- McPherson, R. M., L. D. Newsom, and B. F. Farthing. (1979). Evaluation of four stink bug species from three genera affecting soybean yield and quality in Louisiana. J. Econ. Entomol. 72: 188–194
- Mead, F. W. (1967). Stephanitis lace bugs of the United States. Florida Dept. Agric. Div. Plant Ind. Entomol. Circ. 62: 1–2
- Melo, Q. M. S. (1990). Arthropod pests associated with cassava in Brazil. Pp. 132–138 in S. K. Hahn and F. E. Caveness [eds.], Integrated Pest Management for Tropical Root and Tuber Crops. International Institute of Tropical Agriculture, Ibadan, Nigeria

- Metcalf, C. L., and W. P. Flint. (1939). Destructive and Useful Insects, Their Habits and Control. McGrawHill, New York, New York, U.S.A. 908 pp
- Metcalf, C. L., W. P. Flint, and R. L. Metcalf. (1962). Destructive and Useful Insects, fourth edition. McGrawHill, New York, New York, U.S.A. 1087 pp.
- Metcalf, R. L., and R. A. Metcalf. (1975). Attractants, repellents, and genetic control in pest management. Pp. 275–306 in R. L. Metcalf and W. H. Luckman [eds.], Introduction to Insect Pest Management. John Wiley & Sons, New York, New York, U.S.A
- Minks AK, Harrewijn P (eds) (1989) Aphids: their biology, natural enemies and control, vol 2A (450 pp), vol 2B (364 pp), vol 2C (312 pp). Elsevier, Amsterdam, The Netherlands
- Miyazaki M (1987) Forms and morphs of aphids. In: Mink AK, Harrewijn P (eds) Aphids: their biology, natural enemies, and control. Elsevier, Amsterdam, The Netherlandspp 27–50
- Modarres Awal, M. 1992. Biology, ecology of *Eurygaster integriceps* Put. and its outbreak in Trakia (European part of Turkey). Proc. Sunn Pest Conf., Tehran University, Tehran, Iran. Pp. 51–70 [in Persian].
- Mohaghegh, J., M. Esmaili, and E. Bagheri-zonouz. (1991). A systematic review of genus *Eurygaster* Laporte (Heteroptera: Scutelleridae). Proc. Tenth

- Plant Prot. Congr. Iran. Kerman, Iran. P. 66 [in Persian].
- Mohammad, M. A., and N. M. Al-Mallah. (1989a). Effect of host plant on the lace bug *Stephanitis pyri* (F.) (Heteroptera: Tingidae). Mesopotamia J. Agric. 21: 271–281.
- Mohammad, M. A., and N. M. Al-Mallah. (1989b). The influence of temperatures and host food on increase rate of the lace bug, *Stephanitis pyri* (F.) (Hemiptera, Tingidae). Mesopotamia J. Agric. 21: 28.
- Moizuddin, M., and I. Ahmad. (1980). Some aspects of morphology of two species of shield bugs (Pentatomoidea: Scutelleridae) of Pakistan with reference to phylogeny. Sind Univ. Res. J. (Sci. Ser.) 12–13: 17–30
- Moore MO (1991) Classification and systematics of eastern North American Vitis north of Mexico. Sida 14:339–367
- Moya-Raygoza, G. & L.R. Nault. (2000). Obligatory mutualism between *Dalbulus quinquenotatus* (Homoptera: Cicadellidae) and attendant ants. Ann. Entomol. Soc. Am. 93: 929-940
- Muller, C. B., and F. Fritsche. (1993). Unequal costs of parasitism for male and female lygaeid bugs. J. Insect Behav. 6: 265–269
- Najafi Mirak, T. (1998). Genetic study of resistance to Sunn pest (*Eurygaster integriceps* Put.) in wheat. M.Sc. thesis, Tehran University, Tehran, Iran [in Persian, with English abstract].

- Nalepa, C. P., and J. R. Baker. (1994). Winter oviposition of the azalea lace bug (Hemiptera: Tingidae) in North Carolina. *J. Entomol. Sci.* 29: 482–489.
- Naresh, J. S., and C. M. Smith. (1983). Development and survival of rice stink bugs (Hemiptera: Pentatomidae) reared on different host plants at four temperatures. *Environ. Entomol.* 12: 1496–1499.
- Nault, L. R. (1977). Arthropod transmission of plant viruses: a new synthesis. *Ann. Entomol. Soc. Amer.* 90: 521–541.
- Nayer, K. K., T. N. Ananthkrishman, and B. V. David. (1976). *General and Applied Entomology*. Tata McGraw-Hill Publ. Co. Ltd., New Delhi, India. 589 pp
- Nechols, J.R. & T.F. Seibert. (1985). Biological control of the spherical mealybug, *Nipaecoccus vastator* (Homoptera: Pseudococcidae): assessment by ant exclusion. *Environ. Entomol.* 14: 45-47
- Negron, J. F., and T. J. Riley. (1987). Southern green stink bug, *Nezara viridula* (Heteroptera: Pentatomidae), feeding in corn. *J. Econ. Entomol.* 80: 666–669
- Numata, H., and K. Yamamoto. (1990). Feeding on seeds induces diapause in the cabbage bug, *Eurydema rugosum*. *Entomologia* 57: 281–284.
- Omer AD, Granett J, De Benedictis JA, Walker MA (1995) Effects of fungal root infections on the vigor of grapevines infested by root-feeding grape phylloxera. *Vitis* 34:165–170

- Önder, F., A. Onucar, and O. Ulu. (1986). Taxonomic status of *Stethoconous pyri* (Mella) (Het., Miridae) and some notes about its biology. *Türk. Bit. Kor. Derg.* 10: 149–153.
- Panizzi AR (1997) Wild hosts of pentatomids: ecological significance and role in their pest status on crops. *Annu Rev Entomol* 42:99–122
- Panizzi AR, Slansky F Jr (1985) Review of phytophagous pentatomids associated with soybean in the Americas. *Fla Entomol* 68:184–214
- Panizzi, A. R (1998). Phylogeny, systematics, and practical entomology: the Heteroptera (Hemiptera). *An. Soc. Entomol. Brasil* 27: 499–511.
- Panizzi, A. R .(1997c). Dynamics in the insect fauna adaptation to soybean in the tropics. *Trends Entomol.* 1: 71–88.
- Panizzi, A. R .(1997d). A expansão da agricultura no centro-oeste brasileiro e os surtos recentes do percevejo-castanho. *Rev. Plantio Direto Julho/Agosto 1997:* 27–28.
- Panizzi, A. R. (1997a). Wild hosts of pentatomids: ecological significance and role in their pest status on crops. *Annu. Rev. Entomol.* 42: 99–122. Panizzi, A. R .(1997b). Entomofauna changes with soybean expansion in Brazil. *Proc. World Soybean Res. Conf.* 5: 166–169.
- Panizzi, A. R., and A. M. Meneguim. (1989). Performance of nymphal and adult *Nezara viridula* on selected alternate host plants. *Entomol. Exp. Appl.* 50: 215–223.

- Panizzi, A. R., and A. P. M. Mourão. (1999). Mating, ovipositional rhythm and fecundity of *Nezara viridula* (L.) (Heteroptera: Pentatomidae) fed on privet, *Ligustrum lucidum* Thunb., and on soybean, *Glycine max* (L.) Merrill fruits. An. Soc. Entomol. Brasil 28: 35–40.
- Panizzi, A. R., and L. M. Vivan. (1997). Seasonal abundance of the Neotropical brown stink bug, *Euschistus heros* in overwintering sites and the breaking of dormancy. Entomol. Exp. Appl. 82: 213–217
- Pearson, E. O. (1958). The Insect Pests of Cotton in Tropical Africa. CIE, London, U.K. 355 pp
- Peck DC (1999) Seasonal fluctuations and phenology of *Prosapia spittlebugs* (Homoptera: Cercopidae) in upland dairy pastures of Costa Rica. Environ Entomol 28:372–386
- Pinkston, K. (1998- 1999) OSU Extension Agent's handbook of insect, plant disease and weed control. Oklahoma State University Publ. E-832. Oklahoma Cooperative Extension Service, Stillwater, Oklahoma
- Pinto, S. B., and A. R. Panizzi. (1994). Performance of nymphal and adult *Euschistus heros* (F.) on milkweed and on soybean and effect of food switch on adult survivorship, reproduction and weight gain. An. Soc. Entomol. Brasil 23: 549–555
- Poole RW, Gentili P (eds) (1996) Nomina Insecta Nearctica: a check-list of the insects of North America, vol 4: Nonholometabolous orders.

Entomological Information Service, Rockville,
MD, 731 pp

- Popov, C., A. Barbulescu, and I. Vonica. (1996). Population dynamics and management of Sunn pest in Romania. Pp. 47–59 in R. H. Miller and J. G. Morse [eds.], Sunn Pests and Their Control in the Near East. FAO Publ. No. 138. Rome, Italy. 165 pp.
- Putschkov, V. G (1965). Shieldbugs of Central Asia. Acad. Sci. Kinghiz SSR. 329 pp.
- Putschkov, V. G. (1961). Fauna of Ukraine. Shieldbugs, Vol. 21, Ac. Sci. U.K. SSR. Kiev, Ukraine, U.S.S.R. 338 pp. [in Ukrainian].
- Putschkov, V. G. (1961). Fauna of Ukraine. Shieldbugs, Vol. 21, Ac. Sci. U.K. SSR. Kiev, Ukraine, U.S.S.R. 338 pp. [in Ukrainian].
- Putschkov, V. G. (1965). Shieldbugs of Central Asia. Acad. Sci. Kinghiz SSR. 329 pp
- Ratnadass, A., O. Ajayi, G. Fliedel, and K. V. Ramaiah. (1995b). Host-plant resistance in sorghum to *Eurystylus immaculatus* in West Africa. Pp. 191–199 in K. F. Nwanze and O. Youm [eds.], Panicle Insect Pests of Sorghum and Pearl Millet: Proceedings of an International Consultative Workshop, 4–7 Oct. 1993, ICRISAT Sahelian Center, Niamey, Niger. International Crops Research Institute for the Semi-Arid Tropics, Patancheru, A.P., Ind
- Rezabeigi, M. (1995). Morphological and biochemical aspects of 25 wheat cultivars in relation to resistance to cereal Sunn pest (*Eurygaster*

- inegriceps* Put.). M.Sc. thesis, Tehran University, Tehran, Iran [in Persian, with English summary].
- Riggs, D. I. (1990). Greenhouse studies of the effect of lygus bug feeding on 'Tristar' strawberry. *Adv. Strawberry Prod.* 9: 40–43.
- Ring, D. R., J. H. Benedict, M. L. Walmsley, and M. F. Treacy. (1993). Cotton yield response to cotton fleahopper (Hemiptera: Miridae) infestations on the Lower Gulf Coast of Texas. *J. Econ. Entomol.* 86: 1811–1819.
- Ripper, W. E., and L. George. (1965). *Cotton Pests of the Sudan: Their Habits and Control*. Blackwell, Oxford, U.K. 363 pp.
- Robacker, C. D., and S. K. Braman. (1997). Field evaluation of azalea species and cultivars for resistance to azalea lace bug and cranberry rootworm. *HortScience* 32: 482
- Robinson, J. F., C. M. Smith, G. B. Trahan, and M. Hollay. (1981). Evaluation of 32 uniform rice nursery lines for rice stink bug resistance. *Louisiana Agric. Exp. Stn., Rice Exp. Stn. Annu. Prog. Rep.* 73: 278–285
- Rosca, I., C. Popov, A. Barbulescu, I. Vonica, and K. Fabritius. (1996). The role of natural parasitoids in limiting the level of Sunn pest populations. Pp. 35–45 in R. H. Miller and J. G. Morse [eds.], *Sunn Pests and Their Control in the Near East*. FAO Publ. No. 138. Rome, Italy. 165 pp.
- Rosenzweig, V. Ye. (1997). Revised classification of the *Calocoris* complex and related genera

- (Heteroptera: Miridae). Zoosyst. Ross. 6: 139–169
- Russell L (1974) *Daktulosphaira vitifoliae*, the correct name for the grape phylloxeran (Hemiptera: Homoptera: Phylloxeridae). J Wash Acad Sci 64:303–308
- Russin, J. S., D. B. Orr, M. B. Layton, and D. J. Boethel. (1988). Incidence of microorganisms in soybean seeds damaged by stink bug feeding. Phytopathology 78: 306–310.
- Ryan, M. A., and G. H. Walter. (1992). Sound communication in *Nezara viridula* (L.) (Heteroptera: Pentatomidae): further evidence that signal transmission is substrate-borne. Experientia 48: 1112–1115.
- Sakata, H. (1995). Density-dependent predation of the ant *Lasius niger* (Hymenoptera: Formicidae) on two attended aphids *Lachnus tropicalis* and *Myzocallis kuricola* (Homoptera: Aphididae). Res. Popul. Ecol. 37: 159-164.
- Schaefer CW, Panizzi AR (eds) (2000) Heteroptera of economic importance. CRC Press, Boca Raton, FL, 828 pp
- Schaefer, C. W. (1972). Degree of metathoracic scent gland development in the trichophorous Heteroptera (Hemiptera). Ann. Entomol. Soc. Amer. 65: 810–821.
- Schaefer, C. W. (1975). Heteropteran trichobothria (Hemiptera: Heteroptera). Int. J. Insect Morphol. Embryol. 4: 193–264.

- Schaefer, C. W. (1998). Phylogeny, systematics, and practical entomology: the Heteroptera (Hemiptera). An. Soc. Entomol. Brasil 27: 499–511
- Schaefer, C.W.(1981). The land bugs (Hemiptera: Heteroptera) and their adaptive zones. Pp. 67–83 in N. Ueshima [ed.], Phylogeny and Higher Classification of Heteroptera. Rostria No. 33, Suppl. 99 pp.
- Schaefer, C.W.(1997). The origin of secondary carnivory from herbivory in Heteroptera (Hemiptera). Pp. 229–239 in A. Raman [ed.], Ecology and Evolution of Plant-Feeding Insects in Natural and Man-Made Environments. International Scientific Publ., New Delhi, India. 245 pp.
- Schuh, R. T. (1984). Revision of the Phylinae (Hemiptera, Miridae) of the Indo-Pacific. Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. 177: 1–476.
- Schuh, R. T. (1995). Plant Bugs of the World (Insecta: Heteroptera: Miridae): Systematic Catalog, Distributions, Host List, and Bibliography. New York Entomological Society, New York, New York, U.S.A. 1329 pp.
- Schuh, R. T., and J. A. Slater. (1995). True Bugs of the World (Hemiptera: Heteroptera). Classification and Natural History. Cornell University Press, Ithaca, New York, U.S.A. 336 pp.
- Shahrokhi, S. (1997). A study on mass rearing of *Trissolcus grandis* on *Graphosoma lineatum* eggs and the quality control for biological control of Sunn Pest, *Eurygaster integriceps*

- (Hem. Scutelleridae). M.Sc. thesis, Tehran University, Tehran, Iran [in Persian, with English summary].
- Slater, J. A., and R. M. Baranowski. (1990). Lygaeidae of Florida (Hemiptera: Heteroptera). Vol 14. Arthropods of Florida and neighboring land areas. Florida Dept. Agric. Consumer Serv., Gainesville, Florida, U.S.A. i–xv + 211 pp.
- Slater, J. A., and R. M. Baranowski.(1978 -1990). Lygaeidae of Florida (Hemiptera: Heteroptera). Vol 14. Arthropods of Florida and neighboring land areas. Florida Dept. Agric. Consumer Serv., Gainesville, Florida, U.S.A. i–xv + 211 pp.
- Slater, J. A., and R. M. Baranowski.(1978). How to Know the True Bugs. The Pictured Key Nature Series. Wm. C. Brown Co., Dubuque, Iowa, U.S.A.
- Snodgrass, G. L., W. P. Scott, and J. W. Smith. (1984a). A survey of the host plants and seasonal distribution of the cotton fleahopper (Hemiptera: Miridae) in the delta of Arkansas, Louisiana, and Mississippi. J. Georgia Entomol. Soc. 19: 34–41.
- Spike, B. P., R. J. Wright, S. Danielson, and D. W. Stanley-Samuelson. (1991). The fatty acid compositions of phospholipids and triacylglycerols from two chinch bug species *Blissus leucopterus leucopterus* and *Blissus iowensis* (Hemiptera: Lygaeidae) are similar in the characteristic dipteran pattern. Comp. Biochem. Physiol. 998: 799–802
- Stadler, B., K. Fiedler, T.J. Kawecki & W.W. Weisser. (2001). Costs and benefits for phytophagous

- myrmecophiles: when ants are not always available. *Oikos* 92: 476-478.
- Stam, P. A., L. D. Newsom, and E. N. Lambremont. (1987). Predation and food as factors affecting survival of *Nezara viridula* (L.) (Hemiptera: Pentatomidae) in a soybean ecosystem. *Environ. Entomol.* 16: 1211–1216
- Sterling, W. L., K. M. El-Zik, and L. T. Wilson. (1989a). Biological control of pest populations. Pp. 155–189 in R. E. Frisbie, K. M. El-Zik, and L. T. Wilson [eds.], *Integrated Pest Management Systems and Cotton Production*. Wiley, New York, New York, U.S.A. 437 pp.
- Sterling, W. L., L. T. Wilson, A. P. Gutierrez, D. R. Rummel, J. R. Phillips, N. D. Stone, and J. H. Benedict. (1989b). Strategies and tactics for managing insects and mites. Pp. 267–305 in R. E. Frisbie, K. M. El-Zik, and L. T. Wilson [eds.], *Integrated Pest Management Systems and Cotton Production*. Wiley, New York, New York, U.S.A. 437 pp.
- Stern, V. M. (1969). Interplanting alfalfa in cotton to control lygus bugs and other insect pests. *Proc. Tall Timbers Conf. Ecol. Anim. Control Habitat Manage.* 1: 55–69.
- Stoetzel MB, Miller GL (2001) Aerial feeding aphids of corn in the United States with reference to the rootfeeding *Aphis maidiradicis* (Homoptera: Aphididae). *Fla Entomol* 84:83–98
- Talai, R., M. Esmaili, C. Abd-mishani, P. Azmayesh-fard, and E. Bagheri-zenouz. (1991). Evaluation of

- baking quality of wheat in relation to Sunn pest (*Eurygaster integriceps* Put.) damage. Proc. Tenth Plant Prot. Congr. Iran. Kerman, Iran. P. 47
- Terry, L. I. (1991). Pest and predator populations following early-season cotton insect control in Arizona. Southwest. Entomol. 16: 51–62
- Thompson V (1994) Spittlebug indicators of nitrogen-fixing plants. Ecol Entomol 19:391–398
- Thontadarya, T. S., and G. P. Channa Basavanna. (1959). Mode of egg laying in Tingidae (Hemiptera). Nature 184: 289–290.
- Tingey WM, Pillemer EA (1977) Lygus bugs: crop resistance and physiological nature of feeding injury. Bull Entomol Soc Am 23:277–287
- Tingey, W. M., and E. A. Pillemer. (1977). Lygus bugs: crop resistance and physiological nature of feeding. Bull. Entomol. Soc. Amer. 23: 277–287.
- Todd JW (1989) Ecology and behavior of *Nezara viridula*. Annu Rev Entomol 34:273–292
- Tugwell, P., S. C. Young, Jr., B. A. Dumas, and J. R. Phillips. (1976). Plant bugs in cotton: importance of infestation time, types of cotton injury, and significance of wild hosts near cotton. Arkansas Agric. Exp. Stn. Rep. Ser. 227: 1–24.
- Turnock, W. J., G. H. Gerber, B. H. Timlick, and R. J. Lamb. (1995). Losses of canola seeds from feeding by Lygus species [Heteroptera: Miridae] in Manitoba. Canad. J. Plant Sci. 75: 731–736.
- University of California. (1984). Integrated pest management for cotton in the western region of

- the United States. Univ. California Div. Agric. Nat. Resour. Publ. 3305: 1–144
- Valério JR, Lapointe SL, Kelemu S, Fernandes CD, Morales SJ (1996) Pests and diseases of *Brachiaria* species. In: Miles JW, Maass BL, do Valle CB (eds) *Brachiaria: biology, agronomy and improvement*. CIAT, Cali, Colombia, pp 87–105
- van Emden HF (1966) Studies on the relations of insect and host plant. III. A comparison of the reproduction of *Brevicoryne brassicae* and *Myzus persicae* (Hemiptera: Aphididae) on Brussels sprout plants supplied with different rates of nitrogen and potassium. *Entomologia Experimentalis et Applicata* 9:444–460
- van Emden HF (ed) (1972) *Aphid technology: special reference to aphids in the field*. Academic Press, New York, NY, 344 pp
- van Emden HF, Eastop VF, Hughes RD, Way MJ (1969) The ecology of *Myzus persicae*. *Annu Rev Entomol* 14:197–270
- Varis, A.-L. (1991). Effect of *Lygus* (Heteroptera: Miridae) feeding on wheat grains. *J. Econ. Entomol.* 84: 1037–1040.
- Voegelé, J. (1966). Review of biological control of Sunn pest. Pp. 23–33 in R. H. Miller and J. G. Morse [eds.], *Sunn Pests and Their Control in the Near East*. FAO Publ. No. 138. Rome, Italy. 165 pp
- Wheeler, A. G., Jr., and T. J. Henry. (1992). A Synthesis of the Holarctic Miridae (Heteroptera):

- Distribution, Biology, and Origin, with Emphasis on North America. Thomas Say Found. Monogr. Vol. 15. Entomological Society of America, Lanham, Maryland, U.S.A. 282 pp.
- Wightman, J. A., and D. N. J. Whitford. (1982). Integrated control of pests of legume seed crops. 1. Insecticides for mirid and aphid control. New Zealand J. Exp. Agric. 10: 209–215
- Wilde, G. E. (1997). Effect of imidicloprid seed treatment and planting time applications of insecticides on chinch bug (Hemiptera, Lygaeidae) and resulting yields of sorghum. J. Agric. Entomol. 14: 385–391.
- Wilde, G. E. (1979). Chinch bug (Heteroptera: Lygaeidae) resistance in grain sorghum. Proc. 34th Annu. Corn and Sorghum Industry Res. Conf. Amer. Seed Trade Assoc. Pub. 34: 188–192.
- Wilde, G., T. Mize, J. Stuart, J. Whitworth, and R. Kinsinger. (1984). Comparison of planting-time applications of granular or liquid insecticides and liquid fertilizer plus insecticide combinations for control of chinch bugs (Hemiptera, Lygaeidae) and greenbugs (Homoptera: Aphididae) on seedling sorghum. J. Econ. Entomol. 77: 706–708
- Wilson, R. L., and D. L. Olson. (1992). Tarnished plant bug, *Lygus lineolaris* (Palisot de Beauvois) (Hemiptera: Miridae): effect on yield of grain amaranth, *Amaranthus cruentus* L., in field cages. J. Kansas Entomol. Soc. 65: 450–452.

- Wimp, G.M. & T.G. Whitham. (2001). Biodiversity consequences of predation and host plant hybridization on an aphid-ant mutualism. *Ecology* 82: 440-452.
- Xia JY, van der Werf W, Rabbinge R (1999) Influence of temperature on bionomics of cotton aphid, *Aphis gossypii*, on cotton. *Entomol Exp Appl* 90:25–35
- Young OP (1986) Host plants of the tarnished plant bug, *Lygus lineolaris* (Heteroptera: Miridae). *Ann Entomol Soc Am* 79:747–762
- Young, O. P. (1986). Host plants of the tarnished plant bug, *Lygus lineolaris* (Heteroptera: Miridae). *Ann. Entomol. Soc. Amer.* 79: 747–762
- Zalom, F. G., C. Pickel, and N. C. Welch. (1990). Recent trends in strawberry arthropod management for coastal areas of the western United States. Pp. 239–259 in N. J. Bostanian, L. T. Wilson, and T. J. Dennehy [eds.], *Monitoring and Integrated Management of Arthropod Pests of Small Fruit Crops*. Intercept, Andover, U.K. 301 pp
- Zalom, F. G., C. Pickel, D. B. Walsh, and N. C. Welch. (1993). Sampling for *Lygus hesperus* (Hemiptera: Miridae) in strawberries. *J. Econ. Entomol.* 86: 1191–1195.