

الجمهورية العربية السورية  
وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي  
مديرية التعليم والارشاد

هدية الى  
مديرية التوثيق  
٠٢ وليد خزنة

# دليل الاسماء والتسميات

للمحاصيل الحقلية والخضراوات

اعداد  
المهندس الزراعي: يوسف كنج

سنة ١٩٧١

نشرة رقم ٣

هدية الى  
مديرية التوثيق  
٣٠ وليدخزنة

في د ليلنا هذا استعملنا الاسمدة التالية :

- نترات الامونياك عيار ٢٥ %
- سوبرفوسفات عادى عيار ١٦ - ١٨ %
- سوبرفوسفات مركز عيار ٤٦ - ٤٧ %
- سلفات البوتاس عيار ٥٠ %

واوردنا كميات الاسمدة اللازمة للدونم وافترضنا عدم استعمال  
السماد البلدى والاسمدة العضوية الاخرى واما الاسمدة البوتاسية  
فيكتفى باستعمالها في الاراضي التي تظهر استجابة للتسميد  
البوتاسي .

وقد رتبنا المزروعات حسب الحروف الهجائية ومتبعين التسلسل  
التالى :

تسميد المحاصيل الحقلية

تسميد الخضراوات

## تسميد المحاصيل الحقلية

### الاعلاف الخليطة :

يوضع للدونم الواحد ما يلي :

١٦ كغ نترات الامونياك

٥٠ كغ سوبرفوسفات عادى او ١٨ كغ سوبرفوسفات مركز

١٦ كغ سلفات البوتاس

تنثر كافة الازوتية والفسفورية والبوتاسية قبل الزرع وتطمر  
في التربة مع آخر فلاحه على عمق ٢٥ سم ، ثم يجرى  
الزرع ويسقى الحقل .

### البرسيم :

يوضع للدونم الواحد ما يلي :

٥٠ كغ سوبرفوسفات عادى او ١٨ كغ سوبرفوسفات مركز

ينثر السماد الفسفورى قبل الزرع ويقلب في التربة على عمق  
٢٥ سم ثم يجرى الزرع ، كما ويمكن اضافة ١٠ كغ نترات  
الامونياك قبل الزرع مع السماد الفسفورى اذا كانت التربة  
تفتقر الى عنصر الازوت .

## البقيسة :

يوضع للدونم الواحد ما يلي :

- ١٠ كغ نترات الامونيـاك
- ٣٠ كغ سوبرفوسفات عادى أو ١١ كغ سوبرفوسفات مركز
- ١٠ كغ سلفات البوتاس

تنثر كافة الاسمدة الازوتية والفوسفورية والبوتاسية قبـل

- الزرع وتقلب في التربة على عمق ٢٥ سم ثم يجرى الزرع

## البطاطا :

- للـعـرواـت الخريفية والربيعـية والصيفيـة
- يوضع للدونم الواحد ما يلي :

- ٤٠ كغ نترات الامونيـاك
- ٥٠ كغ سوبرفوسفات عادى أو ١٨ كغ سوبرفوسفات مركز
- ١٦ كغ سلفات البوتاس

تنثر الاسمدة الفوسفورية والبوتاسية ونصف كمية السماد الازوتى قبل الزرع وتقلب في التربة مع آخر فـلاحة ثم يجرى الزرع على خطوط وينثر النصف الثانى من السماد الازوتى بعد نحو شهر ونصف من الزرع على جانب الخطوط المزروعة ويظمر بعزقة خفيفة ويسقى الحقل



## البطاطا السكرية :

- يشابه تسميد البطاطا

## التبغ :

يوضع للدونم الواحد ما يلي :

- ١٠ كغ نترات الامونيوم
- ٢٥ كغ سوبرفوسفات عادي أو ٩ كغ سوبرفوسفات مركز
- ١٢ كغ سلفات البوتاس

تنثر كافة الاسمدة الآزوتية والفوسفورية والبوتاسية قبل التشتيل  
وتقلب في التربة على عمق ٢٥ سم ثم يجرى التشتيل على  
خطوط

## التمس :

يوضع للدونم الواحد ما يلي :

- ٣٥ كغ سوبرفوسفات عادي أو ١٣ كغ سوبرفوسفات مركز
- ١٠ كغ سلفات البوتاس

تنثر الاسمدة الفوسفورية والبوتاسية قبل الزرع وتقلب في التربة  
مع آخر فلاحه على عمق ٢٠ سم ثم يجرى الزرع

الجلبانسة :

- يشابه تسميد البيقية

الحبة السوداء :

- وهي المعروفة ايضا باسم حبة البركة  
يوضع للدونم الواحد ما يلي :

١٥ كغ نترات الامونيـاك

٢٥ كغ سوبرفوسفات عادي أو ٩ كغ سوبرفوسفات مركز

٨ كغ سلفات البوتاس

تنثر الاسدة الفوسفورية والبوتاسية ونصف كمية السماد الآزوتي قبل الزرع وتقلب في التربة مع آخر فلاحه على عمق ٢٠ سم ثم يجرى الزرع وينثر النصف الثاني من السماد الآزوتي بعد نحو شهرين من الزرع .

الحلبسة :

- يشابه تسميد البيقية

الحمص البعل :

- يشابه تسميد العدس البعل

## الحمص السقسي :

- يشابه تسميد العدس السقسي

## الخردل :

- يشابه تسميد الحبة السوداء

## الخبث :

- يشابه تسميد السمسم

## الذرة الصفراء :

- يشابه تسميد البطاطس

## الذرة البيضاء :

يوضع للدونم الواحد ما يلي :

٢٠ كغ نترات الامونيوم

٢٥ كغ سوبرفوسفات عادي أو ٩ كغ سوبرفوسفات مركز

١٠ كغ سلفات البوتاس

تنثر الاسمدة الفوسفورية والبوتاسية ونصف كمية السماد الآزوتي قبل الزرع وتقلب في التربة على عمق ٢٥ سم ثم يجرى الزرع على خطوط ، وينثر النصف الثاني من السماد الآزوتي على جانب الخطوط المزروعة بعد نحو شهر ونصف من الزرع ويظمر بعزقته ويسقى الحقل .

## ذرة المكائس :

يوضع للدونم الواحد ما يلي : :

١٥ كغ نترات الامونيـاك

٢٠ كغ سوبرفوسفات عادى أو ٧ كغ سوبرفوسفات مركز

٧ كغ سلفات البوتاس

تنثر الاسمدة الفوسفورية والبوتاسية ونصف كمية السماد الآزوتى قبل الزرع وتقلب في التربة على عمق ٢٥ سم ثم يجرى الزرع على خطوط ، وينثر النصف الثانى من السماد الآزوتى على جانـب الخطوط المزروعة بعد نحو شهر ونصف من الزرع ويـطـمر بعـزقـه ويسقى الحقل .

## الذرة العلفية :

يشابه تسميد ذرة المكائس .

## البر :

يوضع للدونم الواحد ما يلي : :

٤٠ كغ نترات الامونيـاك

٥٠ كغ سوبرفوسفات عادى أو ١٨ كغ سوبرفوسفات مركز

١٥ كغ سلفات البوتاس



تنثر الاسدة الفوسفورية والبوتاسية و ١٥ كغ من اصل  
السماد الآزوتي قبل الزرع وتقلب في التربة ثم يجرى الزرع ، وينثر  
١٥ كغ من السماد الآزوتي الباقي بعد نحو شهر ونصف  
من الزرع كدفعة ثانية ، وينثر ١٠ كغ من السماد الآزوتي  
الباقي كدفعة ثالثة وذلك بعد نحو شهر من نثر الدفعة  
الآزوتية الثانية .

### السم :

يوضع للدونم الواحد ما يلي :  
٢٠ كغ نترات الامونيـاك  
٥٠ كغ سوبرفوسفات عادى أو ١٨ كغ سوبرفوسفات مركز  
٢٠ كغ سلفات البوتاس

تنثر كافة الاسدة الآزوتية والفوسفورية والبوتاسية قبل السزوع  
وتقلب في التربة قم يجرى الزرع .

### الشعير المسقى :

يوضع للدونم الواحد ما يلي :  
١٥ كغ نترات الامونيـاك  
٢٥ كغ سوبرفوسفات عادى أو ٩ كغ سوبرفوسفات مركز  
١٠ كغ سلفات البوتاس

تنثر الأسمدة الفوسفورية والبوتاسية وثلث كمية السماد الأزوتي قبل الزرع وتقلب في التربة ثم يجرى الزرع ، وينثر الثلثان الباقيان من السماد الأزوتي عند الاشطاء أي بعد نحو شهر ونصف من الزرع ويسقى الحقل .

### الشعير البعل :

- ١ - في المناطق ذات امطار تفوق ٤٠٠ مم :
- يوضع للدونم الواحد ما يلي :
- ١٠ كغ نترات الامونياك  
٢٥ كغ سوبرفوسفات عادى أو ٩ كغ سوبرفوسفات مركز  
٥ كغ سلفات البوتاس

تنثر الأسمدة الفوسفورية والبوتاسية قبل الزرع وتطمر في التربة مع آخر فلاحه ثم يجرى الزرع ، وينثر السماد الأزوتي بكامله لدى الاشطاء أي بعد نحو شهر ونصف من الزرع .

- ٢ - في المناطق ذات امطار من ٣٠٠ - ٤٠٠ مم :
- يوضع للدونم الواحد ما يلي :
- ٢٥ كغ سوبرفوسفات عادى أو ٩ كغ سوبرفوسفات مركز

ينثر السماد الفوسفورى قبل الزرع ويقلب في التربة مع آخر فلاحه ثم يجرى الزرع .

## الشوندر السكرى :

- للعروتين الخريفية والصيفيية
- يشابه تسميد البطاطس

## الشوندر العلفى :

- يوضع للدونم الواحد ما يلي :
- ٢٥ كغ نترات الامونيكا
- ٣٥ كغ سوبرفوسفات عادى أو ١٣ كغ سوبرفوسفات مركز
- ١٠ كغ سلفات البوتاس

تنثر الا سمدة الذوسفورية والبوتاسية ونصف كمية السماد الآزوتى قبل الزرع وتقلب في التربة مع آخر فلاحه ثم يجرى الزرع على خطوط ، وينثر النصف الثانى من السماد الآزوتى بعد نحو شهر ونصف من الزرع على جانب الخطوط المزروعة ويطمر بعزقته خفيفه ويسقى الحقل

## الشيلم :

- يشابه تسميد الشعير السقى

## عباد الشمس السقى :

- يشابه تسميد السمسم

## عباد الشمس البعل :

- يشابه تسميد السمسم انما تنقص كميات الاسمدة الى النصف

## العدس السقي :

يوضع للدونم الواحد ما يلي :

٣٦ كغ سوبرفوسفات عادى أو ١٣ كغ سوبرفوسفات مركز

١٢ كغ سلفات البوتاس

تنثر الاسمدة الفوسفورية والبوتاسية قبل الزرع وتقلب في التربة

- مع آخر فلاحة ثم يجرى الزرع

## العدس البعل :

١ - في المناطق ذات امطار تفوق ٤٠٠ مم :

يوضع للدونم الواحد ما يلي :

٢٤ كغ سوبرفوسفات عادى أو ٩ كغ سوبرفوسفات مركز

٨ كغ سلفات البوتاس

تنثر الاسمدة الفوسفورية والبوتاسية قبل الزرع وتقلب

- في التربة مع آخر فلاحة ثم يجرى الزرع

٢ - في المناطق ذات امطار من ٣٠٠ - ٤٠٠ مم :

يوضع للدونم الواحد ما يلي :



٢٤ كغ سوبرفوسفات عادى أو ٩ كغ سوبرفوسفات مركز  
ينثر السماد الفوسفورى قبل الزرع ويقلب في التربة مع آخر  
• فلاحه ثم يجرى الزرع

### العصفور :

• يشابه تسميد السمسم

### القول السودانى :

• وهو المعروف باسم الفستق السودانى

يوضع للدونم الواحد ما يلى :

١٠ كغ نترات الامونياك

٤٠ كغ سوبرفوسفات عادى أو ١٤٥ كغ سوبرفوسفات مركز

٨ كغ سلفات البوتاس

تنثر كافة الاسمدة الآزوتية والفوسفورية والبوتاسية بوقت واحد قبل الزرع وتقلب

مع آخر فلاحه على عمق ٢٥ سم ثم يجرى الزرع على خطوط ويسقى الحقل

### الفصاة :

يوضع للدونم الواحد ما يلى :

٥٠ كغ سوبرفوسفات عادى أو ١٨ كغ سوبرفوسفات مركز

ينثر السماد الفوسفورى قبل الزرع أو باكرا قبل الحشة الاولى أو بعد ها

مباشرة ويسقى الحقل ، كما ويمكن اضافة ١٠ كغ نترات الامونياك قبل

الزرع مع السماد الفوسفورى اذا كانت التربة بحاجة له

## الفلفل :

يوضع للدونم الواحد ما يلي :

٣٠ كغ نترات الامونيكا

٤٠ كغ سوبرفوسفات عادي أو ٥٤ كغ سوبرفوسفات مركز

٢٠ كغ سلفات البوتاس

تنثر الاسمدة الفوسفورية والبوتاسية وثلثي السماد الآزوتي  
أي ٢٠ كغ قبل الزرع وتقلب في التربة مع آخر فلاحه على عمق ٢٠ سم  
ثم يجرى الزرع ، وينثر الثلث الباقي من السماد الآزوتي  
أي ١٠ كغ بعد نحو شهرين من الزرع ويسقى الحقل .

## فول الصويا :

يشابه تسميد السمسم .

## قصب السكر :

يوضع للدونم الواحد ما يلي :

٣٥ كغ نترات الامونيكا

٢٠ كغ سوبرفوسفات عادي أو ٧ كغ سوبرفوسفات مركز

١٠ كغ سلفات البوتاس

تنثر الاسمدة الفوسفورية والبوتاسية و ٢٠ كغ من أصل كميّة  
السماد الآزوتي قبل الزرع وتقلب في التربة ثم يجرى

الزراع على خطوط ، وتنثر كمية ١٥ كغ من السماد  
الآزوتي الباقي بعد نحو شهر ونصف من الزرع على جانب  
الخطوط المزروعة وتطمر بعزقة خفيفة ويسقى الحقل .

### القطن :

يوضع للدونم الواحد ما يلي :

٤٠ كغ نترات الامونيكا

٥٠ كغ سوبرفوسفات عادي أو ١٨ كغ سوبرفوسفات مركز

١٦ كغ سلفات البوتاس

تنثر الاسمدة الفوسفورية والبوتاسية ونصف كمية السماد الآزوتي  
قبل الزرع وتقلب في التربة مع آخر فلاحه على عمق ٢٠ سم  
ثم يجري الزرع على خطوط ، وينثر النصف الثاني  
من السماد الآزوتي بعد نحو شهر ونصف من الزرع على  
جانب الخطوط المزروعة ويطمر بعزقة خفيفة ويسقى الحقل .

### القمح البلدي السقي :

يوضع للدونم الواحد ما يلي :

٣٠ كغ نترات الامونيكا

٣٦ كغ سوبرفوسفات عادي أو ١٣ كغ سوبرفوسفات مركز

١٢ كغ سلفات البوتاس



تنثر الأسمدة الفوسفورية والبوتاسية وثلاث كمية السماد الآزوتي  
أى ١٠ كغ قبل الزرع وتقلب في التربة مع آخر فلاحه على عمق  
٢٠ سم ثم يجرى الزرع ، وينثر الثلثان الباقيان من السماد  
الآزوتي أى ٢٠ كغ لدى الأشطاء ويكون ذلك عادة بعد نحو  
شهر ونصف من الزرع ويعقب ذلك سقاية .

### القمح البلدى البعسل :

١ - في المناطق ذات امطار تفوق ٤٠٠ مم :

يوضع للدونم الواحد ما يلي :

٢٠ كغ نترات الامونياك

٣٦ كغ سوبرفوسفات عادى أو ١٣ كغ سوبرفوسفات مركز

٨ كغ سلفات البوتاس

تنثر الأسمدة الفوسفورية والبوتاسية قبل الزرع وتقلب  
في التربة مع آخر فلاحه على عمق ٢٠ سم ثم يجرى  
الزرع ، وينثر السماد الآزوتي بكامله لدى الأشطاء  
ويكون ذلك عادة بعد نحو شهر ونصف من الزرع .

٢ - في المناطق ذات امطار من ٣٠٠ - ٤٠٠ مم :

يسوضع للدونم الواحد ما يلي :

٣٦ كغ سوبرفوسفات عادى أو ١٣ كغ سوبرفوسفات مركز

ينثر السماد الفوسفورى قبل الزرع ويقلب في التربة مع

آخر فلاحه على عمق ٢٠ سم ثم يجرى الزرع .



## القنب :

يوضع للدونم الواحد ما يلي :

١٥ كغ نترات الامونياك

٣٠ كغ سوبرفوسفات عادي أو ١١ كغ سوبرفوسفات مركز

١٠ كغ سلفات البوتاس

تنثر كافة الاسمدة الآزوتية والفوسفورية والبوتاسية قبل المزرع  
وتقلب في التربة مع آخر فلاحه على عمق ٢٠ سم ثم يجرى  
الزرع ويسقى الحقل .

## الكتان :

• يشابه تسميد القنب

## الكراميس :

• يشابه تسميد الكمون

## الكرسنة :

• يشابه تسميد البيقية

## الكمون :

يوضع للدونم الواحد ما يلي :

- ٣٠ كغ نترات الامونياك
- ٤٠ كغ سوبرفوسفات عادى أو ١٤٥ كغ سوبرفوسفات مركز
- ٢٠ كغ سلفات البوتاس

تنثر الاسمدة الفوسفورية والبوتاسية وثلثي كمية السماد الآزوتي  
 أى ٢٠ كغ قبل الزرع وتقلب في التربة مع آخر فلاحه على  
 عمق ٢٠ سم ثم يجرى الزرع ، وينثر الثلث الباقي  
 من السماد الآزوتي أى ١٠ كغ بعد نحو شهرين من الزرع .

### اليانسون :

- يوضع للدونم الواحد ما يلي :
- ٣٠ كغ نترات الامونياك
  - ٣٦ كغ سوبرفوسفات عادى أو ١٣ كغ سوبرفوسفات مركز
  - ١٢ كغ سلفات البوتاس

تنثر الاسمدة الفوسفورية والبوتاسية وثلث كمية السماد الآزوتي  
 أى ١٠ كغ قبل الزرع وتقلب في التربة مع آخر فلاحه على عمق  
 ٢٠ سم ثم يجرى الزرع ، وينثر الثلثان الباقيان من كمية  
 السماد الآزوتي أى ٢٠ كغ بعد نحو شهر ونصف من الزرع .



النصف الثاني من السماد الآزوتي بعد نحو شهر ونصف من

- الزرع ويظمر بعزقة خفيفة ويسقى الحقل

الباميساء :

- يشابه تسميد الباذنجان

البراصيما :

- يشابه تسميد البصل

الباريزيلا :

يوضع للد ونم الواحد ما يلي :

١٠ كغ نترات الامونياك

٣٠ كغ سوبرفوسفات عادي أو ١١ كغ سوبرفوسفات مركز

١٠ كغ سلفات البوتاس

تنثر كافة الاسمدة الآزوتية والفوسفورية والبوتاسيية

- قبل الزرع وتقلب في التربة ثم يجرى الزرع

البقلية :

- يشابه تسميد الباريزيلا



## البصل :

يوضع للدونم الواحد ما يلي :

٤٠ كغ نترات الامونيكا

٦٠ كغ سوبرفوسفات عادي أو ٢١٥ كغ سوبرفوسفات مركز

٢٠ كغ سلفات البوتاس

تنثر الاسمدة الفوسفورية والبوتاسية ونصف كمية السماد الآزوتي قبل الزرع وتقلب في التربة ثم يجرى الزرع ، وينثر النصف الثاني من السماد الآزوتي بعد نحو شهر ونصف من الزرع ويسقى الحقل .

## البنسورة :

يوضع للدونم الواحد ما يلي :

٤٠ كغ نترات الامونيكا

٧٠ كغ سوبرفوسفات عادي أو ٢٥ كغ سوبرفوسفات مركز

٢٥ كغ سلفات البوتاس

تنثر الاسمدة الفوسفورية والبوتاسية ونصف كمية السماد الآزوتي قبل الزرع وتقلب في التربة ثم يجرى الزرع على خطوط ، وينثر النصف الثاني من السماد الآزوتي على جانب الخطوط المزروعة بعد نحو شهر ونصف من الزرع ويظهر بعزقة خفيفة ويسقى الحقل .

## البقدونس :

يوضع للدونم الواحد ما يلي :

٤٠ كغ نترات الامونياك

٥٠ كغ سوبرفوسفات عادى أو ١٨ كغ سوبر فوسفات مركز

٢٠ كغ سلفات البوتاس

تنثر الاسمدة الفوسفورية والبوتاسية ونصف كمية السماد الآزوتى قبل الزرع وتقلب في التربة ثم يجرى الزرع ، وينثر ربيع السماد الآزوتى أى ١٠ كغ بعد نحو شهر ونصف من الزرع كدفعة ثانية ، ثم ينثر الربيع الاخير من السماد الآزوتى أى ١٠ كغ كدفعة ثالثة وذلك بعد نحو شهر من نثر الدفعة الآزوتية الثانية .

## الثوم :

• يشابه تسميد البصل

## الجزر :

يوضع للدونم الواحد ما يلي :

٤٠ كغ نترات الامونياك

٥٠ كغ سوبرفوسفات عادى أو ١٨ كغ سوبرفوسفات مركز

٢٠ كغ سلفات البوتاس

تنثر الاسدة الفوسفورية والبوتاسية ونصف كمية السماد الآزوتي قبل الزرع وتقلب في التربة ثم يجرى الزرع على خطوط ، وينثر النصف الثاني من السماد الآزوتي بعد نحو شهر ونصف من الزرع على جانب الخطوط المزروعة ويظمر بعزقة خفيفة ويسقى الحقل .

### الخيار :

يوضع للدونم الواحد ما يلي :

٤٥ كغ نترات الامونياك

٧٥ كغ سوبرفوسفات عادى أو ٢٧ كغ سوبرفوسفات مركز

١٥ كغ سلفات البوتاس

تنثر الاسدة الفوسفورية والبوتاسية و ٢٥ كغ من السماد الآزوتي قبل الزرع وتقلب في التربة ثم يجرى الزرع على خطوط ، وينثر ما تبقى من السماد الآزوتي أى ٢٠ كغ بعد نحو شهر ونصف من الزرع على جانب الخطوط المزروعة ويظمر بعزقة خفيفة ويسقى الحقل .

### الخس البلدى :

يوضع للدونم الواحد ما يلي :

٢٥ كغ نترات الامونياك

٢٥ كغ سوبرفوسفات عادى أو ٩ كغ سوبر فوسفات مركز

١٠ كغ سلفات البوتاس

تنثر كافة الأسمدة الآزوتية والفوسفورية والبوتاسية قبل السـزرع  
وتقلب في التربة ثم يجرى السزرع ويسقى السقل

السلس الأفرنجي :

يشابه السمس السلس السلس

السلس :

يشابه السمس السلس والسلس

السلس :

يشابه السمس السلس والسلس

السلس :

يشابه السمس السلس والسلس

السلس :

يوضع للسلس الواحد ما يسلس :

٥٠ كغ نترات الأمونياك

٥٠ كغ سوبرفوسفات عادي أو ١٨ كغ سوبرفوسفات مركز

٢٠ كغ سلفات البوتاس



تنثر الأسمدة الفوسفورية والبوتاسية ونصف كمية السماد الآزوتي قبل الزرع وتقلب في التربة ثم يجرى الزرع ، وينثر النصف الثاني من السماد الآزوتي بعد نحو شهر ونصف من الزرع ويظمر بعزق خفيفة ويسقى الحقل .

### السلق :

يوضع للدونم الواحد ما يلي :

٥٠ كغ نترات الامونياك

٦٠ كغ سوبرفوسفات عادي أو ٥٠ ر ٢١ كغ سوبرفوسفات مركز

٢٠ كغ سلفات البوتاس

تنثر الأسمدة الفوسفورية والبوتاسية وثلث كمية السماد الآزوتي قبل الزرع وتقلب في التربة ثم يجرى الزرع ، وينثر الثلثان الباقيان من السماد الآزوتي بعد نحو شهر ونصف من الزرع ويسقى الحقل .

### الشوندر الأحمر :

يوضع للدونم الواحد ما يلي :

٤٠ كغ نترات الامونياك

٥٠ كغ سوبرفوسفات عادي أو ١٨ كغ سوبرفوسفات مركز

١٦ كغ سلفات البوتاس

تنثر الاسمدة الفوسفورية والبوتاسية و نصف كمية السماد الآزوتي قبل الزرع وتقلب في التربة مع آخر فلاحه ثم يجرى الزرع ، وينشتر النصف الثاني من السماد الآزوتي بعد نحو شهر ونصف من الزرع \*

### الطرخون :

- يشابه تسميد البقد ونسب

### الفاصولياء الخضراء :

- يشابه تسميد البازيلاء

### الفاصولياء الحبيبة :

يشابه تسميد البازيلاء

### الفجل :

يشابه تسميد الجزر

### الذيلولة :

يوضع للدونم الواحد ما يلي :

٣٠ كغ نترات الامونياك

٤٠ كغ سوبرفوسفات عادى أو ٥٠ ر ١٤ كغ سوبرفوسفات مركز

٢٠ كغ سلفات البوتاس

تنثر الا سمدة الفوسفورية والبوتاسية وثلثي السماد الآزوتي  
أى ٢٠ كغ قبل الزرع وتقلب في التربة مع آخر فلاحه ثم يجرى  
الزرع ، وينثر الثلث الباقي من السماد الآزوتي أى ١٠ كغ  
بعد نحو شهرين من الزرع ويسقى الحقل .

### الفول :

يوضع للدونم الواحد ما يلي :  
٣٦ كغ سوبرفوسفات عادى أو ١٣ كغ سوبرفوسفات مركز  
١٢ كغ سلفات البوتاس

تنثر الا سمدة الفوسفورية والبوتاسية قبل الزرع وتقلب في  
التربة مع آخر فلاحه ثم يجرى الزرع .

### القرنبيط :

يوضع للدونم الواحد ما يلي :  
٤٠ كغ نترات الامونياك  
٦٠ كغ سوبرفوسفات عادى أو ٢١ كغ سوبرفوسفات مركز  
٢٠ كغ سلفات البوتاس

تنثر الا سمدة الفوسفورية والبوتاسية ونصف كمية السماد  
الآزوتي قبل الزرع وتقلب في التربة مع آخر فلاحه ثم يجرى  
الزرع ، وتنثر ربع كمية السماد الآزوتي أى ١٠ كغ بعد نحو

شهر ونصف من الزرع كدفعة ثانية ، وينثر الربيع الاخير  
من السماد الآزوتي أى ١٠ كغ كدفعة ثالثة بعد شهر  
من نثر الدفعة الآزوتية الثانية .

القشياء :

- يشابه تسميد الخييار

القرع :

- يشابه تسميد الخييار

الكرنب :

- يشابه تسميد الجزر

الكرنبرة :

- يشابه تسميد البقدونس

الكوسس :

- يشابه تسميد الخييار

اللفت :

- يشابه تسميد الجزر



## اللوبياء :

- يشابه تسميد البازيلاء

## المشاش :

- يشابه تسميد السبانخ

## الملفوف :

يوضع للدونم الواحد ما يلي :

٥٠ كغ نترات الامونياك

٦٠ كغ سوبرفوسفات عادي أو ٥٠ ر ٢١ كغ سوبرفوسفات مركز

٢٠ كغ سلفات البوتاس

تنثر الاسمدة الفوسفورية والبوتاسية ونصف كمية السماد الآزوتي قبل الزرع وتقلب في التربة مع آخر فلاحة ثم يجرى الزرع ، وينثر النصف الثاني من السماد الآزوتي بعد نحو شهر ونصف من

- الزرع ويسقى الحقل

## الملوخية :

- يشابه تسميد السبانخ

## النعنع :

يوضع للدونم الواحد ما يلي :

١٠ كغ نترات الامونياك

٢٠ كغ سوبرفوسفات عادى أو ٧ كغ سوبرفوسفات مركز

١٥ كغ سلفات البوتاس

تنثر كافة الازوتية والفوسفورية والبوتاسية

قبل الزرع وتقلب في التربة مع آخر فلاحه ثم يجرى

الزرع ويسقى الحقل .

## الهليمون :

يوضع للدونم الواحد ما يلي :

٤٠ كغ نترات الامونياك

٤٠ كغ سوبرفوسفات عادى أو ٥ر٤١ كغ سوبرفوسفات مركز

١٥ كغ سلفات البوتاس

تنثر الازوتية والفوسفورية والبوتاسية ونصف كمية

السماد الازوتية قبل الزرع وتقلب في التربة

مع آخر فـلاحة قم يجـرى الزرع ، وينثر النصف الثاني  
من السماد الأزوتي بعد نحو شهرين من البذر  
ويسقى الحقل .

الهند به :

• يشابه تسميد الخس

الباقيين :

• يشابه تسميد الخيار

