

١


1-

(C) 160 \triangle

2-

(C) -2 \triangle

3-



$20 \times 1 + 50 \times 2 - R_2 \times 4 = 0$ \triangle

$120 = 4R_2 \Rightarrow R_2 = 30 \text{ kg} \cdot P$ \triangle

$\therefore R_1 = 40 \text{ kg} \cdot P$ \triangle

4-

∴ les deux forces 15 et 15

forment un couple de moment M_1

$$M_1 = 15 \times 40 = 600 \text{ dyne.cm} \quad \left(\frac{1}{2}\right)$$

∴ les deux forces 30 et 30

forment un couple de moment M_2

$$M_2 = -30 \times 30 = -900 \text{ dyne.cm} \quad \left(\frac{1}{2}\right)$$

le système équivaut un couple de moment M

$$M = M_1 + M_2 = 600 - 900 = -300 \text{ dyne.cm}$$

$$\|\vec{M}\| = 300 \text{ dyne.cm} \quad \left(\frac{1}{2}\right)$$

en équilibre les deux forces F et F


forment un couple équivaut le couple

resultant et de sens contraire

$$\therefore M_1 + M_2 = 0$$

$$\therefore F \times 50 = 300$$

$$F = 6 \text{ dyne} \quad \left(\frac{1}{2}\right)$$



(تراجعى الحلول الأخرى)

5-

$$(a) -1 \quad \Delta$$

6-

$$(c) 5 \quad \Delta$$

7-

(a)

$$\vec{r} = \vec{BA} = \vec{A} - \vec{B}$$

$$\vec{r} = (1; -1; 4) - (2; -3; 1)$$

$$= (-1; 2; 3) \quad \left(\frac{1}{2}\right)$$

$$\vec{n}_B = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ -1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & -1 \end{vmatrix} \quad \left(\frac{1}{2}\right)$$

$$= -11\vec{i} + 5\vec{j} - 7\vec{k} \quad \left(\frac{1}{2}\right)$$

la longueur de la perpendiculaire = $\frac{\|\vec{n}_B\|}{\|\vec{F}\|} \quad \left(\frac{1}{2}\right)$

$$= \frac{\sqrt{(-11)^2 + (5)^2 + (-7)^2}}{\sqrt{(2)^2 + (3)^2 + (-1)^2}} \approx 3,7 \quad \left(\frac{1}{2}\right) \text{ unités de longueur}$$

(b)

$$DB = \sqrt{9^2 + 12^2} = 15 \text{ cm}$$

$$DC = \sqrt{(25)^2 - (15)^2} = 20 \text{ cm}$$

$$EF = 5 \sin \theta = 5 \times \frac{20}{25} = 4 \text{ cm}$$

$$M_C = 0$$


$$\therefore 50 \times 20 + 75 \times 12 - F \times 25 = 0$$

$$F = 76 \text{ Newton}$$

$$M_E = -76 \times 5 + 75 \times 12 + 50 \times 4$$

$$M_E = 720 \text{ Newton.cm}$$

(تراجعى الحلول الأخرى)



8-

(b) 12 \triangle

9-

(a) (3; 3) \triangle

10-

(a) ∴ l'échelle en équilibre

(i) ∴ $\sum X = 0$; $\sum Y = 0$

$$R_1 = \frac{1}{4} R_2 \quad (1)$$

$$R_2 + \frac{2}{3} R_1 = P \quad (2)$$

de (1) et (2)

$$4 R_1 + \frac{2}{3} R_1 = P$$

$$\Rightarrow \frac{14}{3} R_1 = P \Rightarrow R_1 = \frac{3}{14} P \text{ et } R_2 = \frac{6}{7} P \quad (1/2)$$

(ii)

$$\sum M_B = 0 \quad (1/2)$$

(On suppose que la longueur de l'échelle est $2l$)

$$\therefore -R_1 (2l \sin \theta) - \frac{2}{3} R_1 (2l \cos \theta) + P (l \cos \theta) = 0$$

$$-\frac{3}{14} P (2l \sin \theta) - \frac{2}{3} \times \frac{3}{14} P (2l \cos \theta) + l P \cos \theta = 0$$

$$-\frac{3}{7} \tan \theta - \frac{2}{7} + 1 = 0 \quad (\text{on divise par } (P l \cos \theta))$$

$$\frac{3}{7} \tan \theta = \frac{5}{7}$$

$$\tan \theta = \frac{5}{3} \quad \therefore m(\angle \theta) = 59^\circ 2' \quad (1/2)$$

(b)

de l'équilibre

$$x = 0 ; y = 0$$

$$R_x = T \cos \theta ; R_y = P - T \sin \theta$$

On suppose que la longueur de la barre est $2l$

$$\therefore M_A = 0$$

$$\therefore -P(l \cos \theta) + T \sin \theta (2l \cos \theta) + T \cos \theta$$

$$(2l \sin \theta) = 0 \quad \text{on divise par } (l \cos \theta)$$

$$\therefore -P + 4T \sin \theta = 0$$

$$\therefore P = 4T \sin \theta \Rightarrow T = \frac{P}{4 \sin \theta}$$


$$R_x = \frac{P \cos \theta}{4 \sin \theta} = \frac{P}{4} \cot \theta$$

$$R_y = P - \frac{P}{4 \sin \theta} \times \sin \theta = \frac{3}{4} P$$

$$R = \sqrt{(R_x)^2 + (R_y)^2} = \sqrt{\frac{P^2}{16} \cot^2 \theta + \frac{9}{16} P^2}$$

$$R = \frac{P}{4} \sqrt{\cot^2 \theta + 9}$$

(تراجع الحلول الأخرى)



٧

11-

(a) 84 

12-


(c) 90 

13-

$$R = 80 \cos \theta + 160 \sin \theta \quad \left(\frac{1}{2}\right)$$

$$R = 80 \times \frac{4}{5} + 160 \times \frac{3}{5}$$

$$R = 160 \text{ Newton} \quad \left(\frac{1}{2}\right)$$




∴ le mouvement vers le haut

$$\therefore 160 \cos \theta = \mu_s R + 80 \sin \theta \quad \left(\frac{1}{2}\right)$$

$$\mu_s R = 160 \times \frac{4}{5} - 80 \times \frac{3}{5} = 80 \quad \left(\frac{1}{2}\right)$$

$$160 \mu_s = 80 \Rightarrow \mu_s = \frac{1}{2} \quad \left(\frac{1}{2}\right)$$

14-



$$\frac{\text{L'aire du rectangle NLCE}}{\text{L'aire du rectangle ABCD}} = \frac{4 \times 6}{8 \times 4} = \frac{1}{4} \quad \left(\frac{1}{2}\right)$$

$$X_G = \frac{(4k)(6) + (-k)(9)}{(4k) + (-k)} = 5 \text{ cm} \quad \left(\frac{1}{2}\right)$$

$$Y_G = \frac{(4k)(4) + (-k) \times 6}{(4k) + (-k)} = \frac{10}{3} \text{ cm} \quad \left(\frac{1}{2}\right)$$

| | | |
|---|----|----|
| | 4k | -k |
| x | 6 | 9 |
| y | 4 | 6 |

∴ le Centre de gravité de la partie restante

est $(5; \frac{10}{3})$

$$\tan \theta = \frac{y}{x} = \frac{10}{3} \div 5 = \frac{2}{3} \quad \left(\frac{1}{2}\right)$$

(تراجعى الحلول الأخرى)

15-

(c) $[0; 12]$ \triangle


16-

(c) La somme de moments des forces par rapport au point quelconque s'annule et la résultante des forces s'annule \triangle

17-

$$\vec{R} = 8\vec{e} + 9\vec{e} - 7\vec{e} - 4\vec{e}$$

$$\vec{R} = 6\vec{e}$$



$\therefore R = 6$ Newton et applique à la ligne

d'action de deux forces 8 N et 9 N \triangle

on suppose que la résultante applique

au point à la distance x du point A

\therefore la somme de moments des forces par

rapport A = le moment résultant par

rapport A \triangle

$$\therefore 6x = (-4)(30) + (-7)(60) + 9 \times 90 \triangle$$

$$\therefore 6x = 270 \Rightarrow x = 45 \text{ cm} \triangle$$

18-

→ la barre est équilibrée

→ les forces R et 20 N

forment un couple de

moment = 250 N·cm

où $R = \text{pesoids} = 20 \text{ N}$ $\left(\frac{1}{2}\right)$

\vec{R} vertical vers le haut


$$M_1 + M_2 = 0 \quad \left(\frac{1}{2}\right)$$

$$-20 \cdot CD = -250$$

$$20 \times 25 \sin \theta = 250 \quad \left(\frac{1}{2}\right)$$

$$\sin \theta = \frac{1}{2}$$

$$\theta = 30^\circ \quad \text{ou} \quad \theta = 150^\circ \quad \left(\frac{1}{2}\right)$$



(تراجعى الحلول الأخرى)

(انتهت الإجابة وتراجعى الحلول الأخرى)