

١

(درجة واحدة)

ص ١٣٨

ص ١١٨

إجابة السؤال (١) :

(أ) الأنترفيرونات.

(ب) بروتينات غير هستونية تركيبية.

(درجة واحدة) ص ٤٥

حيث إنها لوقطعت لعدة أجزاء على مستوى عرضي أو لجزئين طولياً فإن كل جزء ينمو إلى فرد جديد مستقل.

(درجة واحدة)

ص ١١

(أ) تشكل هذه العظام تجويفاً يستقر فيه المخ لحمايته.

(ب) يحدث لها تقلص لتشد النبات إلى أسفل وتظل الساق الأرضية المختزنة دائمًا على بعد ملائم عن سطح الأرض يزيد من تدعيمها وتأمين أجزائها الهوائية ضد الرياح.

(درجة واحدة) ص ٨٨

إجابة السؤال (٤) :

(ج) الخلايا التائية المثبتة.

(درجة واحدة)

(أ) لأنها ناتج من نضج الجراثيم التي تحررت من الحوافظ وعددتها الصبغى (ن) ص ٥٣.

(ب) لإبقاء درجة حرارتها أقل من درجة حرارة الجسم بما يناسب تكوين الحيوانات المنوية بهما.

(درجة واحدة) ص ١٣٨

إجابة السؤال (٦) :

عن طريق عزل أو نقل الجينات الموجودة في النباتات البقوية التي تمكناها من استضافة البكتيريا القادرة على تثبيت النيتروجين الجوي في جذورها وزرع تلك الجينات في محاصيل أخرى.

(درجتان) ص ١٣٦

إجابة السؤال (٧) :


أولاً:

..... TAC GGA ACT CGT TAC ٥ ..... ٣

ثانياً: ٥ أحماض أمينية.

(درجتان)

إجابة السؤال (٨) :



(درجتان) ص ٩١

إجابة السؤال (٩) :

أولاً: منطقة متغيرة

ثانياً: يرتبطان معاً من خلال الجزء المتغير الموجود على الجسم المضاد، حيث إن شكله يتغير من جسم مضاد لآخر.

(درجة واحدة)

ثالثاً: المناعة الخاطئة أو المناعة بالأجسام المضادة.

(نصف درجة) ص ٩٥

(درجة واحدة)

٥٥ ص

٤٦ ص

إجابة السؤال (١٠) :

(أ) الزهرة النموذجية.

(ب) الجراثيم.

(درجة واحدة) ص ١٣٤

إجابة السؤال (١١) :

يتم تحضير شريط مفرد لتابع النيوكليوتيديات يتكامل مع أشرطة الجين محل الدراسة وتستخدم النظائر المشعة في تحضير هذا الشريط حتى يسهل التعرف عليه بعد ذلك. ثم يخلط هذا الشريط مع العينة غير المعروفة ويستدل على وجود الجين في الخليط بالسرعة التي تتكون لها اللواليب المزدوجة المشعة.

(درجة واحدة) ص ٥٢

إجابة السؤال (١٢) :

تطلق مادة سامة فيظهر على المصاب أعراض حمى الملاريا.

(ارتفاع درجة الحرارة - رعشة - عرق غزير)

(درجة واحدة)

٧٠ ص

إجابة السؤال (١٣) :

(أ) الثالث.

(درجة واحدة) ص ٩١

إجابة السؤال (١٤) :

تمنعها من الالتصاق بأغشية الخلايا والانتشار والتفاوت إلى داخلها وبالتالي تمنع تنا藓ها.


(درجة واحدة) ص ٦١

إجابة السؤال (١٥) :

الجهاز التناسلي المؤنث	الجهاز التناسلي المذكر
• إنتاج البويضات وهرمونات الأنوثة.	• إنتاج الحيوانات المنوية
• تهيئة مكان آمن لإنجاب البويضة وأيواء الجنين حتى الولادة. ص ٦٤	• إفراز الهرمونات الذكورية الثانوية.


(درجتان)

(ب)



(درجتان) ص ١٣

(أ)



إجابة السؤال (١٦) :

أولاً : مفصل غضروفى.

ثانياً : تقل الحركة نتيجة احتكاك الفقرات مع بعضها البعض.

ثالثاً : يحصل على الغذاء والأكسجين من خلايا العظام بالانتشار.

رابعاً : يعمل كدعامة رئيسية للجسم (حماية الحبل الشوكي).

١٠ ص

(درجتان) ص ١٣٠-١٣١

(درجة واحدة)

..... AUG AGG AUG AGG UAA .....

(نصف درجة)

(نصف درجة)

**إجابة السؤال (١٨) :**

**أولاً:**

**tRNA ٢**

(درجة واحدة)

إجابة السؤال (١٩) :

أ- بطء نمو المنطقة التي تلامس الدعامة على حين يسرع نمو المنطقة التي لا تلامسه فتستطيع مما يؤدي إلى التفاف الحلق حول الدعامة.

ص ١٦

ب- لكي تتصل بخيوط الأكتين بمساعدة أيونات الكالسيوم ويحدث الانقباض العضلي

في وجود الخطاطيف وجزيئات ATP.

ص ٢٠

(درجة واحدة) ص ٨٨

إجابة السؤال (٢٠) :

(د) وحيدة النواة.

(درجة واحدة) ص ٦٩

إجابة السؤال (٢١) :

نتيجة زيادة سمك بطانة الرحم وزيادة الإمداد الدموي لها للتنفس البويضة المخصبة بين ثنایا بطانة الرحم في نهاية الأسبوع الأول لتستمر لنهاية الحمل.

(درجة واحدة) ص ١٢٧

إجابة السؤال (٢٢) :

لن يتم بناء الريبوسومات وبالتالي لن يتكون البروتين.

(درجة واحدة) ص ٩٢

إجابة السؤال (٢٣) :

التلازن (التلاصق).

(درجة واحدة)

٥٢ ص

٦٦ ص

إجابة السؤال (٢٤) :

١ - (٢ ن)

٢ - (ن)

(درجتان)

٩٩-٩٨ ص

إجابة السؤال (٢٥) :

(أ)

بروتين البيرفورين	الليمفوكينات
يقوم بتنقية غشاء الجسم الغريب (الميكروب أو الخلايا السرطانية).	هي التي تثبط أو تكتب الاستجابة المناعية أو تعطلها وبذلك تتوقف الخلايا البائية (B) عن إنتاج الأجسام المضادة وموت الكثير من الخلايا التائية.

٨٨ ص

(ب)

الخلايا التائية المساعدة	الخلايا التائية القاتلة
تنشط الأنواع الأخرى من الخلايا التائية وتحفظها للقيام باستجاباتها وكذلك تحفز الخلايا البائية لانتاج الأجسام المضادة.	تهاجم الخلايا الغريبة والخلايا السرطانية والأعضاء المزروعة وخلايا الجسم المصابة بالفيروس

**٣٤ (درجتان) ص**

**إجابة السؤال (٢٦) :**

<b>الوظيفة</b>	<b>المكان</b>	
يعمل على تنشيط هرمونات القشرة الثلاثة.	يفرز من الفص الأمامي للغدة النخامية.	ACTH
يفرز الهرمون القابض للأوعية الدموية. ص ٣٢	تحت المهداد بالمخ (الخلايا العصبية المفرزة).	ADH

**١١٣ - ١١٢ (درجتان) ص**

**إجابة السؤال (٢٧) :**

**أولاً:**

(١) رابطة هيدروجينية ثنائية.

(٢) رابطة هيدروجينية ثلاثية.

(٣) مجموعة الهيدروكسيل (OH)

**ثانياً : سكردي أوكيسي ريبوز.**

(درجة واحدة)

ص ١١٦

ص ١٧

(درجة واحدة)

أ- تعمل كأدلة اتصال أو ربط بين خلايا الجهاز المناعي المختلفة ومن جهة أخرى بين الجهاز المناعي وخلايا الجسم الأخرى، بالإضافة إلى مساعدة الجهاز المناعي في أداء وظيفته المناعية.

ص ٨٩

ب- يتكون الفاللين لكي يعزل المناطق التي تعرضت للقطع أو التمزق نتيجة لزيادة النبات في السمك أو بسبب جمع الثمار أو سقوط الأوراق في الخريف أو لتعدي الإنسان والحيوان. وهذا يمنع دخول الكائن الممرض للنبات.

ص ٨٣

إجابة السؤال (٢٨) :

(أ) الضلع

(ب) الحركة الدورانية السيتوبلازمية

إجابة السؤال (٢٩) :

(درجة واحدة)

إجابة السؤال (٣٠) :

المكان	الوظيفة
(أ) داخل الكيس الجنيني في بويضة النبات.	تغذية الجنين في مراحل نموه الأولى.
(ب) حول جنين الإنسان في الرحم.	حماية الجنين من الجفاف وتحمل الصدمات وتغذية الجنين.

(درجة واحدة) ص ٦٦

إجابة السؤال (٣١) :

(ج) قناة فالوب

(درجة واحدة) ص ٨٧

إجابة السؤال (٣٢) :

لأنها لابد من أن تمر بعملية نضوج وتميز في الأعضاء الليمفاوية لتحولها إلى خلايا ذات قدرة مناعية.

(درجة واحدة) ص ١٢٢

إجابة السؤال (٣٣) :

ينتج عن هذه المعالجة في النبات ضمور خلايا القمة النامية وموتها لتنتج دوتها (طفرة مستحدثة).  
أنسجة جديدة تحتوي خلاياها على عدد مضاعف من الصبغيات.

(درجتان) ص ٦٢

إجابة السؤال (٣٤) :

أولاً :

- عند غياب رقم (١) يحدث العقم بسبب عدم وجود هرمون التستوستيرون.
- أهمية رقم (٢) تفرز سائلًا يدخل الحيوانات المنوية داخل الخصية ويعتقد أن لها وظيفة مناعية.

ثانياً :

- (٣) أمehات المني
- (٤) (ن) صبغي.

(درجاتان) ص ۳۶

## إجابة السؤال (٣٥) :

خلايا بيتا	خلايا ألفا
تمثل غالبية جزر لانجرهانز وتفرز هرمون الأنسولين الذي يعمل على خفض نسبة السكر بالدم.	عددتها قليل وتفرز هرمون الجلوكون جون الذي يقوم برفع تركيز الجلوکوز في الدم.

(دریтан) ص ۱۲۸

جایة السؤال (٣٦) :

١٩

UAC AUA CAC UUA UGG

شاعر

المياثيونين - تيروسين - فالين - اسيارجين - ثيرونين.

(درجة واحدة)

إجابة السؤال (٣٧) :

(أ) يحدث ذلك في طلب الإسبروجيرا بالاقتران عند تعرضها للجفاف أو تغير حرارة الماء أو نقاوته. ص ٤٩

(ب) لأنه يحتوى على جميع الهرمونات النباتية والعناصر الغذائية الازمة للنمو والتمايز إلى نبات كامل. ص ٤٨

(درجة واحدة) ص ١٠٠

إجابة السؤال (٣٨) :

(ب) الأجسام المضادة والخلايا التائية النشطة.

(درجة واحدة)

إجابة السؤال (٣٩) :

ص ١١

ص ١٣

(١) عدد أزواج الصلوع ١٠ أزواج

(٢) ٢٦ عظمة.

(درجة واحدة) ص ٧٤

إجابة السؤال (٤٠) :

تبدأ كل منها في النمو العادى إلى أفراد ينتمون فى صفاتهم إلى الأنوية المزروعة.

(درجة واحدة) ص ٨٩

إجابة السؤال (٤١) :

الكيموكيات.

٣٥ (درجة واحدة) ص

إجابة السؤال (٤٢) :

يؤدى ذلك إلى ظهور صفات وعوارض الرجالية في النساء.

٨٦ (درجتان) ص

إجابة السؤال (٤٣) :

(أ)

اللوزقانة	بعض باءير
هما غدقان تقعان على جانبي الجزء الخلفي من الفم لتلتقطا أي ميكروب أو جسم غريب يدخل مع الطعام أو الهواء وتنمنع دخوله إلى الجسم وبالتالي تعمل على حمايته.	عقد صغيرة تنتشر في الغشاء المخاطي المبطن للجزء السفلي من الأمعاء الدقيقة وتلعب دوراً في الاستجابة المناعية ضد الكائنات الحية المسببة للأمراض التي تدخل الأمعاء.

ص ٣٨

(ب)

الأدمة الخارجية	الجدار الخلوي
- تمثل حاجز الصد الأول في المقاومة. - تتغطى بطبقة شمعية فلا يستقر عليها الماء وبالتالي لا تتوفر البيئة الصالحة لنمو الفطريات وتكاثر البكتيريا. وقد تكسوها شعيرات وأشواك مما يحول دون تجمع الماء أو أكلها من بعض حيوانات الرعى وتقل فرص الإصابة بالمرض.	يمثل الجدار الواقي الخارجي للخلايا وخاصة طبقة البشرة الخارجية والذي يتربك من السيليلوز وبعد تغاظره يدخل في تركيبه اللجنين مما يجعله صلباً يصعب على الكائنات الممرضة اختراقه.

(درجتان) ص ١١٤ - ١١٥

إجابة السؤال (٤٤) :

أولاً: (ب) شريط DNA المنسوخ.

ثانياً: (C)

ثالثاً: (B) إنزيم بلمرة DNA

(C) إنزيم الرابط.

(درجتان)

إجابة السؤال (٤٥) :

أولاً: البربخ: نقل الحيوانات المنوية إلى الوعاء الناقل.

البروستاتا: تفرز سائلاً قلوياً يعمل على معادلة حموضة مجرى البول. ص ٦١

ثانياً: الزوائد الإصبعية: تعمل على التقاط البويضة لضمان سقوطها في قناة فالوب.

ص ٦٤

ص ٦٥

ثنيات المهبل: تسمح بتمدد خاص أثناء خروج الجنين.