

مجموع الدرجات

٣٠

نموذج



المادة: التفاضل والتكامل

التاريخ : ٢٠١٩/٦/٢٩

زمن الإجابة : ساعتان

الدرجة	الأسئلة من إلى	توقيع المراجع	المقدار
٤ ← ١		
٨ ← ٥		
١٢ ← ٩		
١٥ ← ١٣		
١٨ ← ١٦		

عدد صفحات الكراسة (٢٨) صفحة
بخلاف الغلاف (٤) صفحات
وعلى الطالب مسؤولية المراجعة
والتأكد من ذلك قبل تسليم الكراسة

رقم المراقبة

.....

مجموع الدرجات بالحروف :

إمضاءات المراجعين :

عدد صفحات الكراسة (٢٨) صفحة
بخلاف الغلاف (٤) صفحات
وعلى الطالب مسؤولية المراجعة
والتأكد من ذلك قبل تسليم الكراسة



نموذج

الإدارة :
المحافظة :

.....
.....

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني
امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة
للعام الدراسي ٢٠١٩/٢٠١٨ – الدور الأول
المادة: التفاضل والتكامل

التاريخ : ٢٠١٩/٦/٢٩

زمن الإجابة : ساعتان

اسم الطالب (رباعيًا) /
المدرسة
رقم الجلوس :

توقيع الملاحظين بصحبة البيانات :
ومطابقة عدد صفحات كراسة الإجابة
عند استلامها من الطالب .

تعليمات مهمة مراجعة

- عدد أسئلة كراسة الامتحان (١٨) سؤالاً.
- عدد صفحات كراسة الامتحان (٢٨) صفحة.
- تأكد من ترقيم الأسئلة، ومن عدد صفحات كراسة الامتحان، فهي مسؤليتك.
- زمن الاختبار (ساعتان).
- الدرجة الكلية للاختبار (٣٠) درجة.

عزيزي الطالب .. اقرأ هذه التعليمات بعناية :

اقرأ التعليمات جيداً سواء في مقدمة كراسة الامتحان أو مقدمة الأسئلة، وفي ضوئها أجب عن الأسئلة.

اقرأ السؤال بعناية، وفكر فيه جيداً قبل البدء في إجابته.

استخدم القلم الجاف الأزرق للإجابة ، والقلم الرصاص في الرسومات، ولا تستخدم مزيل الكتابة.

عند إجابتك للأسئلة المقالية، أجب في المساحة المخصصة للإجابة ، وفي حالة الحاجة لمساحة

أخرى يمكن استكمال الإجابة في صفحات المسودة مع الإشارة إليها ، وإن إجابتك بأكثر من

إجابة سوف يتم تقديرها.

مثال:

عند إجابتك عن الأسئلة المقالية الاختيارية أجب عن (أ) أو (ب) فقط .

عند إجابتك عن أسئلة الاختيار من متعدد إن وجدت:

ظلل الدائرة ذات الرمز الدال على الإجابة الصحيحة تظليلاً كاملاً لكل سؤال.

مثال: الإجابة الصحيحة (ج) مثلاً

١
٢
٣
٤

٥
٦

(أ)
(ب)
(ج)
(د)

الإجابة الصحيحة مثلاً

- في حالة ما إذا أجبت إجابة خطأ، ثم قمت بالشطب وأجبت إجابة صحيحة تحسب الإجابة صحيحة.

- وفي حالة ما إذا أجبت إجابة صحيحة ، ثم قمت بالشطب وأجبت إجابة خطأ تحسب الإجابة خطأ.

ملحوظة :

في حالة الأسئلة الموضوعية (الاختيار من متعدد) إذا تم التظليل على أكثر من رمز أو تم

تكرار الإجابة ؛ تعتبر الإجابة خطأ.

يسمح باستخدام الآلة الحاسبة.

٧

مع أطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح

١

إذا كانت $\frac{1}{x} = \frac{1}{y}$ فإن

(ب) $x < y$

(د) $y < x$

(ج) $x < y$

(أ) $x < y$

٢

٣) تسقط قطرة مطر كروية وتصل إلى طبقة هواء جاف وتبأ في التبخر بمعدل

تناسب مع مساحة سطحها ($m = \pi r^2$)

أثبتت: أن نصف قطر قطرة المطر يتناقص بمعدل ثابت.


٧ أوجد: معادلة المماس للمنحنى
ص = ٣ - $\frac{1}{x}$ عند النقطة (١ ، ٣) عليه.

٨ أوجد: أبعاد المستطيل.

المرسوم داخل المثلث

الموضح بالشكل

حيث تكون مساحته أكبر مما يمكن.



٩

$$\frac{\text{لوس}}{\text{هـ}} \times \frac{\text{لوس}}{\text{هـ}} = \dots \dots \dots$$

(أ) $\frac{s}{3} + \frac{s}{3}$ (ب) $\frac{s}{3} + \frac{s}{3}$ (ج) $\frac{s}{3} + \frac{s}{3}$ (د) $\frac{s}{3} + \frac{s}{3}$

١٠ إذا كانت د دالة حيث:

$$d(s) = \frac{s^4 + 1}{s^2}$$

فإن الدالة تكون تناقصية في

١ [] فقط

٢ [] ، صفر

٣ [] صفر ، ١ فقط

٤ [] صفر ، ١ ، [] صفر، ١

١١ إذا كان ميل المماس لمنحنى عند أي نقطة عليه (س ، ص)

يساوي (٤ قتاً س) حيث ثابت أوجد: معادلة المنحنى إذا علم أنه يمر بال نقطتين

$$\left(\frac{\pi}{4}, 5 \right), \left(\frac{\pi}{4}, 1 \right)$$

١٢) أوجد: بـ ٦ | اس - ٤ | د س

(اكتب خطوات الحل)

إذا كانت د دالة حيث : ١٤

امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة - التفاضل والتكامل - الدور الأول - العام الدراسي ٢٠١٩/٢٠١٨

$$d(s) = \lim_{h \rightarrow 0} s \text{ فإن القيمة الصغرى المطلقة للدالة } d \text{ تساوي } h.$$

٦- هـ

٧- هـ

١- هـ

١٥) أجب عن أحد السؤالين التاليين فقط:

(أ) أوجد، قيم كل من \mathfrak{m} ، \mathfrak{b} إذا كان لمنحنى الدالة $\mathfrak{c} = \mathfrak{s}^{\mathfrak{m}} + \mathfrak{b}$ نقطة انقلاب عند النقطة $(3, 9)$.

ثم عيّن القيم العظمى والصغرى المحلية للدالة.

(ب) أوجد، القيم القصوى المطلقة للدالة \mathfrak{d} حيث: $\mathfrak{d}(s) = 2s^2 - s$ ، $s \in [1, 3]$

امتحان شهادة إقامة الدراسة الثانوية العامة- التفاضل والتكامل - الدور الأول - العام الدراسي ٢٠١٩/٢٠١٨

١٦ حجم الجسم الناشئ من دوران المنطقة المقصورة بين المنحني $S = 2$ س^٢،

والمستقيم $\text{ص} = 8$ س دورة كاملة حول محور السينات

یساوی

$$\text{أ } \pi \circ \left(x^2 - 8x \right)^2 \text{ ب } \pi \circ \left(x^2 - 8x + 16 - 16 \right)^2 = \pi \circ \left((x-4)^2 - 16 \right)^2$$

$$\text{جـ: } \pi \left(64s^2 - 4s^4 \right) \text{ دـ: } \pi \left(4s^4 - 64s^2 \right)$$

١٨) أجب عن أحد السؤالين التاليين فقط :

(أ) استخدم التكامل بالتجزئ لإيجاد:

$$\int_{\sin^3 x}^{\cos^3 x} \frac{dt}{t^2}$$

(ب) أوجد: $\int \frac{dx}{x^2 + 1}$

